00087634

Digitized with financial assistance from
Government of Maharashtra
on 30 January, 2020



Dessiné & Gravé par F. N. Martinet, Dessinateur de Mrs les Ducs de la Rochefoucauld, et d'Estissac.

ORNITHOLOGIA

SIVE

SYNOPSIS METHODICA

SISTENS AVIUM DIVISIONEM IN ORDINES Sectiones, Genera, Species, ipsarumque Varietates.

CUM ACCURATA CUJUSQUE SPECIE descriptione, Citationibus Auctorum de iis tractantium Nominibus eis ab ipsis & Nationibus impositis, Nominibusque vulgaribus.

A D. BRISSON, Regiæ Scientiarum Academiæ Socio.

Opus Figuris æneis adornatum.

VOLUMEN V.

PARISIIS,

AD RIPAM AUGUSTINORUM,

apud CL. JOANNEM-BAPTISTAM BAUCHE, Bibliopolam ad Insigne S^tæ. Genovefæ, & S^ti. Joannis in Deserto.

M. DCC. LX.

CUM APPROBATIONE, ET PRIVILEGIO REGIS.

ORNITHOLOGIE

OU

MÉTHODE

CONTENANT LA DIVISION DES OISEAUX en Ordres, Sections, Genres, Especes & leurs Variétés.

A LAQUELLE ON A JOINT UNE DESCRIPTION exacte de chaque Espece, avec les Citations des Auteurs qui en ont traité, les Noms qu'ils leur ont donnés, ceux que leur ont donnés les différentes Nations, & les Noms vulgaires.

Par M. BRISSON, de l'Académie Royale des Sciences.

Ouvrage enrichi de Figures en taille-douce.

TOME V.

87634
al
MT-a-3
LIBRARY OF THE BOMBAY BRANCH OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY

A PARIS,

QUAY DES AUGUSTINS,

Chez CL. JEAN-BAPTISTE BAUCHE, Libraire, à l'Image Sainte Geneviéve & S. Jean dans le Désert.

M. DCC. LX.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.

00087634

LXII.

Genus Struthionis.

Hujus character est

Digiti duo antici, membranis destituti; digitus posticus nullus:

Crura in parte inferiore plumis denudata:

Rostrum rectum, horizontaliter subplanum; hujus apex subrotundus, unguiculatus:

Superior capitis pars calva & callosa:

Alæ, pro corporis mole, exiguæ, & volatui inutiles.

LXII.

Le Genre de l'Autruche.

Son caractere est d'avoir

Deux doigts devant, dénués de membranes; & point de doigt derriere:

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:

Le bec droit, applati horizontalement; son bout onguiculé & arrondi:

La partie supérieure de la tête chauve & calleuse:

Les aîles petites à proportion de la grosseur du corps, & point propres pour le vol.

** 1. L'AUTRUCHE.

Voyez Pl. I. Fig. 1.

Struthio pennis nigris in toto corpore vestitus, albis & griseis quandoque admixtis; remigibus majoribus rectricibusque candidis . . . . STRUTHIO.

Struthio pedibus didactylis. Camelus. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 86. *sp.* 1.

Struthio pennis candidissimis, lanuginosis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XL.*

Struthio. *Klein. Avi. pag.* 16.

Moehr. Avi. Gen. 54.

Struthio; Struthio-Camelus. *Charlet. Exer. pag.* 79. *N°. X.*

Charlet. Onomazt. pag. 71. *N°. X.*

Struthio; Struthio-Camelus; Struthio Africa; Struthio Libycus; Struthio-Camelus. *Gesn. icon. Avi. pag.* 69, *in qua hujus icon pessima.*

Struthio-Camelus. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag.* 587. *icones non satis accuratæ, maris pag.* 590, *& fœminæ pag.* 591.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 350.

Willugh. Ornith. pag. 104. *hujus icon satis accurata (exceptis pedibus) Tab. XXV.*

Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 200.
Linn. Systh. Nat. ed. 6. *Gen.* 62. *sp.* 1.

Struthio-Camelus, five Struthio. *Raj. Syn. Avi. pag.* 36. *N°.* 1.
Struthio-Camelus Africanus, pullus. *Seb. Vol. I. pag.* 83. *hujus icon satis accurata Tab. LI. fig.* 6.
Strutho-Camelus. *Gesn. Avi. pag.* 739. *hujus icon pessima pag.* 740.
Jonst. Avi. pag. 35. *hujus duæ icones non satis accuratæ Tab. XXI.*
Autruche. *Bel. Hist. nat. des Oif. pag.* 231 ; *avec une très-mauvaise figure pag.* 232.
Bel. Portr. d'Oif. pag. 55 *a, dans laquelle est la même figure.*
Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. II. pag. 113; *avec une figure assez exacte Pl.* 53.
Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 147 ; *avec une mauvaise figure pag.* 164. *N°.* 3.
Alb. Tom. III. pag. 13 ; *avec une figure mal coloriée Pl.* 31.
Les Hébreux l'appellent JACUAH. *Gesn. Aldrov.*
Les Chaldéens, NAAMITHA. *Gesn. Aldrov.*
Les Arabes, NEAMAH. *Gesn. Aldrov.*
Les Grecs, Στρουθος. *Bel. Gesn.* Στρουθος ; Στρουθοκάμηλος ; Στρουθοϊκάμηλος. *Aldrov. Jonst.* Στρουθιοκάμηλος ; Στρουθος ; μηγάλη ; Στρουθος λιβυκος. *Schwenck.* Στρυθος. *Bel.*
Les Grecs modernes, Στριφοκάμιλος. *Gesn. Aldrov.* Στρειτοκαμηλος. *Jonst.*
Les Portugais, EMA. *Klein.* EMA DI GEI. *Gesn. Aldrov.*
Les Espagnols, AVESTRUZ. *Gesn. Aldrov.*
Les Catalans, ABASTRUS. *Barr.*
Les Italiens, STRUTZA. *Bel. Gesn.* STRUZZO ; STURZO. *Gesn. Aldrov.*
Les Allemands, STRUSS ; STRAUSS. *Gesn. Aldrov.* STRAUS ; STRAUS-VOGEL. *Schwenck.*
Les Flamands, VOGEL STRUIJS. *Aldrov.*
Les Illyriens, PSTROS. *Gesn. Aldrov.*
Les Polonois, STRUS. *Gesn. Aldrov.*
Les Suédois, STRUTZ. *Linn.*
Les Anglois, OSTRICH. *Willugh. Raj. Klein. Alb.* OSTRIDGE. *Charlet.*

L'*Autruche* est le plus grand & le plus gros de tous les Oiseaux. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pieds six pouces, & jusqu'à celui de l'ongle de huit pieds quatre pouces. Son bec, qui a à son origine deux pouces six lignes de

Alitum omnium maximus & crassissimus est *Struthio*. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pedes & sex pollices æquat, & ad extremos ungues octo pedes & quatuor pollices. Rostrum, quod in exortu

duorum pollicum & sex linearum latitudinem obtinet, ab ipsius extremitate ad oris angulos, ultra oculos quidem protensos, quatuor pollices & sex lineas longum est; cauda tredecim pollices; pes quindecim pollices & tres lineas; major digitus, scilicet interior, cum ungue septem pollices & novem lineas; exterior, qui quidem ungue caret, quatuor pollices & sex lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum sex pedum & septem pollicum intervallo distant: alæ verò complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem pertingere queunt. Capitis superior pars plumis est omnino destituta & penitùs nuda. Reliquum caput, guttur & collum, per mediam ipsius longitudinem capiti finitimam, cute obteguntur carneo colore livido imbutâ, lanugine, rariorum pilorum æmulâ, albâ & splendente obsitâ. Collum per mediam ipsius longitudinem corpori viciniorem, dorsum, uropygium, pectus & ventrem vestiunt pennæ nigræ, quas inter quandoque immiscentur quædam candidæ & quædam griseæ. Pennæ sca-

largeur, a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche, qui s'étendent jusqu'au-delà des yeux, quatre pouces six lignes de long; sa queue treize pouces; son pied quinze pouces trois lignes; le plus grand de ses doigts, qui est l'intérieur, joint avec l'ongle, sept pouces neuf lignes; l'extérieur quatre pouces six lignes. Ce dernier n'a point d'ongle. Elle a six pieds sept pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, peuvent s'étendre jusque vers la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est tout-à-fait dégarnie de plumes & entiérement nue. Le reste de la tête, la gorge & le col, dans la moitié de sa longueur qui est la plus voisine de la tête, sont couverts d'une peau de couleur de chair livide, garnie d'un duvet, en forme de poils clair-semés, blanc & brillant. La moitié de la longueur du col la plus voisine du corps, le dos, le croupion, la poitrine & le ventre sont couverts de plumes noires, parmi lesquelles en sont mêlées quelquefois quelques-unes de blanches & quelques-unes de grises. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont pareillement noires, & mêlées de quel-

ques plumes blanches & grises. (Dans les jeunes tout le corps est couvert de plumes d'un gris-brun). Les jambes, les côtés & le dessous des aîles sont entiérement dégarnis de plumes; & la peau est dans ces endroits d'un blanc-rougeâtre. La peau qui couvre les jambes, est garnie de rides un peu élevées, qui se croissent les unes & les autres, & laissent entr'elles des espaces quarrés. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un très-beau blanc : les moyennes sont noires. La queue est composée de plumes du même blanc que celui des grandes plumes de l'aîle. Toutes les plumes de cet Oiseau sont decomposées, c'est-à-dire, que leurs barbes sont séparées les unes des autres, & n'ont aucune connexion entr'elles. Cet Oiseau a au bas du sternon une callosité sur laquelle il s'appuye, lorsqu'il se couche. A chaque aîle sont deux ergots, longs d'environ un pouce, ayant à leur bâse une ligne & demie de diamétre, d'une substance semblable à de la corne, placés, l'un au bout de l'aîle, & l'autre au bout de l'aîle bâtarde. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est de couleur de corne, excepté son bout qui est noirâtre. Les

pulares & superiores alarum tectrices sunt similiter nigræ, plumis quibusdam albis & griseis interſertis. (Juniores per universum corpus pennis vestiuntur griseo-fuscis). Crura, latera & partes subalares plumis penitùs destituuntur; cutis autem iis in locis ex albo rubescit. Supra cutem crura cooperientem rugæ sunt ipsius superficiem nonnihil excedentes, aliæ alias decussantes, & intervalla inter se quadrata efformantes. Remiges alarum majores candore nitent: minores sunt nigræ. Caudam componunt rectrices eodem imbutæ candido ac remiges majores ipsæ tinguntur. Omnes hujus Avis pennæ sunt decompositæ, sive, quod idem est, ipsarum pinnulæ sunt à se invicem disjunctæ, & nullo modo inter se connectuntur. In infima sterni parte callositas est quædam, cui, humi procumbens, insidet hæc Avis. Utraque ala binis donatur calcaribus, unum circiter pollicem longis, quorum in basi diameter sesquilineam æquat, substantiæ corneæ æmulis, alio scilicet in alæ apice, altero in alæ nothæ extremitate posito. Oculorum irides avellaneæ.

Rostrum corneo colore imbutum, attamen in extremitate nigricans. Pedes grisei sunt; unguis autem nigricat. Bini digiti membranâ validâ, ad primum usque articulum extensâ, inter se connectuntur. *Struthio* in arenam ova ponit, & per noctem tantùm ea incubat; interdiù enim sol ad ipsorum incubationem sufficientem præbet calorem. Habitat in *Africa. Ex museo Realmuriano.*

pieds sont gris, & l'ongle est noirâtre. Les deux doigts sont réunis par une forte membrane qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. L'*Autruche* dépose ses œufs dans le sable, & ne les couve que pendant la nuit; parce que pendant le jour le soleil donne une chaleur suffisante pour leur incubation. On la trouve en *Afrique. Du cabinet de M. de Reaumur.*

SECTIO II.

Eæ quæ digitos habent tres anticos, posticum nullum.

DUo in illa sectione continentur genera Avium, rostri formâ à se invicem discrepantium. Aliæ enim rostro donantur recto, horizontaliter subplano; hujus apice subrotundo, ut *Rhea*: aliæ verò rostrum habent rectum, subconicum: istæ autem habent quoque caput galeâ corneâ instructum: & palearia bina in juguli medio posita, ut *Casuarius.*

SECTION II.

Ceux qui ont trois doigts devant & point derriere.

CETTE section contient deux genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la forme du bec. Les uns ont le bec droit, applati horizontalement; & son bout est arrondi, comme le *Thouyou*: & les autres ont le bec droit & presque conique; ceux-là ont un casque de corne sur la tête: & deux membranes charnues placées vers le milieu de la gorge, comme le *Casoar.*

LXIII.

Le genre du Thouyou. (1).

Son caractere eſt d'avoir

Trois doigts devant, dénués de membranes; & point de doigt derriere :

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :

Le bec droit, applati horizontalement; ſon bout arrondi :

Les aîles petites à proportion de la groſſeur du corps, & point propres pour le vol.

(1) *Thouyou*, nom formé de *Thouyouyou*, qui eſt celui que les Indiens de la *Guiane* donnent à l'eſpece de ce genre.

LXIII.

Genus Rheæ. (1).

Hujus character eſt

Digiti tres antici, membranis deſtituti; digitus poſticus nullus :

Crura in parte inferiore plumis denudata :

Roſtrum rectum, horizontaliter ſubplanum; hujus apex ſubrotundus :

Alæ, pro corporis mole, exiguæ, & volatui inutiles.

(1) *Rhea*, nomen à *Moehringio* huic generi inditum.

1. Le Thouyou.

Rhea pennis griſeis in toto corpore veſtita . . . . Rhea.

Rhea. *Moehr. Avi. Gen.* 55.

Struthio digito poſtico rotundato mutilo. Struthio Americanus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 86. *ſp.* 3.

Struthio. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag.* 557.

Euſ. Nieremb. pag. 217. *hujus icon minùs accurata pag.* 218, *ſub titulo*, Emeu.

Struthio-Camelus. *Jonſt. Avi. pag.* 153.

Struthio-Camelus Americanus. *Raj. Syn. Avi. pag.* 36. *N°.* 2.

Struthio nothus. *Klein. Avi. pag.* 17.

Grus cinerea ferrivora. *Barr. Hiſt. Fr. Eq. pag.* 133.

Ardea Americana, cinerea, ferrivora, capite calvo. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. I. ſp.* 11.

Avis Eme. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 541, *in qua hujus icon à Nierembergio mutuata.*

Emeu nigricans, cervice longiori ac tenuiori. *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen. XXXVIII. ſp.* 2.

Emeu Nierembergii. *Jonſt. Avi. hujus icon à Nierembergio mutuata Tab.* 56.

Yandou.

Yandou. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag.* 616.

Iandou. *Jonst. Avi. pag.* 125.

Charlet. Exer. pag. 118. *N°. XX.*

Charlet. Onomazt. pag. 115. *N°. XX.*

Nhandu-guacu. *Pison. Hist. Nat. pag.* 84, *in qua hujus icon non satis accurata.*

Nhandu-guacu Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 190. *Jonst. Avi. pag.* 130.

Nhandu-guacu Brasiliensibus, Ema Lusitanis, sive Struthio-Camelus Americanus Marcgravio. *Willugh. Ornith. pag.* 105.

Autruche de Guiane. *Des March. Tom. III. pag.* 324.

Les Portugais l'appellent EMA. *Marcgr. Pison. Jonst. Willugh. Raj.*

Les Barbares, YANDOU. *De Laët. Jonst.* ANDUGOACU. *De Laët.*

Les Brasiliens, NHANDU-GUACU. *Marcgr. Pison. Jonst. Willugh. Raj.*

Les Indiens, SURI : *& d'autres* IARDU. *Nieremb.*

Les Indiens de la Guiane, THOUYOUYOU. *Barr.*

Magnitudine & crassitie paululùm *Struthioni* cedit. Collum ipsius duos circiter pedes longum est; rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque duos pollices cum sex lineis; pes octodecim pollices; crus unum pedem. Universum corpus vestiunt pennæ griseæ. Alæ sunt valdè breves. Caudâ caret hæc Avis; sed ipsius loco pennæ uropygium vestientes longæ sunt, deorsum tendunt, & anum obtegunt. Oculos habet aterrimos; digitos unguibus nigris, crassis & obtusis armatos. Digiti postici loco callositas extat crassa & rotundata. Fructibus & carne vescitur. Habitat in *Guiana* & *Brasilia* in *Seregippæ* & *Fluvii magni* præfecturis.

Il n'est pas tout-à-fait si gros, ni si grand que l'*Autruche*. Son col a environ deux pieds de long; son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche deux pouces six lignes; son pied dix-huit pouces; & sa jambe un pied. Tout son corps est couvert de plumes grises. Ses aîles sont extrêmement courtes. Il n'a point de queue; mais à sa place les plumes du croupion sont longues, & retombent en en-bas, pour venir couvrir l'anus. Ses yeux sont d'un très-beau noir. Ses doigts sont armés d'ongles noirs, gros & obtus. A la place du doigt de derriere est une callosité épaisse & arrondie. Il se nourrit de fruits & de viande. On le trouve dans la *Guiane*, & au *Brésil* dans les Gouvernemens de *Seregippe* & de *Rio Grande*.

LXIV.

Le genre du Casoar.

Son caractere est d'avoir
Trois doigts devant, dénués de membranes; & point de doigt derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec droit, presque conique:
Un casque de corne sur la tête:
Deux membranes charnues vers le milieu de la gorge:
Les aîles petites à proportion de la grosseur du corps, & point propres pour le vol.

LXIV.

Genus Casuarii.

Hujus character est
Digiti tres antici, membranis destituti; digitus posticus nullus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Rostrum rectum, subconicum:
Caput galeâ corneâ instructum:
Palearia bina in juguli medio:
Alæ, pro corporis mole, exiguæ, & volatui inutiles.

** 1. LE CASOAR.

Voyez Pl. I. Fig. 2.

Casuarius niger; capite & collo supremo nudis . . . . CASUARIUS.

Casuarius *Frisch. hujus icon non satis accurata Tab.* 105.
Casearius. *Klein. Avi. pag.* 17.
Struthio pedibus tridactylis, vertice pelearibusque nudis. Casuarius. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 86. *sp.* 2.
Cela. *Moehr. Avi. Gen.* 56.
Avis Eme. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 541.
Emeu pennis setosis, nigricantibus, crassâ cerviee. *Barr. Ornith. Class. III. Gen XXXVIII. sp.* 1.
Emeu Avis. *Clus. exot. Lib. V. Cap. III. pag.* 97. *hujus icon satis accurata pag.* 98.
Emeu. *Charlet Exer. pag.* 79. *N° XI.*
Charlet. Onomazt. pag. 71. *N°. XI.*
Linn. Systh. Nat. ed. 6. *Gen.* 63. *sp.* 1.

Emeu Clusii. *Eus. Nieremb. pag. 218, in qua hujus icon à Clusio mutuata.*

Emeu, seu Eme Clusii. *Jonst. Avi. pag. 119. hujus icon à Clusio mutuata Tab. 56.*

Emeu, seu Eme Aldrovandi, Clusii, Nierembergii. *Willugh. Ornith. pag. 105. hujus icon non satis accurata Tab. XXV.*

Raj. Syn. Avi. pag. 36. N°. 3.

Emeu, vulgò Casoaris. *Bont. Ind. Ori. pag. 71, in qua hujus icon pessima.*

Emeu à quibusdam dictus Casearius. *Mus. Worm. pag. 292.*

Casoar. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. II. pag. 157; avec une figure pas assez exacte Pl. 56.*

Cassowary. *Alb. Tom. II. pag. 39; avec une figure peu exacte, & mal coloriée Pl. 60.*

Les Allemands l'appellent CASUAR, *ou* EMEU. *Frisch.*

Les Suédois, EME. *Linn.*

Les Anglois, CASSOWARY. *Willugh. Raj.* CASSOWARE. *Charlet.* CASSAWAR. *Alb.*

Les Indiens, EME *Aldrov.*

Crassitie *Struthionem* ferè adæquat; sed non tantam obtinet altitudinem. Ipsius longitudo ab apice rostri ad uropygium extremum quatuor pedes explet, & ad extremos ungues quinque pedes & sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos, infra oculos usque protensos, quatuor pollices & sex lineas longum est; pes duodecim pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque pollices cum sex lineis, extimus quatuor pollices, intimus autem quatuor pollices & sex lineas; digiti enim intimi unguis trium pollicum longitudine pollet. In superiore capitis parte incrementum

Il est presqu'aussi gros que l'*Autruche*; mais il n'est pas si élevé. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui du croupion est de quatre pieds, & jusqu'à celui des ongles de cinq pieds six pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche, qui s'étendent jusqu'au-dessous des yeux, a quatre pouces six lignes de long; son pied douze pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq pouces six lignes, l'extérieur quatre pouces, & l'intérieur quatre pouces six lignes; car l'ongle de ce dernier a jusqu'à trois pouces de long. Sur la partie supérieure de la tête est une excroissance osseuse, garnie d'une matiere cornée, qui

forme une espece de casque, & qui s'étend depuis l'origine du bec jusque vers le milieu du sommet de la tête. Ce casque a trois pouces de hauteur, un pouce de largeur à sa bâse, & seulement trois lignes dans sa partie supérieure. Sa partie antérieure est noirâtre : sa partie postérieure & ses côtés sont d'un jaune de cire. Le tout en est lisse & brillant. La tête, la gorge & la partie du col la plus voisine de la tête sont couvertes d'une peau nue & garnie seulement de quelques petites plumes noires, clair-semées. Cette peau est bleue sur les côtés de la tête : sur la partie postérieure de la tête, la gorge & le col elle est d'un violet tirant sur le cendré : il y a seulement un peu de rouge sur le milieu de la partie supérieure du col, la peau formant en cet endroit des plis ou especes de rides. Sur la partie inférieure du col, vers le milieu de sa longueur, sont situées deux membranes charnues, longues d'un pouce six lignes, larges de neuf lignes, & arrondies par le bout. Ces membranes sont en partie rouges & en partie bleues. Sur le sternon est une callosité, sur laquelle l'Oiseau s'appuye, lorsqu'il est couché. Tout le reste de son corps, sçavoir la

extat osseum, materiâ corneâ coopertum, quodammodo efficiens galeam ab exortu rostri medium versùs capitis verticem protensam. Galea autem trium pollicum altitudinem, unius pollicis in basi, & trium tantùm linearum in suprema parte latitudinem obtinet. In anteriore parte nigricat : in posteriore verò, sicut & ad latera, cereo colore imbuitur. In tota superficie lævigata est & splendens. Caput, guttur & partem colli capiti viciniorem cooperit cutis nuda, quibusdam tantùm & rarioribus plumulis nigris obsita. Quæ cutis est ad latera capitis cœrulea, in parte capitis posteriore, gutture & collo ex violaceo ad cinereum vergens : in colli superioris medio aliquid tamen rubri admiscetur ; & eo in loco rugis exaratur cutis. In collo inferiore, versùs mediam ipsius longitudinem, palearia extant bina, unum pollicem & sex lineas longa, novem lineas lata, & in extremitate rotundata. Palearia autem ista sunt partim rubra & partim cœrulea. Super sternum callositas est quædam, cui, humi procumbens, insidet hæc Avis. In

universo reliquo corpore, colli scilicet parte corpori viciniore, dorso, uropygio, pectore, ventre, cruribus, lateribusque; pennis vestitur nigris, omnibus decompositis, id est, quarum pinnulæ sunt à se invicem disjunctæ, & nullo modo inter se connexæ. Pleræque pennæ sunt in utroque alveolo binæ : ex quibusdam tamen alveolis unica tantùm oritur penna. Omnium autem pennarum scapi sunt plani, splendidè nigri in parte inferiore nodis obsiti, ex quibus oritur pinnula, vulgò maximâ longitudine pollens. In uropygio quædam extant plumæ quatuordecim pollices longæ. Omnes autem hujus Avis pennæ magnoperè ad pilorum formam accedunt; & si à longè conspiciatur hæc Avis, pilis potiùs quam pennis vestita videtur. Ala, quæ quidem plumis denudata trium pollicum longitudinem non attingit, quinque conflatur remigum scapis pinnulis destitutis, splendidè nigris, paululùm arcuatis, & quorum major undecim pollicum longitudine pollet. Caudâ caret hæc Avis. Oculorum irides eleganti imbuuntur Topazii co-

partie du col la plus voisine du corps, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les jambes & les côtés sont couverts de plumes noires, toutes décomposées, c'est-à-dire que leurs barbes sont séparées les unes des autres, & n'ont entr'elles aucune connexion. La plupart de ces plumes sont placées deux à deux dans chacun des alveoles; il y en a cependant quelques-uns dont il ne sort qu'une seule plume. Les tiges de toutes ces plumes sont plattes, d'un noir brillant, & garnies en-dessous de nœuds, de chacun desquels part une barbe, qui est ordinairement fort longue. Sur le croupion sont même quelques plumes qui ont jusqu'à quatorze pouces de longueur. Toutes ces plumes ressemblent beaucoup à des poils; & si on le regarde d'un peu loin, cet Oiseau paroît être couvert plutôt de poils que de plumes. L'aîle, qui denuée de plumes n'a pas trois pouces de long, est composée de cinq tiges de plumes dégarnies de barbes, d'un noir-brillant, un peu courbées en arc, & dont la plus grande a onze pouces de longueur. Cet Oiseau n'a point de queue. L'iris de ses yeux est d'une belle couleur de Topaze. L'ouverture des oreilles est grande, & entourée de petites plu-

mes noires. Les narines sont placées sur le demi-bec supérieur assez près de son extrémité. Les bords des deux mandibules sont un peu échancrés de chaque côté vers leur bout. Le bec est d'un gris-brun. Les pieds qui sont fort gros, sont d'un gris-jaunâtre; & les ongles noirs. La partie de la jambe qui est dégarnie de plumes est extrêmement courte. On le trouve aux *Indes Orientales*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

lore. Aurium foramina ampla, plumulis nigris circumdata. Nares in mandibula superiore prope ipsius extremitatem sitæ sunt. Mandibulæ binæ apice utrinque nonnihil emarginatæ. Rostrum griseo-fuscum. Pedes, qui quidem crassissimi, griseo-flavicantes; ungues verò nigri. Crurum pars inferior plumis denudata valde brevis est. Habitat in *India Orientali*. *Ex museo Realmuriano.*

SECTION III.

Ceux qui ont quatre doigts, sçavoir trois devant & un derriere.

CETTE section est composée d'un seul genre, sçavoir de celui du *Dronte*.

Cet Oiseau a le bec long & fort; le bout de ses deux mandibules est crochu.

LXV.

Le genre du Dronte. (1).

Son caractere est d'avoir

Quatre doigts dénués de membranes; trois devant, un derriere:

(1) *Dronte*, nom que les Habitans de l'*Isle Maurice* donnent à l'espece de ce genre.

SECTIO III.

Eæ quæ digitos habent quatuor, tres scilicet anticos, posticum unum.

UNICO genere, *Raphi* scilicet, constituitur hæc sectio.

Avis ista rostro donatur longo, valido, cujus utriusque mandibulæ apex est aduncus.

LXV.

Genus Raphi. (1).

Hujus character est

Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:

(1) *Raphus*, nomen à *Moehringio* huic generi inditum.

Crura in parte inferiore plumis denudata :
Rostrum longum, validum :
Utriusque mandibulæ apex aduncus :
Alæ, pro corporis mole, exiguæ, & volatui inutiles.

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec long & fort :
Le bout des deux mandibules crochu :
Les aîles petites à proportion de la grosseur du corps, & point propres pour le vol.

1. LE DRONTE.

Raphus pennis griseis in toto corpore vestitus ; remigibus, rectricibusque flavo-cinereis ; capite cucullato . . . . . RAPHUS.

Raphus. *Moehr. Avi. Gen.* 57.
Struthio pedibus tetradactylis, omnibus unguiculatis. Struthio cucullatus. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 86. *sp.* 4.
Gallinaceus Gallus peregrinus. *Clus. Exot. Lib. V. Cap. IV. pag.* 99. *hujus icon pessima pag.* 100.
Cignus cucullatus, seu Gallus Gallinaceus peregrinus Clusii. *Eus. Nieremb. pag.* 232. *hujus icon à Clusio mutuata pag.* 231.
Jonst. Avi. pag. 122. *hujus icon à Clusio mutuata Tab.* 56.
Cygnus cucullatus Nierembergii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 37. *N°.* 4.
Cygnus cucullatus Nierembergii, sive Gallus Gallinaceus peregrinus Clusii. *Willugh. Ornith. pag.* 107. *hujus icon à Bontio mutuata Tab. XXVII, sub titulo*, Dodo.
Dronte, aliis Dod-aers. *Bont. Ind. Ori. pag.* 70, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Dodo Lusitanorum, Cygnus cucullatus. *Charlet. Exer. pag.* 117. *N°. XV.*
Charlet. Onomazt. pag. 113. *N°. XV.*
Les Portugais l'appellent DODO. *Jonst. Charlet.*
Les Hollandois, WALGH-VOGEL. *Clus. Nieremb. Jonst. Willugh.*
Les Anglois, DODO. *Willugh. Raj. Charlet.* MONK SWAN OF S. MAURICE'S ILAND. *Charlet.*
Les Habitans de l'Isle Maurice, DRONTE. *Bont.*

Crassitie *Cygnum* paululùm antecellit. Rostrum habet longissimum & validum ; cujus utriusque mandibulæ apex aduncus. Pes quatuor

Il est un peu plus gros qu'un *Cygne*. Son bec est très-long & fort ; & le bout de ses deux mandibules est crochu. Son pied a un peu plus de quatre pouces

de long, & près de quatre pouces de circonférence. Celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a environ trois pouces de long : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere a deux pouces neuf lignes de longueur ; car son ongle est le plus long de tous. Sa tête est grosse, mal faite, & couverte d'une membrane qui représente assez bien un capuchon. Tout son corps est couvert de plumes grises, assez douces au toucher. Ses aîles, qui sont extrêmement courtes, sont composées de quelques plumes d'un jaune-cendré. Les plumes de la queue, qui sont frisées, sont de la même couleur. (Selon *Clusius* les plumes de l'aîle & les jambes sont noires). Ses yeux sont grands & noirs. Les coins de la bouche s'étendent bien au-delà des yeux ; ce qui rend son ouverture extrêmement grande. Le bec est d'un bleu clair ou blanchâtre, excepté le bout du demi-bec supérieur, qui est jaunâtre, & celui du demi-bec inférieur, qui est noirâtre. Les pieds sont jaunâtres ; & les ongles noirs. On le trouve dans l'*Isle Maurice* en *Afrique*.

pollicum longitudinem nonnihil excedit ; & ipsius circumferentia quatuor pollices ferè adæquat. Trium digitorum anticorum medius cum ungue tres circiter pollices longus est : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem duos pollices & novem lineas longus ; ungue enim omnium longissimo donatur. Caput habet crassum, deforme, quâdam coopertum membranâ cucullum referente. In universo corpore mollibus vestitur plumis griseis. Alæ, quæ quidem valdè breves, quibusdam constant remigibus flavo-cinereis. Caudam componunt rectrices concolores & crispæ. (Secundùm *Clusium* remiges & crura nigri sunt coloris). Oculi magni sunt & nigri. Oris anguli ultra oculos multùm protenduntur ; unde fit rictus valde patulus. Rostrum dilutè cœruleum sive cœruleo-albicans, attamen in mandibulæ superioris extremitate flavescens, in mandibulæ inferioris apice nigricans. Pedes flavescentes ; ungues verò nigri. Habitat in *Mauritia*, *Africæ Insula*.

ORDO XVI.

Dessiné et Gravé par Martinet

1. Autruche. 2 Casoar.

ORDO XVI. ORDRE XVI.

AVES. *LES OISEAUX*

Digitis tribus anticis, membranis destitutis; digito postico nullo: cruribus in parte inferiore plumis denudatis: alisque sat magnis, & volatui idoneis præditæ.

Qui ont trois doigts devant; dénués de membranes; & point de doigt derriere: la partie inférieure des jambes dénuée de plumes: & les aîles assez grandes, & propres pour le vol.

HUJUS Ordinis Avium aliæ rostrum habent conico-incurvum: aliæ rostrum rectum, in apice crassius; inter quas aliæ rostro donantur longissimo: aliæ rostro brevi præditæ sunt. Hujus Ordinis Aves in tres sectiones dividimus: in prima continentur illæ quæ rostrum habent conico-incurvum, ut *Otis*: in secunda eæ quæ rostro donantur recto & longissimo, in apice crassiori, ut *Himantopus*, *Ostralega*: in tertia tandem illæ quæ rostrum habent rectum & breve, in apice crassius, ut *Pluvialis*.

PARMI les Oiseaux de cet Ordre les uns ont le bec en cone courbé: & les autres ont le bec droit & renflé vers le bout. De ces derniers les uns ont le bec très-long: & les autres ont le bec court. Les Oiseaux de cet Ordre se divisent en trois sections: dans la premiere sont ceux qui ont le bec en cone courbé, comme l'*Outarde*: dans la seconde ceux qui ont le bec droit, très-long & renflé vers le bout, comme l'*Echasse*, l'*Huitrier*: & dans la troisiéme ceux qui ont le bec droit, court & renflé vers le bout, comme le *Pluvier*.

SECTION I.

Ceux qui ont le bec en cone courbé.

CEtte ſection ne contient qu'un ſeul genre, ſçavoir celui de l'*Outarde*.

LXVI.

Le genre de l'Outarde.

Son caractere eſt d'avoir
Trois doigts devant, dénués de membranes ; & point de doigt derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec en cone courbé.

SECTIO I.

Eæ quæ roſtro donantur conico-incurvo.

UNicum genus, *Otidis* ſcilicet, hanc ſectionem conſtituit.

LXVI.

Genus Otidis.

Hujus character eſt
Digiti tres antici, membranis deſtituti ; digitus poſticus nullus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Roſtrum conico-incurvum.

** 1. L'OUTARDE.

Otis ſuperne nigricante, fulvo & rufeſcente tranſverſim ſtriata, infernè alba, cum leviſſima fulvi mixtura ; (capite, gutture & collo dilutè cinereis *mas*) ; rectricibus tæniis tranſverſis nigris versùs apicem notatis . . . . OTIS.

Otis jugulo utrinque criſtato. Tarda. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 85. *ſp.* 1.
Otis. *Geſn. Avi. pag.* 484.
Moehr. Avi. Gen. 58.
Otis ſive Tarda. *Jonſt. Avi. pag.* 42. *hujus duæ icones, una à Geſnero, altera ab Aldrovando mutuata Tab. XXVI.*
Otis ſeu Tarda Avis. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag.* 85. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 89 ; *& inſuper altera icon à Geſnero mutuata pag.* 88.
Otis ſeu Tarda Avis Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 58. *N°. A.* 1.

Otis, Tarda Avis Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 129. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXII.*

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.

Otis Aristotelis : Recentiorum Tarda vel Bistarda. *Gesn. icon. Avi. pag.* 67, *in qua hujus icon minùs accurata.*

Otis, Tarda & Bistarda. *Charlet. Exer. pag.* 82. *N°. VIII.*

Charlet. Onomazt. pag. 73. *N°. VIII.*

Otis Græcis; Tarda Isidoro; Bistarda Alberto. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 289.

Otis, seu Tarda Isidori & Aldrovandi; Bistarda Alberti magni; Anser Trappa. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 401.

Tarda Pyrenaica, fulva, maculis nigricantibus, marginibus pennarum roseis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. IX. sp.* 1.

Tarda. *Frisch. hujus icon accurata Tab.* 106.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. *Gen.* 64. *sp.* 1.

Tarda simpliciter. *Klein. Avi. pag.* 18. *N°.* 1.

Tarda Recentiorum. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 355.

Tarda vel Bistarda. *Gesn. Avi. pag.* 486, *in qua hujus icon minùs accurata.*

Tetrax vel Tarax Nemesiani. *Gesn.*

Tetraon Longolio. *Schwenck. Charlet. Klein.*

Erythrontaon Olai magni. *Schwenck. Charlet. Klein.*

Outarde. *Alb. Tom. III. pag.* 16; *avec des figures mal coloriées, du mâle Pl.* 38, *& de la femelle Pl.* 39.

Edwards. Tom. II. pag. LXXIII & LXXIV; avec des figures exactes, du mâle Pl. 73, *& de la femelle Pl.* 74.

Otarde. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. II. pag.* 101; *avec une figure exacte Pl.* 51.

Ostarde. *Bel. Hist. nat. des Oiś. pag.* 235; *avec une mauvaise figure pag.* 236.

Ostarde, Houtarde, Bistarde. *Bel. Portr. d'Oiś. pag.* 56 *a, dans laquelle est la même figure.*

An *hujus speciei junior*, Oedicnemo congener? *Aldrov. Avi. Tom. II. pag.* 101. *hujus icon non satis accurata pag.* 102.

Charlet. Exer. pag. 83. *N°. XI.*

Charlet. Onomazt. pag. 74. *N°. XI.*

Oedicnemo congener Aldrovandi. *Jonst. Avi. pag.* 43.

Les Hébreux l'appellent ALHABARI. *Aldrov.*

Les Grecs, Ωτις; Ω'τὸς *Bel. Schwenck.* Ωτιδα; Οτιδα. *Aldrov.* Τέτριξ; Ο'υραξ. *Schwenck.*

Les Italiens, STARDA. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, TRAPP. *Gesn. Aldrov. Rzac. Frisch.* TRAPPE. *Schwenck. Rzac.* ACKER-TRAPP. *Gesn.* ACKER TRAPPE. *Schwenck.*

Les Flamands, TRAPP-GANSS. *Gesn. Aldrov.* TRAPP-GANS. *Schwenck.*

Les Illyriens, DROFA. *Gesn. Aldrov.*
Les Polonois, DROP. *Rzac.*
Les Suédois, TRAPP. *Linn.*
Les Anglois, BUSTARD. *Gesn. Willugh. Charlet. Alb.* BISTARD. *Gesn. Aldrov.*
Les Ecossois, GUSTARD. *Aldrov.*

Elle est à peu près de la grosseur d'un *Dindon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds un pouce, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces trois lignes de long ; sa queue neuf pouces ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes ; son pied six pouces ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes, l'extérieur un pouce neuf lignes, & l'intérieur un pouce six lignes. Elle a six pieds huit pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge & le col sont d'un cendré clair. De chaque côté de la mâchoire inférieure partent de longues plumes de la même couleur, dont quelques-unes ont jusqu'à trois pouces de long, & qui forment une espece de barbe. Le tour des yeux est d'un blanc-roussâtre. Toute

Crassitie *Gallo-pavonem* circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes & unum pollicem æquat, & ad extremos ungues tres pedes & duos pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & totidem lineas longum est; cauda novem pollices ; pars crurum plumis denudata quindecim lineas ; pes sex pollices ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & novem lineas, extimus unum pollicem cum novem lineis, intimus octodecim lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum sex pedum & octo pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, guttur & collum sunt dilutè cinerea. Ex utroque mandibulæ inferioris latere longæ oriuntur pennæ pariter dilutè cinereæ, quarum quædam trium pollicum longi-

tudine pollent, quæque quodammodo barbam consstituunt. Oculorum ambitus ex albo rufescit. Tota dorsi superficies, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices majores & minores corpori finitimæ maculis, tæniisque variegantur nigricantibus, fulvis & rufescentibus, aliis irregularibus, alteris transversis, strictioribus & à se invicem non multùm remotis. Uropygium maculis pariter & tæniis transversis nigricantibus & rufis varium. Superiores caudæ tectrices sunt rufæ, tæniis quibusdam striatæ transversis nigricantibus, inter quas minutæ quædam disseminantur maculæ similiter nigricantes. Pectus, venter, latera, crurum pars suprema, inferioresque caudæ tectrices albent & aliquid fulvi admixtum habent. Pennæ alas subtus obtegentes sunt penitùs candidæ. Tectrices alarum superiores majores & minores à corpore remotiores cinereo-albæ. Ala notha eodem imbuitur colore; hujus tamen extima penna in latere exteriore & apice fusca est, & rufescente terminatur. Universum corpus sub pennis lanugine roseâ obducitur.

la surface du dos, les plumes scapulaires, ainsi que les grandes & les petites couvertures du dessus des aîles les plus proches du corps, sont variées de noirâtre, de fauve & de roussâtre par taches & bandes, les unes irrégulieres, les autres transversales, assez étroites & proches les unes des autres. Le croupion est varié de même de noirâtre & de roux par taches & bandes transversales. Les couvertures du dessus de la queue sont rousses, & rayées de quelques bandes transversales noirâtres, entre lesquelles sont parsemées quelques petites taches de la même couleur. La poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc mêlé d'une très-légere teinte de fauve. Les couvertures du dessous des aîles sont tout-à-fait blanches. Les grandes & les petites du dessus les plus éloignées du corps sont d'un gris-blanc. L'aîle bâtarde est de la même couleur, excepté le côté extérieur & le bout de la plume la plus extérieure, qui sont bruns, le bout étant terminé de roussâtre. Le duvet sous toutes les plumes du corps est de couleur de rose. L'aîle est composée de vingt-six plumes: les neuf premieres sont

noirâtres : les ſept ſuivantes, ſçavoir depuis la dixiéme juſqu'à la ſeiziéme incluſivement, ſont blanches depuis leur origine juſque vers les deux tiers de leur longueur, le reſte étant noirâtre : la dix-ſeptiéme & la dix-huitiéme ſont blanches dans toute leur longueur, & tachetées de noirâtre & de rouſſâtre depuis environ les deux tiers de leur longueur juſqu'à leur extrémité : les trois ſuivantes, ſçavoir depuis la dix-neuviéme juſqu'à la vingt-uniéme incluſivement, ſont blanches à leur origine, mais dans le reſte de leur longueur leur côté extérieur eſt roux & rayé de bandes tranſverſales & en zigzags noirâtres, & leur côté intérieur eſt d'un blanc tacheté de brun : enfin les cinq plus proches du corps ſont rayées tranſverſalement de roux & de noirâtre. Dans quatre des plumes de l'aîle, ſçavoir la troiſiéme, la quatriéme, la cinquiéme & la ſixiéme, les barbes extérieures deviennent ſubitement beaucoup plus courtes que les autres, & cela vers l'endroit où finiſſent leurs couvertures. La queue eſt compoſée de vingt plumes : les deux du milieu ſont d'un gris-blanc à leur origine ; le reſte de leur longueur eſt roux & marqué vers le bout de deux ban-

Viginti ſex remigibus ala conflatur : novem primores nigricant : ſeptem quæ ſequuntur, à decima ſcilicet ad decimam ſextam uſque incluſivè, ab ipſarum exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes uſque candidæ, in reliqua longitudine nigricantes : decima ſeptima & decima octava per totam longitudinem albæ, nigricante & rufeſcente à duabus circiter tertiis longitudinis partibus ad apicem uſque maculatæ : tres proximè ſequentes, à decima nona ſcilicet ad vigeſimam primam uſque incluſivè, in exortu candidæ, per reliquam autem longitudinem in latere exteriore rufæ, tæniis tranſverſis & undatis nigricantibus ſtriatæ, in interiore candidæ, fuſcis maculis variæ : quinque tandem corpori finitimæ rufo & nigricante tranſverſim ſtriatæ. Quatuor remigum, tertiæ ſcilicet, quartæ, quintæ & ſextæ, pinnulæ exteriores fiunt ſubitò cæteris multò breviores eum versùs locum, in quo ipſarum tectrices deſinunt. Caudam componunt viginti rectrices, quarum binæ intermediæ ſunt in exortu cinereo-albæ, in reliqua longitudine rufæ, versùs api-

cem duabus insignitæ tæniis transversis nigris, inter quas, sicut & supra & infra illas, minutæ disseminantur maculæ similiter nigræ : utrinque proximè sequens in exortu candida, dein rufa, duabus insignita tæniis transversis nigris, quarum una rufum colorem distinguit, altera infra eumdem colorem collocatur; binas inter tænias istas nigras quædam disseminantur maculæ concolores; & tandem rectrix albo ad fulvum dilutum inclinante terminatur : tres utrinque sequentes, tertia scilicet, quarta & quinta, sunt in exortu candidæ, dein rufo imbutæ colore, quem colorem sequitur tænia transversa nigra, supra quam tæniam quædam extant maculæ concolores in rufo colore positæ; unaquæque tandem rectrix albo ad fulvum dilutum vergente terminatur : utrinque sexta & septima sunt in exortu candidæ, dein albo-fulvæ, binis tæniis transversis nigricantibus notatæ : tres utrinque extimæ, in exortu albæ, dein ex albo ad fulvum dilutissimum inclinantes, & tæniâ transversâ nigricante insignitæ. Oculorum irides eleganter aurantiæ. Rostrum griseo-

des transversales noires, entre lesquelles, ainsi qu'au-dessus & au-dessous desquelles, sont semées çà & là de petites taches de la même couleur : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est blanche à son origine, ensuite rousse & marquée de deux bandes transversales noires, l'une placée sur le roux & l'autre au-dessous de cette couleur; entre ces deux bandes noires sont semées quelques taches de la même couleur; & enfin la plume est terminée d'un blanc tirant sur le fauve clair : les trois suivantes de chaque côté, sçavoir la troisiéme, la quatriéme & la cinquiéme, sont blanches à leur origine, ensuite rousses, cette couleur étant suivie d'une bande transversale noire, au-dessus de laquelle sont quelques taches de la même couleur placées sur le roux; après quoi chaque plume est terminée d'un blanc tirant sur le fauve clair : la sixiéme & la septiéme de chaque côté sont blanches à leur origine, ensuite d'un blanc-fauve, sur lequel sont deux bandes transversales noirâtres : les trois plus extérieures de chaque côté sont blanches à leur origine, ensuite d'un blanc tirant sur le fauve très-clair, & marqué d'une bande transversale noirâtre. L'i-

ris des yeux eſt d'un bel orangé. Le bec eſt d'un gris-brun. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont cendrés; & les ongles, qui ſont convexes en-deſſous comme en-deſſus, ſont gris.

La *femelle* diffère du *mâle* par ſa grandeur, qui eſt beaucoup moindre. Elle en diffère encore en ce qu'elle n'a point aux côtés de la mâchoire inférieure ces longues plumes qui forment une barbe au *mâle*. Deplus ſa gorge & les côtés de ſa tête ſont bruns. Les parties ſupérieures de la tête & du col ſont de la même couleur que le dos, lequel n'eſt pas de couleurs ſi vives que dans le *mâle*. La partie inférieure du col eſt cendrée. Le bord de l'aîle eſt noir. Du reſte elle reſſemble parfaitement au *mâle*.

Elles ſe nourriſſent d'herbes & de graines. On les trouve dans les champs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

fuſcum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque cinerei; ungues verò, qui quidem ſicut ſuperne ita & infernè convexi, ſunt griſei.

Fœmina à *mare* diſcrepat magnitudine, quâ ei multò cedit. Ab illo præterea differt in eo quod in utroque maxillæ inferioris latere longis iſtis careat pennis barbam in *mare* conſtituentibus. Guttur inſuper & caput ad latera fuſca ſunt. Partes capitis & colli ſuperiores dorſo concolores; dorſum autem coloribus imbuitur non ita quàm in *mare* vividis. Collum inferius cinereum. Margines alarum nigræ. In reliquis cum *mare* perfectè convenit.

Herbis & ſeminibus victitant. Habitant in campeſtribus locis. *Ex muſeo Realmuriano.*

** 2. LA PETITE OUTARDE, APPELLÉE VULGAIREMENT CANNE-PETIERE.

Voyez Pl. II. le mâle Fig. 1, *& la femelle Fig.* 2.

Oris ſuperne nigro, fulvo, rufeſcente & albo eleganter variegata, infernè alba, (ad latera nigro tranſverſim ſtriata; pectore albo-rufeſcente, tæniis nigricantibus vario *fœmina*); (collo nigro, torque albo cincto *mas*); rectricibus tæniis tranſverſis

transversis nigricantibus notatis . . . . OTIS MINOR, ANAS CAMPESTRIS VULGO DICTA.

Otis capite juguloque lævi. Tetrax. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 85. *sp.* 3.
Tarda nana. *Klein. Avi. pag.* 18. *N°.* 2.
Anas campestris. *Jonst. Avi. pag.* 43.
Charlet. Exer. pag. 83. *N°. IX.*
Charlet. Onomazt. pag. 74. *N°. IX.*
Anas campestris, Canne petiere Gallorum, seu Tetrax Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag.* 96.
Anas campestris, Canne petiere Gallorum, seu Tetrax Bellonii, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 129.
Raj. Syn. Avi. pag. 59. *N°.* 2.
Ortygometra melina, maculis fuscis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXV. sp.* 3.
Stella. *Charlet. Exer. pag.* 83. *N°. X.* (*fœmina*).
Charlet. Onomazt. pag. 74. *N°. X.* (*fœmina*).
Stella Avis. *Jonst. Avi. pag.* 43. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXVI.* (*fœmina*).
Stella Avis dicta. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag.* 98. *hujus icon minùs accurata pag.* 97. (*fœmina*).
Stella Avis Aldrovandi. *Willugh. Ornith. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXII.* (*fœmina*).
Canne petiere. *Gesn. Avi. pag.* 795.
Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 237; *avec une mauvaise figure de la femelle pag.* 238.
Canne petiere, nommée par aucuns, Olive. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 56 *b*, *dans laquelle est la même figure.*
Canard de pré de France. *Alb. Tom. III. pag.* 17; *avec une figure mauvaise & mal coloriée de la femelle Pl.* 41.
Petite Outarde. *Edwards. Glanur. pag.* 89. *Chap. XLI*; *avec une figure exacte de la femelle Pl.* 251.
Les Italiens l'appellent FASANELLA. *Bel.*
Les Anglois FRENCH FIELD DUCK. *Alb.* LITTLE BUSTARD. *Edwards.*
Les Barbares, RHAAD, *ou* SAF-SAF. *Edwards.*

Cum *Phasiano* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & quinque pollices explet, & ad extremos ungues unum

Elle est à peu près de la grosseur du *Faisan.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied six pouces.

Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue quatre pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, onze lignes; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes, l'extérieur un pouce, & l'intérieur onze lignes. Elle a deux pieds huit pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de sa queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes noires, marquées chacune d'une ligne roussâtre qui s'étend selon la longueur de sa tige. Les côtés de la tête & la gorge sont d'un roussâtre très-clair, varié de petites taches longitudinales noirâtres. Le col est noir; cependant au-dessous de la gorge est un collier blanc, qui remonte des deux côtés, en se rétrécissant, jusque vers le derriere de la tête. Au-dessous de ce collier le noir est parsemé de quelques taches roussâtres: ensuite est une bande transversale blanche, au-dessous de laquelle, vers la poitrine, est une autre bande transversale noire. Le dos & le croupion sont joli-

pedem & sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda quatuor pollices; pars crurum plumis denudata undecim lineas; pes duos pollices cum totidem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quinque lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum octo pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Partem capitis superiorem vestiunt pennæ nigræ, lineâ rufescente, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatæ. Caput ad latera, & guttur dilutissimè rufescunt, minutisque variegantur maculis longitudinalibus nigricantibus. Collum nigrum est; attamen infra guttur extat torquis albus, utrinque versùs partem capitis posteriorem assurgens, quique, sic procedendo, fit strictior. Infra torquem istum maculis quibusdam rufescentibus aspergitur color niger: deinde sequitur tænia transversa can-

dida, quam iterùm sequitur altera tænia transversa nigra, versùs pectus posita. Dorsum & uropygium nigro, fulvo, rufescente & pauco albo eleganter variegantur, coloribus istis per minutissimas tænias undatas dispositis, majusculisque maculis nigris iterùm variegatis. Pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices iisdem coloribus, eodemque modo variegantur; majores tamen caudæ tectrices superiores sunt penitùs candidæ. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque alarum tectrices albent. Pennæ caudam subtus obtegentes sunt similiter albæ, sed nigro transversim striatæ. Universum corpus sub pennis lanugine roseâ obducitur. Superiores alarum tectrices minimas & medias variegant iidem colores ac isti quibus dorsum ipsum variegatur; in illis tamen color niger majusculas maculas non efformat: tectrices majores à corpore remotiores sunt nigricantes, albo terminatæ; reliquæ majores tectrices, sicut & minimæ alæ articulum carpo humano respondentem cooperientes, candidæ; majores tamen cor-

ment variés de noir, de fauve, de roussâtre & d'un peu de blanc, & cela par très-petites bandes en zigzags, le tout mêlé d'assez grandes taches noires. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont variées de même & des mêmes couleurs; cependant les plus grandes couvertures du dessus de la queue sont tout-à-fait blanches. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur, & rayées transversalement de noir. Le duvet sous toutes les plumes du corps est de couleur de rose. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont variées des mêmes couleurs que le dos, excepté que le noir n'y est pas répandu par grandes taches : les grandes couvertures les plus éloignées du corps sont noirâtres & terminées de blanc; les autres grandes couvertures, ainsi que les plus petites qui couvrent le pli de l'aîle qui répond à celui du poignet, sont blanches; cependant des grandes les plus proches du corps sont variées d'un peu de brun le long de leur tige. Le bord de l'aîle au-dessous du pli qui ré-

pond à celui du poignet, est blanc. L'aîle bâtarde est de la même couleur. L'aîle est composée de vingt-sept plumes : les quatre premieres sont blanches à leur origine, & noirâtres dans le reste de leur longueur : les six suivantes, sçavoir depuis la cinquiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont blanches, & marquées vers leur extrémité d'une large bande transversale noirâtre : les dix qui suivent ces dernieres, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont tout-à-fait blanches : la vingt uniéme est de la même couleur, mais elle est variée dans son milieu de bandes transversales & en zigzags fauves & noirâtres : enfin les six plus proches du corps sont variées des mêmes couleurs que les plumes scapulaires, mais distribuées par plus larges bandes. Ces dernieres plumes, lorsque l'aîle est pliée, vont aussi loin que les plus grandes, & s'étendent, comme elles, un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La queue est composée de dix-huit plumes, dont les quatre du milieu sont fauves, & marquées de larges bandes transversales noirâtres, entre lesquelles sont d'autres petites bandes de la même couleur, qui suivent dif-

pori finitimæ paululùm fusci secundùm ipsarum scaporum longitudinem admixtum habent. Alarum margines, infra articulum carpo humano respondentem, albæ. Ala notha eodem colore imbuta. Alam componunt viginti septem remiges : quatuor primores sunt in exortu candidæ, in reliqua longitudine nigricantes : sex quæ sequuntur, à quinta scilicet ad decimam usque inclusivè, albæ, latâ tæniâ transversâ nigricante versùs ipsarum extremitates insignitæ : decem istis ultimis proximæ, ab undecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, penitùs candidæ : vigesima prima eodem candore nitens, tæniis tamen transversis & undatis fulvis & nigricantibus in ipsius medio variegata : sex tandem corpori viciniores iisdem coloribus ac scapulares pennæ variegantur, qui tamen colores tænias latiores efformant. Novissimè dictæ rectrices, dum ala complicatur, majorum rectricum extremitates attingunt, & illarum instar, nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Octodecim rectricibus cauda conflatur,

quatuor intermediæ fulvæ, latis notatæ tæniis transversis nigricantibus, quas inter aliæ extant exiguæ tæniæ concolores, secundùm varias directiones positæ : reliquæ omnes rectrices candidæ, exiguis similiter notatæ tæniis nigricantibus, secundùm varias directiones quoque positis, & latâ insuper tæniâ transversâ eodem colore imbutâ, versùs ipsarum extremitatem sitâ, insignitæ. Rectrix quatuor intermediis utrinque proxima aliquid quoque fulvi admixtum habet. Rostrum griseo-fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque grisei.

férentes directions : toutes les autres plumes sont blanches, marquées de même de petites bandes noirâtres, qui suivent différentes directions, & de plus d'une large bande transversale de la même couleur, placée vers l'extrémité de chacune de ces plumes. La plume qui de chaque côté est la plus proche des quatre du milieu, est aussi mêlée d'un peu de fauve. Le bec est d'un gris-brun. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont gris.

Fœmina coloribus paulùlùm à *mare* differt. Partem capitis superiorem obtegunt pennæ nigro & rufescente longitudinaliter variæ. Collum rufescens, quælibet tamen penna in medio secundùm scapi longitudinem fusca. Guttur ex albo rufescit. Dorsum, uropygium & scapulares pennæ iisdem coloribus ac in *mare* variegantur, sed colores isti majores maculas efficiunt. Pectus est albo-rufescens, tæniis nigricantibus, aliis longitudinalibus, alteris trans-

La *femelle* différe un peu du *mâle* par ses couleurs. La partie supérieure de sa tête est couverte de plumes variées longitudinalement de noir & de roussâtre. Le col est de cette derniere couleur, chaque plume étant brune dans son milieu tout le long de sa tige. La gorge est d'un blanc-roussâtre. Le dos & le croupion, ainsi que les plumes scapulaires, sont variées des mêmes couleurs que dans le *mâle*, mais par plus grandes taches. La poitrine est d'un blanc-roussâtre, varié de bandes noirâtres, les unes lon-

gitudinales, les autres transversales. Le ventre & le haut des jambes, ainsi que les couvertures du dessous des aîles, sont blancs. Les côtés, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un blanc rayé transversalement de noirâtre. Les plumes de l'aîle & ses couvertures supérieures, qui sont blanches dans le *mâle*, sont dans la *femelle* d'un blanc rayé transversalement de noirâtre. Du reste elle ressemble au *mâle*.

versis, varium. Venter, crurum suprema pars, inferioresque alarum tectrices albent. Latera, tectricesque caudæ superiores & inferiores similiter candidæ, nigricante transversim striatæ. Alarum remiges, sicut & ipsarum superiores tectrices, quæ in *mare* albicant, in *fœmina* albent quidem, sed nigricante transversim striantur. In reliquis cum *mare* convenit.

Elles se nourrissent d'herbes & de graines. On les trouve dans les champs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Herbis & seminibus victitant. Habitant in campestribus locis. *Ex museo Reaumuriano.*

3. L'OUTARDE D'ARABIE.

Otis cristata, superne rufescens, nigricante transversim striata, infernè alba; cristâ & tæniâ supra oculos nigris; gutture & collo inferiore cinereis, fusco transversim striatis; rectricibus tæniis transversis nigris versùs apicem notatis.... OTIS ARABICA.

Otis auribus erecto-cristatis. Tarda Arabs. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 85. *sp.* 2.

Tarda Mechaensis Arabica. *Klein. Avi. pag.* 18. *N°.* 3.

Outarde d'Arabie. *Edwards. Tom. I. pag. XII; avec une figure très-exacte Pl.* 12.

On l'appelle à Mocha, dans l'Arabie heureuse, LOHONG. *Edwards.*

Elle est à peu près de la grosseur de la *nôtre*; mais elle a les jambes & le bec plus longs, & le col plus delié. Son bec de-

Otidem nostratem crassitie circiter æmulatur; sed cruribus & rostro longioribus, colloque graciliori donatur.

Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & sex lineas longum est. Capitis anterior pars albicat. In utroque capitis latere tænia extat longitudinalis nigra, prope rostri exortum orta, supra oculos ducta, & longiusculas pertingens pennas similiter nigras, elegantem cristam efficientes. Capitis posterior pars, collum superius, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt rufescentes, nigricante transversim striatæ. Guttur & collum superius cinerea, lineolis transversis fuscis striata. Pectus, ventrem, crurum partem supremam & latera vestiunt pennæ albæ. Quæ caudam subtus obtegunt, tectricesque alarum inferiores eodem albore nitent. Superiores minores & majores corpori finitimæ sunt dorso concolores, quælibet tamen tectrix maculâ albâ lunulatâ terminatur: minores à corpore remotiores, sicut & alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, albæ, quibusdam minutis maculis nigris respersis: majores tandem à corpore remotiores, sicut & alæ nothæ pennæ,

puis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces six lignes de long. La partie antérieure de la tête est blanche. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale noire, qui part d'auprès de l'origine du bec, passe par-dessus les yeux, & va joindre de longues plumes de la même couleur, qui forment une jolie hupe. Le derriere de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un roussâtre rayé transversalement de noirâtre. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un cendré rayé de petites lignes transversales brunes. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les petites & les grandes couvertures du dessus des aîles les plus proches du corps sont de la même couleur que le dos, & terminées chacune par une tache blanche en forme de croissant: les petites les plus éloignées du corps, ainsi que le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, sont blanches, quelques unes étant parsemées de petites taches noires: enfin les grandes les plus éloig-

nées du corps & les plumes de l'aîle bâtarde sont noires, & terminées de blanc. Les grandes plumes de l'aîle sont noires : les suivantes sont variées de noir & de blanc par petites taches : & les plus proches du corps sont d'un roussâtre rayé transversalement de noirâtre. Les deux plumes du milieu de la queue sont de la même couleur que ces dernieres plumes de l'aîle : les latérales sont blanches & un peu variées des mêmes couleurs que celles des deux du milieu ; elles sont de plus marquées chacune vers leur bout d'une large bande transversale noire. L'iris des yeux est d'un brun obscur. Le bec est de couleur de corne claire, qui s'obscurcit un peu vers le bout du bec. Les narines sont oblongues, & placées vers l'origine du demi-bec supérieur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un brun clair. On la trouve aux environs de *Mocha* dans l'*Arabie heureuse*.

nigræ, albo terminatæ. Remiges alarum majores nigræ : sequentes albo & nigro variæ, albore & nigredine exiguas maculas efformantibus : corpori viciniores rufescentes, nigricante transversim striatæ. Binæ rectrices intermediæ novissimè descriptis remigibus concolores : laterales candidæ, iisdem coloribus ac binæ intermediæ tinguntur, paululùm variegatæ ; latâ insuper tæniâ transversâ nigrâ versùs ipsarum extremitatem notatæ. Oculorum irides obscurè fuscæ. Rostrum dilutè corneo tinctum colore, versùs rostri apicem nonnihil obscuriore. Nares oblongæ, & versùs mandibulæ superioris exortum collocatæ. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque dilutè fusci. Habitat circa *Mocham* in *Arabia felice*.

SECTIO



Dessiné et Gravé par Martinet

1. Petite Outarde ou Canne-petière, mâle. 2. Petite Outarde ou Canne-petière, femelle.

SECTIO II.

Eæ quæ rostro donantur recto, longissimo, in apice crassiori.

DUo in illa sectione continentur genera Avium, rostri formâ à se invicem discrepantium. Aliæ enim rostro donantur cylindraceo, ut *Himantopus*: aliæ verò rostro lateraliter plano præditæ sunt, ut *Ostralega*.

SECTION II.

Ceux qui ont le bec droit, très-long & renflé vers le bout.

IL y a dans cette section deux genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la forme du bec. Les uns ont le bec cylindrique, comme l'*Echasse*: & les autres ont le bec applati par les côtés, comme l'*Huitrier*.

LXVII.

Genus Himantopi.

Hujus character est

Digiti tres antici, membranis destituti; digitus posticus nullus:

Crura in parte inferiore plumis denudata:

Rostrum rectum, longissimum, cylindraceum, in apice crassius.

LXVII.

Le genre de l'Echasse. (1).

Son caractere est d'avoir

Trois doigts devant, dénués de membranes; & point de doigt derriere:

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:

Le bec droit, très-long, cylindrique & renflé vers le bout.

(1) *Echasse*, nom que j'ai donné aux especes de ce genre à cause de la longueur de leurs jambes.

* * 1. L'Echasse.

Voyez Pl. III. Fig. 1.

Himantopus candidus; dorso supremo & alis nigro-viridantibus; occipitio nigro; rectricibus decem intermediis ci-

nereo-albis, utrinque extimâ ferè penitùs candidâ. . . .

HIMANTOPUS.

Himantopus castaneus, rostro nigro, tibiis pedibusque sanguineis. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. II. sp. 2.*

Himantopus. *Jonst. Avi. pag.* 109. *maris & fœminæ icones ab Aldrovando mutuatæ Tab.* 52, *sub titulo*, Hæmantopus.

Charlet. Exer. pag. 112. *N°.* 3.

Charlet. Onomazt. pag. 107. *N°.* 3.

Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 316. *N°.* 6. *hujus icon minimè accurata Tab.* 267.

Himantopus Plinii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 443. *icones non satis accuratæ, maris pag.* 445, *& fœminæ pag.* 446.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 18. *hujus duæ icones minùs accuratæ, una Tab.* 11. *fig.* 1, *& altera Tab.* 13. *fig.* 2.

Marsil. Danub. Tom. V. pag. 46. *hujus icon non satis accurata Tab.* 21.

Klein. Avi. pag. 22.

Himantopus Plinii, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 219. *maris icon ab Aldrovando mutuata Tab. LIV.*

Raj. Syn. Avi. pag. 106. *N°.* 9.

Raj. Syn. Avi. pag. 190. *N°.* 7.

Himantopus Maderaspatanus, è nigro albente, cruribus rubris. *Raj. Syn. Avi. pag.* 193. *N°.* 1. *hujus icon non satis accurata Tab. I. fig.* 3.

Hæmatopus. *Gesn. Avi. pag.* 547, *in qua hujus icon non satis accurata.*

Gesn. icon. Avi. pag. 137, *in qua eadem icon.*

Charadrius supra niger, subtus albus; rostro nigro, capite longiore, pedibus rubris longissimis. Himantopus. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *sp.* 10.

Grand Chevalier d'Italie. *Bel. Portr. d'Oif. pag.* 53, *dans laquelle il y a une figure peu exacte.*

Les Grecs l'appellent Ἱμαντόποuς. *Bel.*

Les Italiens, MERLO AQUAIOLO GRANDE. *Bel.*

Les Allemands, FROEMBDER VOGEL. *Gesn.*

Les Flamands, MATHOEN. *Klein.*

Les Anglois, LONGLEGS. *Sloane. Raj.*

Les Anglois de la Jamaïque, RED LEGGED CRANE. *Raj.*

Il n'est pas si gros qu'un *Biset.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des on-

Columbæ Liviæ crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & tres lineas æquat, & ad ex-

tremos ungues unum pedem sex pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est; cauda tres pollices cum totidem lineis; pars crurum plumis denudata tres pollices & quinque lineas; pes quatuor pollices & sex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & septem lineas, extimus quindecim cum semi lineas, intimus quatuordecim lineas. Extimus digitus cum medio membranulâ, ad primum usque articulum protensâ, connectitur. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & trium pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duorum pollicum & quatuor linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput posterius nigrum est: nigredo autem, quæ per occipitium ducta, ab oculo ad oculum extenditur. Capitis anterior pars, guttur, collum, dorsum infimum, uropygium, pectus, venter, latera, crurum pars suprema, tectrices caudæ inferiores & minores superiores candore nitent. Majo-

gles d'un pied six pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long; sa queue trois pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois pouces cinq lignes; son pied quatre pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes, l'extérieur quinze lignes & demie, & l'intérieur quatorze lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds trois pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à deux pouces quatre lignes au-delà du bout de la queue. La partie postérieure de la tête est noire: cette couleur s'étend depuis un œil jusqu'à l'autre, en passant par l'occiput. La partie antérieure de la tête, la gorge, le col, la partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les petites du dessus sont d'un beau blanc. Les grandes couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-blanc. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires, & les

couvertures du deſſus & du deſſous des aîles ſont d'un noir qui a un certain luſtre de verd. Les plumes de l'aîle ſont noires, ayant auſſi un luſtre de verd, mais ſeulement en-deſſus du côté extérieur. Les moyennes plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, juſqu'au bout de la queue. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un gris-blanc; la plus extérieure de chaque côté eſt cependant preſque tout-à-fait blanche. Le bec eſt noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont rouges; & les ongles ſont noirâtres. On le trouve ſur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

res caudæ tectrices ſuperiores ſunt cinereo-albæ. Dorſi ſuprema pars, pennæ ſcapulares, alarumque tectrices ſuperiores & inferiores nigræ, quodam virore refulgentes. Remiges ſunt nigræ, cum quodam virore admixto, ſed tantùm ſuperne in latere exteriore. Minores remiges corpori finitimæ longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, ad caudam extremam pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereo-albæ; utrinque tamen extima ferè penitùs candida. Roſtrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque rubri; ungues verò nigricantes. Maris littora frequentat. *Ex muſeo Realmuriano.*

2. L'ECHASSE DU MEXIQUE.

Himantopus candidus; alis albo & nigro variis; capite ſuperiore nigro; rectricibus candidis . . . . . HIMANTOPUS MEXICANUS.

Comaltecatl. *Fern. Hiſt. Nov. Hiſp. pag.* 19. *Cap. XXII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 177.
Les Mexiquains l'appellent COMALTECATL. *Fern.*

Il eſt plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de quinze pouces,

Craſſitie præcedentem antecellit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam quindecim pollices æ-

quatuor & ad extremos ungues unum pedem novem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor pollices longum est; cauda tres pollices cum sex lineis; pars crurum plumis denudata tres pollices & sex lineas; pes quatuor pollices & septem lineas, & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas: laterales paulò sunt breviores. Capitis pars superior est nigra. Reliquum caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crurum partem supremam vestiunt pennæ candidæ. Tectrices caudæ superiores & inferiores concolores. Alæ superne & infernè albo & nigro variegantur. Cauda duodecim constat rectricibus candidis. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata & pedes rubescentes; ungues verò nigricantes. Hyeme habitat in *Mexico*.

& jusqu'à celui des ongles d'un pied neuf pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces de long; sa queue trois pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, a aussi trois pouces six lignes; son pied quatre pouces sept lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes: les latéraux sont un peu plus courts. La partie supérieure de la tête est noire. Le reste de la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les côtés sont blancs. Les aîles sont en-dessus & en-dessous variées de blanc & de noir. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rougeâtres; & les ongles noirâtres. On le trouve pendant l'hiver au *Mexique*.

LXVIII. / LXVIII.

Le Genre de l'Huitrier. / *Genus Ostralegæ.*

Son caractere est d'avoir
Trois doigts devant, dénués de membranes; & point de doigt derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec droit, très-long, applati par les côtés, & renflé vers le bout.

Hujus character est
Digiti tres antici, membranis destituti; digitus posticus nullus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Rostrum rectum, longissimum, lateraliter planum, in apice crassius.

** 1. L'Huitrier, appellé vulgairement Pie de mer.

Voyez Pl. III. Fig. 2.

Ostralega superne nigra, infernè & in uropygio alba; capite & collo nigris; minutâ maculâ infra oculos candidâ; rectricibus in exortu albis, apice nigris . . . . Ostralega, Pica marina vulgo dicta.

Ostralega. *Klein. Avi. pag.* 23.
Hæmatopus. Ostralegus. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 81. *sp.* 1.
Hæmatopus. *Gesn. Avi. pag.* 546.
Bell. Obs. pag. 18.
Charlet. Exer. pag. 111. *N°. XI.*
Charlet. Onomazt. pag. 105. *N°. XI.*
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.
Faun. Suec. Linn. N°. 161.
Moehr. Avi. Gen. 89.
Hæmatopus Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 447, *in qua hujus icon à Bellonio mutuata.*
Jonst. Avi. pag. 106.
Raj. Syn. Avi. pag. 105. *N°. A.* 7.
Hæmatopus Bellonii; Pica marina Gallorum & Anglorum. *Willugh. Ornith. pag.* 220. *hujus icon pessima Tab. LV.*

Himantopus corpore gracili & adducto, rostro pedibusque rubentibus.
Barr. Ornith. Class. IV. Gen. II. sp. 3.
Pica marina. *Charlet. Exer. pag. 76. N°.* 4.
Charlet. Onomazt. pag. 68. N°. 4.
Charlet. Exer. pag. 114. *N°. XVII.*
Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 57. sp. 1.
Preneur d'Huitres. *Catesb. Tom. I. pag.* 85; *avec une figure assez exacte Pl.* 85.
Pie de mer. *Alb. Tom. I. pag.* 68; *avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl.* 78.
Pie, ou Becasse de mer. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag.* 203, *dans laquelle il y a une mauvaise figure.*
Pie de mer, Becasse de mer. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 46 a, dans laquelle est la même figure.*
Oiseau appellé Hæmatopus marinus. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag.* 289. (*ed.* 1725).
Les Grecs l'appellent Αἱματόπους. *Bel.*
Les Gothlandois, MARSPITT. *Linn.*
Les Oëlandois, STRANDFKJURA. *Linn.*
Les Anglois, SEA-PIE. *Willugh. Raj. Charlet. Alb.* RED-SHANK. *Charlet.* OYSTER CATCHER. *Catesb.*

Crassitie *Cornicem* adæquat, superatve. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem sexdecim pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues quindecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & sesquilineam longum est; cauda quatuor pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata tres lineas; pes unum pollicem cum decem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & sex lineas, extimus quindecim lineas,

Il est pour le moins aussi gros qu'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de seize pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces une ligne & demie de long; sa queue quatre pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes; son pied un pouce dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce six lignes, l'extérieur quinze lignes, & l'intérieur treize lignes. Le doigt extérieur

est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & même un peu au-delà. Il a deux pieds sept pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, la partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un beau noir; il y a cependant quelques plumes blanches mêlées à la partie supérieure du dos & parmi les scapulaires. Au-dessous de chaque œil est une petite tache blanche. Il y a au dessous de la gorge une bande transversale variée de blanc & de noir, qui s'étend de chaque côté du col sans en faire le tour, & forme une espece de collier. La partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus des aîles sont noires : les moyennes sont de la même couleur, & terminées de blanc : les grandes les plus proches du corps sont tout-à-fait blanches, si l'on en excepte le côté extérieur qui est noirâtre vers l'origine de la plume

intimus tredecim lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum, & etiam nonnihil ultrà, productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum, septem pollicum & sex linearum; alæ verò plicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput, guttur, collum, pars dorsi suprema & scapulares pennæ nigri sunt coloris; quædam tamen pennæ candidæ in dorso supremo & inter scapulares immiscentur. Infra utrumque oculum minuta adest macula candida. Infra guttur tænia extat transversa albo & nigro variegata, in utroque colli latere protensa, collum tamen non penitùs ambiens, & torquem quodammodo efficiens. Dorsum infimum, uropygium, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, tectrices caudæ superiores & inferiores, & pennæ alas subtus obtegentes albicant. Superiores alarum tectrices minimæ sunt nigræ : mediæ concolores, albo terminatæ : majores corpori finitimæ penitùs candidæ, excepto tamen

latere

latere exteriore, in quo versùs ipsarum exortum tantùm nigricant: majores tandem à corpore remotiores penitùs nigræ. Remiges majores nigricantes; omnes autem (primâ exceptâ, pauco albo notatâ) sunt in latere interiore maximâ parte candidæ, fusco marginatæ; omnes quoque longâ notatæ maculâ albâ, super scapum versùs ipsarum extremitatem posita: quæ macula eò magìs in latere exteriore protenditur, quò remix fit corpori vicinior: minorum remigum primores albæ, nigricante terminatæ, qui color nigricans eò minus spatium occupat, quò remix fit corpori finitima: sequentes candidæ, sed ex istis quædam, illæ scilicet quæ corpori magìs appropinquant, maculâ insigniuntur nigricante, in latere exteriore versùs ipsarum extremitatem positâ: corpori tandem viciniores nigræ sunt & immaculatæ. Ultimæ istæ majorum remigum longitudinem ferè adæquant, & dum ala complicatur, nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Cauda duodecim constat rectricibus albis, nigro terminatis; color autem niger in illis eò minus spatium oc-

seulement: enfin les grandes les plus éloignées du corps sont tout-à-fait noires. Les grandes plumes de l'aîle sont noirâtres, & toutes (excepté la premiere, qui n'a que fort peu de blanc) ont la plus grande partie de leur côté intérieur blanche & bordée de brun; toutes ont aussi une longue tache blanche, placée sur leur tige vers leur extrémité: cette tache s'étend d'autant plus sur le côté extérieur, que la plume est plus proche du corps: les premieres des moyennes sont blanches & terminées de noirâtre, cette derniere couleur occupant d'autant moins d'espace, que la plume est plus proche du corps: les suivantes sont blanches, quelques-unes de celles-là, sçavoir celles qui sont les plus près du corps, étant marquées d'une tache noirâtre, placée sur leur côté intérieur vers leur extrémité: enfin les plus proches du corps sont noires & sans taches. Ces dernieres sont presqu'aussi longues que les plus grandes plumes de l'aîle, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes blanches & terminées de noir; cette derniere couleur occupe d'autant

moins d'eſpace, que la plume eſt plus extérieure ; car elle couvre la moitié de la longueur des deux du milieu, au lieu qu'elle n'occupe que le quart de la longueur de la plus extérieure de chaque côté. L'iris des yeux eſt jaune : les paupieres ſont rouges. Le bec eſt de la même couleur. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un rouge de ſang ; & les ongles ſont noirâtres. On le trouve ſur les bords de la mer, où il mange beaucoup d'*Huitres* ; ce qui lui a fait donner le nom d'*Huitrier*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

cupat, quò rectrix exterior fit; duarum enim intermediarum mediam longitudinem obtegit, dum utrinque extimæ quartam tantùm longitudinis partem occupat. Oculorum irides luteæ : palpebræ rubræ. Roſtrum pariter rubrum. Pars crurum plumis denudata, pedes ſanguinei coloris ; ungues verò nigricantes. Maris littora frequentat, ibique maximam *Oſtrearum* copiam devorat ; unde *Oſtralegæ* nomen. *Ex muſéo Realmuriano.*

SECTION III.

Ceux qui ont le bec droit, court & renflé vers le bout.

Il n'y a dans cette ſection qu'un ſeul genre, ſçavoir celui du *Pluvier*.

SECTIO III.

Eæ quæ roſtro donantur recto, brevi, in apice craſſiori.

In illa ſectione unicum continetur genus, ſcilicet *Pluvialis*.

LXIX.

Le genre du Pluvier.

Son caractere eſt d'avoir
Trois doigts devant, dénués de membranes; & point de doigt derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :

LXIX.

Genus Pluvialis.

Hujus character eſt
Digiti tres antici, membranis deſtituti ; digitus poſticus nullus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :



Dessiné et Gravé par Martinet

1. Echaſſe. 2. Huitrier

Rostrum rectum, breve, in apice crassius.

Le bec droit, court, & renflé vers le bout.

** 1. Le Pluvier doré.

Voyez Pl. IV. Fig. 1.

Pluvialis superne nigricans, maculis flavescentibus varia, inferne alba; collo inferiore & pectore griseis, maculis flavescentibus variegatis; rectricibus nigricantibus, albo-flavicantibus transversim striatis . . . . Pluvialis aurea.

Pluvialis cinereus, luteis & albis maculis. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen VII. sp.* 1.

Pluvialis. *Gesn. Avi. pag.* 714. *hujus icon non satis accurata pag.* 715. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 528. *maris icon non satis accurata pag.* 531.

Pluvialis viridis. *Willugh. Ornith. pag.* 229. *hujus icon minùs accurata Tab. LVII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 111. *N°. A.* 2.
Raj. Syn. Avi. pag. 190. *N°.* 9.
Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 318. *N°. X. hujus icon pessima Tab.* 269. *fig.* 1.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.
Linn. Syst. Nat. ed. 6. *Gen.* 61. *sp.* 2.

Pluvialis viridis, seu Pardalis. *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 54. *hujus icon minimè accurata Tab.* 25.

Pluvialis viridis Gesneri; Pardalus tertius Schwenckfeldii; Vivago Bodini; Gallina novalis media. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 415.

Pluvialis flavescens. *Jonst. Avi. pag.* 113.

Pluvialis flavo-virescens. *Charlet. Exer. pag.* 113. *N°.* 2.
Charlet. Onomazt. pag. 109. *N°.* 2.

Pardalus tertius. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 317.

Gavia viridis. *Klein. Avi. pag.* 19. *N°.* 2.

Charadrius nigro lutescenteque variegato, pectore concolore. *Faun. Suec. Linn. N°.* 157.

Charadrius pedibus cinereis, corpore nigro viridique maculato, subtus albido. Pluvialis. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *sp.* 8.

Charadrius. *Moehr. Avi. Gen.* 90.

Gorriones o Pardales de Oviedo. *Raj. Sloane.*

Pluvier. *Bel. Hist. nat. des Oiss. pag.* 260.

Pluvier verd. *Alb. Tom. I. pag.* 66; *avec une figure mal coloriée Pl.* 75.

Les Catalans l'appellent Dorada. *Barr.*

Les Italiens, Piviero. *Marsil.*

Les Boulonnois, PIVIER. *Aldrov. Jonst.*
Les Allemands, PULVIER. *Gesn. Aldrov.* PULVER; PULRÖSZ. *Gesn. Aldrov. Jonst.* SEE TAUBE; GROSSER BRACH-VOGEL. *Schwenck.* GREUNER KEUWIT. *Rzac.*
Les Siléfiens, BRACH-VOGEL. *Schwenck.*
Les Polonois, PTAK DESSCZOWY. *Rzac.*
Les Suédois, AOKERHOENS. *Linn.*
Les Dalécarliens, AOKERHOENA, *ou* AOKERHOENS. *Linn.*
Les Lapons, HUTTI. *Linn.*
Les Anglois, GREEN PLOVER. *Willugh. Raj. Charlet. Sibbald.* WHISTLING PLOVER. *Charlet.*
Les Anglois de la Jamaïque, GREY PLOVER. *Sloane.*

Il eſt de la groſſeur d'une *Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de dix pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de dix pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; ſa queue trois pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſept lignes; ſon pied un pouce ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes & demie, l'extérieur dix lignes & demie, & l'intérieur neuf lignes & demie. Le doigt extérieur eſt réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a un pied ſix pouces huit lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Les parties ſupérieures de la tête & du col, le

Cum Turture craſſitie convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam decem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tredecim lineas longum eſt; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata ſeptem lineas; pes unum pollicem cum ſex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim cum ſemi lineas, extimus decem cum ſemi lineas, intimus novem cum ſemi lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extenſâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum unius pedis ſex pollicum & octo linearum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam ex-

tremam attingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium pennis vestiuntur nigricantibus, maculis flavescentibus ad margines variegatis. Scapulares similiter nigricant, & iisdem maculis variegantur. Su[illegible] caudæ tectrices sunt [illegible] & flavescente transv[illegible]atæ. Basim rostri circumdant plumulæ griseæ, maculis fuscis variegatæ. Oculorum ambitus albicat. Genæ, sicut & collum ad latera, fusco & sordidè flavescente variegantur. Guttur candicans, minutis maculis griseo-fuscis varium. Pennæ collum inferius vestientes sunt in medio griseo-fuscæ, ad margines dilutiùs griseæ, & minutis maculis sordidè flavescentibus variæ. Quæ pectus obtegunt, iisdem variegantur coloribus, sed paulò magis, præsertim ad pectoris latera, flavescunt. Venter & crurum suprema pars albent; attamen crurum pars suprema pauco fusco & flavicante exteriùs tantùm variegatur. Inferiores caudæ tectrices pariter albicant; sed ex istis extimæ sunt in latere exteriore tantùm nigricante & flavescente transversim striatæ. Fusco &

dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres, variées sur leurs bords de taches jaunâtres. Les plumes scapulaires sont de la même couleur. Les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement de noirâtre & de jaunâtre. La bâse du bec est entourée de petites plumes grises, variées de taches brunes. Le tour des yeux est blanc. Les joues & les côtés du col sont variés de brun & de jaunâtre sale. La gorge est blanchâtre, & variée de petites taches d'un gris-brun. La partie inférieure du col est couverte de plumes d'un gris-brun dans leur milieu, d'un gris plus clair sur leurs bords, & variées de petites taches d'un jaunâtre terni. Celles qui couvrent la poitrine, sont variées des mêmes couleurs, mais il y a un peu plus de jaunâtre, sur-tout vers les côtés de la poitrine. Le ventre & le haut des jambes sont blancs; cependant le haut des jambes est varié d'un peu de brun & de jaunâtre du côté extérieur seulement. Les couvertures du dessous de la queue sont pareillement blanches; mais celles qui sont les plus extérieures, sont rayées transversalement de noirâtre & de jaunâtre, & cela du côté extérieur seulement. Les

côtés sont variés de brun & de jaunâtre. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches; celles qui sont vers les bords, sont variées de gris-brun; & de ces dernieres les plus grandes sont d'un cendré clair. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont noirâtres, & variées sur leurs bords de taches jaunâtres: les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & bordées de blanc par le bout seulement. Les plumes de l'aîle sont en-dessous d'un cendré clair, & en-dessus elles sont d'un brun brillant & comme doré, & ont leur tige blanche vers leur extrémité: les moyennes sont de plus bordées de blanc par le bout; cependant de celles-la les plus proches du corps sont noirâtres, & variées sur leurs bords de taches jaunâtres. Ces dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La premiere des plumes de l'aîle est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes noirâtres, rayées de bandes transversales d'un blanc-jaunâtre, posées obliquement sur chacun de leurs côtés,

flavicante latera variegantur. Pennæ alas subtus obtegentes sunt candidæ; quæ versùs margines locum obtinent, griseo-fusco variegatæ; & ex istis majores sunt dilutè cinereæ. Tectrices [illegible]rum superiores minores, sicut & majores [illegible]timæ, nigrica[illegible] [illegible]ulis flavescentib[illegible] [illegible]gines variegatæ: majores à corpore remotiores fuscæ, albo in apice tantùm fimbriatæ. Remiges sunt subtus dilutè cinereæ, superne verò splendidè fuscæ & quasi auro perlustratæ, ipsarum scapis versùs extremitatem candidis: minores sunt insuper albo in apice marginatæ; ex minoribus tamen corpori viciniores sunt nigricantes, & maculis flavescentibus ad margines variæ. Quæ novissimè descriptæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad duas ferè tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Remix prima reliquas omnes longitudine superat. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes, tæniis striatæ transversis albo-flavicantibus, in utroque latere obliquè positis, & simul efficientibus angulum, cujus apex rectricis

ſcapo inſidet. Oculorum pupilla nigra : ipſorum irides obſcurè rubræ. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigricantes. In campeſtribus locis habitat, & juxta aquas quandoque verſatur. *Ex muſeo Rea*[illegible]

& formant enſemble un angle, dont le ſommet eſt ſur la tige de la plume. La prunelle des yeux eſt noire : leur iris eſt d'un rouge obſcur. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont noirâtres. On le trouve dans les champs & aux bords des eaux. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

2. LE PETIT PLUVIER DORÉ.

Pluvialis ſuperne nigricans, maculis flaveſcentibus varia, infernè alba ; rectricibus nigricantibus, albo-flavicante ad margines maculatis . . . . PLUVIALIS AUREA MINOR.

Pluvialis altera ſpecies. *Geſn. Avi. pag.* 716, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Pluvialis, ſeu Pardalus minor ; Gallina novalis minor Schwenckfeldii. *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag.* 415.
Pardalus quartus. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 318.
Les Allemands l'appellent KLEINER BRACH-VOGEL. *Schwenck. Rzac.*

Magnitudine & craſſitie nonnihil præcedenti cedit. Roſtrum habet ab ipſius apice ad oris angulos unum pollicem longum. Caput, pars colli ſuperior, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, alas ſuperne veſtientes & ſuperiores caudæ tectrices nigricant, & flaveſcentibus variegantur maculis. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, crurum pars ſuprema, tectrices

Il eſt un peu moins grand & moins gros que le précédent. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a un pouce de long. La tête, la partie ſupérieure du col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus des aîles & celles du deſſus de la queue ſont d'un noirâtre varié de taches jaunâtres. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couver-

tures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les aîles sont fort longues. Leurs grandes plumes sont moitié brunes & moitié blanches selon leur longueur : les moyennes sont tout-à-fait brunes. La queue est composée de douze plumes noirâtres, variées sur leurs bords de taches d'un blanc-jaunâtre. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaunâtre obscur; & les ongles noirs. On le trouve dans les champs & aux bords des eaux.

caudæ inferiores & pennæ alas subtus obtegentes albicant. Alæ longæ sunt. Ipsarum majores remiges sunt fuscæ, attamen mediotenùs secundùm longitudinem candidæ: minores penitùs fuscæ. Caudam componunt duodecim rectri[illegible]icantes, albo-f[illegible]d margines ma[illegible]trum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque obscurè lutescentes; ungues verò nigri. In campestribus locis & juxta aquas degit.

** 3. Le Pluvier doré de S. Domingue.

Voyez Pl. VI. Fig. 1.

Pluvialis superne nigricans, maculis flavescentibus varia, infernè alba; collo inferiore & pectore dilutè griseis, marginibus pennarum flavescentibus; rectricibus fuscis, albo-flavicante ad margines maculatis . . . . Pluvialis Dominicensis aurea.

Il est à peu près de la grosseur du *nôtre*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces une ligne. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue

Pluvialem auream nostratem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues decem pollices cum linea una. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque

usque unum pollicem longum est ; cauda duos pollices & octo lineas ; pars crurum plumis denudata undecim lineas ; pes unum pollicem cum sex lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus decem lineas, intimus [illegible] cum semi lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis octo pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ ad decem linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ nigricantes, maculis flavescentibus ad margines variegatæ. Superiores caudæ tectrices sunt fuscæ, flavicante transversim striatæ. Basim rostri ambiunt plumulæ albo-rufescentes. Guttur ex albo quoque rufescit. Partem colli inferiorem & pectus obtegunt pennæ dilutè griseæ, marginibus flavescentibus præditæ. Venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices albicant ;

deux pouces huit lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, onze lignes ; son pied un pouce six lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur dix lignes, & l'intérieur huit lignes & demie. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied huit pouces six lignes de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à dix lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres, variées sur leurs bords de taches jaunâtres. Les couvertures du dessus de la queue sont brunes, & rayées transversalement de jaunâtre. La bâse du bec est entourée de petites plumes d'un blanc-roussâtre. La gorge est de la même couleur. La partie inférieure du col & la poitrine sont couvertes de plumes d'un gris clair, bordées de jaunâtre. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs ; les côtés sont cependant variés d'un peu de gris. Les couvertures du dessous des aîles

ſont blanches ; celles qui ſont vers les bords, ſont variées de gris-brun ; & de ces dernieres les plus grandes ſont d'un cendré clair. Les plumes ſcapulaires, les petites & les grandes couvertures du deſſus des aîles les plus proches du corps ſont de la même couleur que les plumes du dos : les ſuivantes, grandes & petites, ſont d'un gris-brun, variées ſur leurs bords de taches blanchâtres : les petites & les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un brun foncé, mais les grandes ſont bordées de blanchâtre par le bout. Les plumes de l'aîle ſont d'un cendré clair en-deſſous, brunes en-deſſus, & ont leur tige blanche vers leur extrémité : les moyennes ſont de plus bordées de blanchâtre par le bout ; cependant de celles-là les plus proches du corps ſont d'un brun foncé, & variées ſur leurs bords de taches jaunâtres. Ces dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, juſque vers les trois quarts de la longueur de la queue. Les deux premieres des plumes de l'aîle ſont les plus longues de toutes. La queue eſt compoſée de douze plumes brunes, variées ſur leurs bords de taches d'un blanc-jaunâtre. Le bec eſt noir. La par-

attamen latera pauco variegantur griſeo. Pennæ alas ſubtus cooperientes albent ; quæ verſùs margines locum tenent, griſeo-fuſco variegantur ; & ex iſtis majores ſunt dilutè cinereæ. Scapulares, ſuperiores alarum tectrices majores & minores corpori finitimæ, his dorſum veſtientibus concolores : quæ ſequuntur, majores ſcilicet & minores, griſeo-fuſcæ, maculis candicantibus ad margines variegatæ : minores & majores à corpore remotiores ſaturatè fuſcæ, majoribus tamen albido in apice fimbriatis. Alarum remiges ſunt ſubtus dilutè cinereæ, ſuperne fuſcæ, ipſarum ſcapis verſùs extremitatem candidis : minores ſunt inſuper candicante in apice marginatæ ; ex minoribus tamen corpori finitimæ ſunt ſaturatè fuſcæ, maculis flaveſcentibus ad margines variegatæ. Quæ nuper deſcriptæ longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes uſque protenduntur. Binæ primores remiges reliquarum omnium longitudinem excedunt. Cauda duodecim conſtat rectricibus fuſcis, albo-flavicante

ad margines maculatis. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque sunt grisei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Dominicensi Insula*, unde in *musæum Realmurianum* missa à *D. Chervain*.

tie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont gris; & les ongles noirâtres. On le trouve à *S. Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

4. LE PLUVIER DORÉ DE LA BAYE DE HUDSON.

Pluvialis supernè nigricans, maculis flavo-aurantiis varia, infernè nigra; tæniâ in syncipite albâ, supra oculos & secundùm colli latera protensâ, collum inferius ambiente; rectricibus fusco & nigro transversim striatis .... PLUVIALIS AUREA FRETI HUDSONIS.

Pluvialis nigro-flavus. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 61. sp. 1.*
Charadrius nigro-lutescente variegatus, pectore nigro. *Faun. Suec. Linn. N°. 156.*
Charadrius pectore nigro, rostro basi gibbo, pedibus cinereis. Charadrius apricarius. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 79. sp. 7.*
Pluvier moucheté. *Edwards. Tom. III. pag. CXL ; avec une figure exacte Pl. 140.*
Les Anglois l'appellent SPOTTED-PLOVER. *Edwards.*
Les Anglois de la Baye de Hudson, HAWK'S-EYE. *Edwards.*
Les Suédois, AOKERHOENS. *Linn.*
Les Oelandois, ALWARGRIM *ou* ALFWARGRIM. *Linn.*
Les Smolandois, MYRPYTTA. *Linn.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices æquat, & ad extremos ungues undecim pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem longum est; cauda duos pollices cum octo lineis; pars

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces dix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue deux pouces huit lignes; la partie de ses jambes qui est dé-

garnie de plumes, ſix lignes; ſon pied deux pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce, l'extérieur dix lignes, & l'intérieur neuf lignes. Le doigt extérieur eſt réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. Les parties ſupérieures de la tête & du col, le dos & le croupion ſont couverts de plumes noirâtres, variées ſur leurs bords de taches d'un jaune brillant & tirant ſur l'orangé. Les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur. La bâſe du demi-bec ſupérieur eſt entourée d'une petite ligne de plumes noires; au-deſſus de laquelle eſt une bande blanche, qui s'étend de chaque côté, paſſe par-deſſus les yeux, & ſe courbant enſuite, deſcend tout le long des côtés du col, va en entourer la partie inférieure immédiatement au-deſſus de la poitrine, & forme une eſpece de collier. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés ſont noirs. Les couvertures du deſſous de la queue ſont de la

crurum plumis denudata ſex lineas; pes duos pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem, extimus decem lineas, intimus novem lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extenſâ. Alæ complicatæ nonnihil ultra caudam extremam protenduntur. Pennæ partes capitis & colli ſuperiores, dorſum & uropygium veſtientes ſunt nigricantes, maculis ex ſplendidè luteo ad aurantium colorem vergentibus ad margines variæ. Scapulares & ſuperiores caudæ tectrices concolores. Baſim mandibulæ ſuperioris circumdat lineola plumulis nigris conflata, ſupra quam tænia extat alba, utrinque extenſa, ſupra oculos ducta, indeque reflexa, ſecundùm colli latera protenditur, collum inferius ſupra pectus ambit, & torquem quodammodo efformat. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera & crurum pars ſuprema nigri ſunt coloris. Inferiores caudæ tectrices ſimili nigro imbutæ, maculis candidis variegatæ. Pennæ alas ſubtus obtegentes cinereo-fuſcæ,

Alarum margines, ab articulo carpo humano respondente ad alas extremas, vestiunt plumulæ nigricantes, albo fimbriatæ. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori viciniores, nigricantes, maculis ex splendidè luteo ad aurantium colorem inclinantibus ad margines variæ: majores à corpore remotiores nigricantes, pauco candido in apice marginatæ. Remiges majores obscurè nigræ, nigro nonnihil dilutiore fimbriatæ: minores fusco & nigro transversim striatæ. Ex minoribus corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, duas ferè tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus minoribus concolores. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Freto Hudsonis*, & in Septentrionali *Sueciæ* regione.

même couleur, & variées de taches blanches. Celles du dessous des aîles sont d'un cendré-brun. Le bord de l'aîle, depuis le pli qui répond à celui du poignet, jusqu'à son extrémité, est couvert de petites plumes noirâtres, & bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont noirâtres, & variées sur leurs bords de taches d'un jaune brillant & tirant sur l'orangé: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées d'un peu de blanc par le bout. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un noir sombre, bordées d'une couleur un peu plus claire: les moyennes sont rayées transversalement de brun & de noir. De celles-là les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aîle. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à la *Baye de Hudson* & dans le Nord de la *Suéde*.

** 5. Le petit Pluvier ou le Guignard.

Voyez le mâle Pl. IV. Fig. 2.

Pluvialis superne griseo-fusca, marginibus pennarum rufescentibus, infernè rufescens; capite superiore fuliginoso, rufescente vario; tæniâ ponè oculos albo-rufescente; (ventre supremo fuliginoso *mas*); imo ventre albo; rectricibus griseis, apice fuscis, quatuor utrinque extimis albo terminatis . . . . Pluvialis minor sive Morinellus.

Morinellus. *Charlet. Exer. pag.* 111. *N°. I.*
Charlet. Onomazt. pag. 106. *N°. I.*
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.
Linn. Systh. Nat. ed. 6. *Gen.* 61. *sp.* 3. (*Mas*).
Morinellus Avis Anglica. *Gesn. Avi. pag.* 615, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Morinellus Anglorum. *Gesn. icon. Avi. pag.* 131, *in qua eadem icon.*
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 540, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Willugh. Ornith. pag. 230. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LV; & insuper altera icon minimè accurata Tab. LVII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 111. *N°. A.* 4.
Charadrius pectore ferrugineo: lineâ albâ transversâ collum pectusque distinguente. *Faun. Suec. Linn. N°.* 158. (*Mas*).
Charadrius abdomine rufescente, pectore cinereo, vertice fusco. *Faun. Suec. Linn. N°.* 160. (*Fœmina*).
Charadrius Lapponicus. *Linn. Syst. Nat. ed.* 6. *Gen.* 61. *sp.* 5. (*Fœmina*).
Charadrius pectore ferrugineo, fascia superciliorum pectorisque lineari alba, pedibus nigris. Morinellus. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *sp.* 6.
Gavia Morinellus simpliciter. *Klein. Avi. pag.* 21. *N°.* 5.
Dotralle des Anglois. *Alb. Tom. II. pag.* 40; *avec des figures passables, du mâle Pl.* 61, *& de la femelle Pl.* 62.
Les Anglois l'appellent Dotterell. *Gesn. Aldrov. Raj.* Dotterel. *Willugh. Charlet.* Dottrell. *Willugh.* Dotteril. *Alb.*
Les Lapons, Lahul. *Linn.*

Il n'est pas si gros que le *Pluvier doré*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pou-

Pluviali aureæ crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex li-

neas æquat, & ad extremos ungues octo pollices & totidem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque novem cum ſemi lineas longum eſt; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata quinque cum ſemi lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas, extimus octo lineas, intimus ſeptem lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum ſexdecim pollicum & quatuor linearum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Synciput obtegunt pennæ griſeæ, in utroque latere albido marginatæ. Quæ partem capitis ſuperiorem & occipitium veſtiunt, ſunt fuliginoſæ, in utroque latere rufeſcente fimbriatæ. In utroque capitis latere tænia extat albo-rufeſcens, ab oculo infra occipitium uſque protenſa. Pars colli ſuperior, ſicut & dorſi ſuprema, ſcapulareſque pennæ ſunt griſeo-fuſcæ, marginibus pennarum rufeſcentibus. Pennæ

ces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de huit pouces huit lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a neuf lignes & demie de long; ſa queue deux pouces trois lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, cinq lignes & demie; ſon pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes, l'extérieur huit lignes, & l'intérieur ſept lignes. Le doigt extérieur eſt réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a ſeize pouces quatre lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. Le ſynciput eſt couvert de plumes griſes, bordées des deux côtés de blanchâtre. Celles qui couvrent le deſſus de la tête & l'occiput, ſont de couleur de ſuie, & bordées des deux côtés de rouſſâtre. De chaque côté de la tête eſt une bande d'un blanc-rouſſâtre, qui s'étend depuis l'œil juſqu'au-deſſous de l'occiput. Les parties ſupérieures du col & du dos, & les plumes ſcapulaires ſont d'un gris-brun, chaque plume étant bordée de rouſſâtre. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le

croupion, ainsi que les couvertures du dessus de la queue, sont grises, & bordées pareillement de roussâtre. Les côtés de la tête sont d'un blanc-roussâtre, chaque plume étant marquée d'une petite ligne brune, qui s'étend selon la longueur de sa tige. La gorge est blanchâtre. La partie inférieure du col est d'un gris mêlé d'un peu de roussâtre. La poitrine & les côtés sont d'un roussâtre, qui devient de plus en plus foncé en approchant du ventre. Le haut du ventre est de couleur de suie. Le bas-ventre & le haut des jambes sont blancs. Les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont de la même couleur. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un gris-brun, & bordées de roussâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont grises. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes : les vingt premieres sont d'un gris-blanc en-dessous ; mais en-dessus les six premieres sont d'un gris tirant sur le roussâtre, & la tige de la premiere est blanche : les quatre suivantes, sçavoir depuis la septiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont grises, & bordées d'un peu de roussâtre

verò dorsum infimum & uropygium vestientes, sicut & superiores caudæ tectrices, sunt griseæ, ipsarum marginibus similiter rufescentibus. Caput ad latera ex albo rufescit, quælibet tamen penna lineolâ insignitur fuscâ, secundùm ipsius scapi longitudinem ductâ. Guttur candicat. Pars colli inferior est grisea, pauco rufescente mixta. Pectus & latera rufescunt; color autem rufescens, versùs ventrem procedendo, magìs magìsque fit saturatior. Venter supremus fuliginoso imbuitur colore. Venter imus & crurum suprema pars albicant. Inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes similiter albicantes. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt griseo-fuscæ, rufescente marginatæ : majores à corpore remotiores griseæ. Alam componunt viginti quatuor remiges : viginti primores sunt subtus cinereo-albæ; superne verò sex primores ex griseo ad rufescentem vergentes colorem, prioris scapo candido : quatuor proximè sequentes, à septima scilicet ad decimam usque inclusivè, griseæ,

griseæ, pauco rufescente in apice marginatæ : decem quæ sequuntur, ab undecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, griseæ, per totam circumferentiam albo fimbriatæ : quatuor corpori viciniores griseo-fuscæ, marginibus rufescentibus prædítæ. Quæ novissimè descriptæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur : quatuor intermediæ griseæ, attamen versùs apicem fuscæ : quatuor utrinque extimæ concolores, sed albo terminatæ, albore scilicet eò majus spatium occupante, quò rectrix exterior fit : binæ insuper utrinque extimæ oris quoque exterioribus albis præditæ sunt. Rostrum, unguesque nigri ; pars crurum plumis denudata & pedes fusci.

Fœmina à *mare* discrepat ventre supremo nequaquam fuliginoso. In reliquis cum illo satis perfectè convenit.

In campestribus locis habitant, & juxta aquas quandoque degunt. *Ex museo Realmuriano.*

par le bout : les dix qui suivent, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont grises, & bordées de blanc dans toute leur circonférence : les quatre plus proches du corps sont d'un gris-brun, & bordées de roussâtre. Ces dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les quatre du milieu sont grises, excepté vers le bout, où elles sont brunes : les quatre plus extérieures de chaque côté sont de la même couleur, & terminées de blanc, cette couleur occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus extérieure : de plus les deux plus extérieures de chaque côté sont aussi bordées extérieurement de blanc. Le bec & les ongles sont noirs ; la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont bruns.

La *femelle* différe du *mâle* en ce qu'elle n'a point le haut du ventre de couleur de suie. Du reste elle lui ressemble assez bien.

On les trouve dans les champs, & quelquefois aux bords des eaux. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

6. Le Guignard d'Angleterre.

Pluvialis ſuperne griſeo-fuſca, marginibus pennarum flaveſcentibus, infernè albo-fulveſcens; capite ſuperiore albo, flaveſcente & griſeo-fuſco vario; tæniâ ſupra oculos candidâ; rectricibus binis intermediis griſeo-fuſcis, lateralibus albis.... Morinellus Anglicanus.

Gavia Morinella altera. *Klein. Avi. pag.* 21. *N°.* 7.
Dotralle de la Province de Lincoln. *Alb. Tom. II. pag.* 40; *avec une figure mauvaiſe & mal coloriée Pl.* 63.
Les Anglois l'appellent Dottrel. *Alb.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ neuf pouces. Son bec a près d'un pouce de long. Il a environ un pied cinq pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt joliment variée de blanc, de jaunâtre & de gris-brun. De chaque côté de la tête eſt une bande blanche, qui paſſe pardeſſus les yeux, & s'étend juſque vers l'occiput. La partie ſupérieure du col eſt d'un gris-brun. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus des aîles & celles du deſſus de la queue, ainſi que l'aîle bâtarde, ſont de la même couleur, chaque plume étant bordée de jaunâtre. La

Cum præcedente craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam novem circiter pollices æquat. Roſtrum habet unum ferè pollicem longum. Alis expanſis, extremitates majorum remigum unius pedis & quinque pollicum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Capitis pars ſuperior albo, flaveſcente & griſeo-fuſco eleganter variegatur. In utroque capitis latere tænia extat candida, ſupra oculos ducta, & verſùs occipitium uſque producta. Collum ſuperius eſt griſeo-fuſcum. Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, quæ alas ſuperne cooperiunt, ala notha & ſuperiores caudæ tectrices ſunt

quoque griseo-fuscæ, marginibus pennarum flavescentibus. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum pars suprema, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albicant & aliquid fulvescentis admixtum habent. Remiges majores sunt nigræ; prior tamen in latere exteriore alba est : minores eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ sunt griseo-fuscæ : laterales omnes albæ. Oculorum pupilla nigra ; ipsorum irides candicantes. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque virescentes; ungues verò nigricantes. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Habitat in *Anglia* in *Comitatu Lincolniæ*.

gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un blanc mêlé d'une légere teinte de fauve. Les grandes plumes de l'aîle sont noires, excepté le côté extérieur de la premiere, qui est blanc : les moyennes sont de la même couleur que le dos. De ces dernieres les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes:les deux du milieu sont d'un gris-brun : toutes les latérales sont blanches. La prunelle des yeux est noire; & leur iris est blanchâtre. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verdâtres ; & les ongles noirâtres. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Angleterre* dans le *Comté de Lincolne*.

** 7. Le Pluvier a collier.

Voyez Pl. V. Fig. 1.

Pluvialis ſuperne griſeo-fuſca, infernè alba; tæniâ ſupra oculos albo-rufeſcente; torque duplici, ſupremo albo, infimo nigricante; rectricibus octo intermediis griſeo-fuſcis, versùs apicem nigricantibus, apice albis, binis utrinque extimis candidis, extimâ exteriùs griſeo-fuſco, proximè ſequenti interiùs nigricante maculatâ . . . . Pluvialis torquata.

An Charadrius fuſcus, fronte collarique dorſali abdomineque albis, rectricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus nigris. Charadrius Alexandrinus? *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *ſp.* 3.

An Charadrius faſciâ pectorali nigrâ, ſuperciliis albis, rectricibus apice albis faſciâ nigrâ, pedibus cœruleis. Charadrius Ægyptius? *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *ſp.* 5.

Il eſt un peu plus gros que le *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de ſept pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de ſept pouces cinq lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a ſept lignes & demie de long; ſa queue deux pouces deux lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſix lignes & demie; ſon pied onze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes, l'extérieur huit lignes, & l'intérieur ſix lignes & demie. Le doigt extérieur eſt réuni avec celui du milieu par

Craſſitie *Turdum Iliacum* paululùm antecellit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam ſeptem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues ſeptem pollices & quinque lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ſeptem cum ſemi lineas longum eſt; cauda duos pollices cum totidem lineis; pars crurum plumis denudata ſex cum ſemi lineas; pes undecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas, extimus octo lineas, intimus ſex cum ſemi lineas. Extimus digitus cum

medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Capitis pars superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices griseo-fusco imbuuntur colore. Synciput ex albo ad rufescentem colorem nonnihil inclinat: rufescens autem color utrinque supra oculos protenditur. Caput ad latera griseo-fuscum quidem, sed quàm in capite superiore saturatiùs. Guttur candidum. Partem colli capiti finitimam cingit torquis pariter albus, infra quem alius extat torquis nigricans, priore majorem obtinens latitudinem, & pectori dorsoque supremis paululùm insidens. Pectus, venter, latera, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albi sunt coloris. Crurum suprema pars est in latere exteriore grisea, in interiore candida. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori viciniores, sunt dorso concolores, qui-

une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a quatorze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun. Le synciput est d'un blanc tirant un peu sur le roussâtre: cette couleur s'étend de chaque côté au-dessus des yeux. Les côtés de la tête sont d'un gris-brun plus foncé que celui du dessus de la tête. La gorge est blanche. La partie du col qui est la plus voisine de la tête est entourée d'un collier de la même couleur, au-dessous duquel en est un autre noirâtre & plus large que le premier, qui porte un peu sur le haut de la poitrine & du dos. La poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Le haut des jambes est gris du côté extérieur, & blanc du côté intérieur. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos, quelques-unes étant bordées de blanc: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un

brun-noirâtre. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur, ayant cependant la plus grande partie de leur côté intérieur blanche; de plus les trois premieres ont vers les deux tiers de leur longueur leur tige blanche; & les six suivantes, sçavoir depuis la quatriéme jusqu'à la neuviéme inclusivement, ont dans le même endroit une longue tache blanche, qui s'étend sur leur côté extérieur: les moyennes plumes de l'aile sont blanches & terminées obliquement de brun-noirâtre; cependant les quatre plus proches du corps sont de la même couleur que le dos; & les deux suivantes sont entiérement blanches. Ces six plumes se terminent en pointe; mais les quatre plus proches du corps sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La premiere des plumes de l'aîle est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont d'abord d'un gris-brun, ensuite noirâtres vers leur extrémité, & terminées de blanc sale: les trois qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont de la même couleur, mais elles sont terminées de blanc: les deux plus extérieures

busdam tamen albo marginatis: majores à corpore remotiores ex fusco nigricant. Remiges alarum majores similiter fusco-nigricantes, attamen in latere interiore maximâ parte albæ; trium insuper priorum scapi versùs duas tertias longitudinis partes albent; & sex remiges proximè sequentes, à quarta scilicet ad nonam usque inclusivè, eodem in loco longiusculâ insigniuntur maculâ candidâ, in latere exteriore protensâ: minores remiges candidæ, fusco-nigricante obliquè terminatæ; quatuor tamen corpori finitimæ eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur; & binæ proximè sequentes penitùs albicant. Quæ sex novissimè descriptæ remiges in acumen desinunt; quatuor verò corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, ad duas tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Remix prima reliquarum omnium longitudinem excedit. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ primùm griseo-fuscæ, dein versùs extremitatem nigricantes, sordidè albo terminatæ:

tres utrinque proximè sequentes concolores, apicibus tamen albis præditæ: binæ utrinque extimæ penitùs candidæ; extima tamen versùs ipsius extremitatem maculâ insignitur griseo-fuscâ, in latere exteriore collocatâ; & proximè sequens minutis quibusdam notatur maculis nigricantibus, in latere interiore positis. Rostrum, unguesque nigri sunt coloris; pars crurum plumis denudata, pedesque rubri. Maris littora frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

de chaque côté sont entiérement blanches; cependant la plus extérieure est marquée vers son extrémité d'une tache de gris-brun, placée sur son côté extérieur; & la suivante est marquée de quelques petites taches noirâtres, placées sur son côté intérieur. Le bec & les ongles sont noirs; la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges. On le trouve aux bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 8. LE PETIT PLUVIER A COLLIER.

Voyez Pl. V. Fig. 2.

Pluvialis superne griseo-fusca, infernè alba; tæniâ in syncipite transversâ candidâ, nigro circumdatâ; fasciâ per oculos nigrâ; torque duplici, supremo albo, infimo nigro; rectricibus octo intermediis griseo-fuscis, versùs apicem nigricantibus, tribus utrinque lateralibus apice albis, sequenti in exortu & apice albâ, in medio fusco-nigricante, utrinque extimâ candidâ, interiùs fusco-nigricante maculatâ . . . . PLUVIALIS TORQUATA MINOR.

Charadrius pectore nigro, fronte nigricante lineolâ albâ, vertice fusco. *Faun. Suec. Linn N°.* 159.
Charadrius pectore nigro, fronte nigricante fasciolâ albâ, vertice fusco, pedibus luteis. Hiaticula. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *sp.* 2.
Charadrius. *Charlet. Exer. pag.* 114. *N°. XV.*
Charlet. Onomazt. pag. 109. *N°. XV.*
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.
Charadrios, sive Hiaticula. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 536. *hujus icon non satis accurata pag.* 537.

Charadrius, Gazæ Hiaticula. *Jonst. Avi. pag.* 114. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53, *sub titulo*, Charadrios.

Charadrius sive Hiaticula. *Willugh. Ornith. pag.* 230. *hujus icon minùs accurata Tab. LVII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 112. *N°. A.* 6.

Raj. Syn. Avi. pag. 190. *N°.* 13.

Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 319. *N°. XIII. hujus icon pessima Tab.* 269. *fig.* 2.

Charadrius, seu Hiaticula Willughby; Icterus; Galgulus aliorum. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 370.

Hiaticula. *Linn. Systh. Nat. ed.* 6. *Gen.* 61. *sp.* 4.

Gavia littoralis. *Klein. Avi. pag.* 21. *N°.* 6.

Matuitui Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 199, *in qua hujus icon pessima.*

Jonst. Avi. pag. 136. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 58.

Alouette de mer. *Alb. Tom. I. pag.* 70; *avec une figure passable Pl.* 80.

An Pluvier, ou Pluvialis miniatis cruribus? *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag.* 410. (*ed.* 1725).

Les Grecs l'appellent Χαραδριος. *Aldrov.*

Les Polonois, Zoltaczek. *Rzac.*

Les Suédois, Strandpipare. *Linn.*

Les Lapons, Pago. *Linn.*

Les Anglois, Sea-Lark. *Willugh. Raj. Sloane. Sibbald. Alb.*

Les Brasiliens, Matuitui. *Marcgr. Jonst.*

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes de long, sa queue deux pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes; son pied onze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes & demie, l'extérieur sept lignes & demie;

Præcedenti nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem sex pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues sex pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem lineas longum est; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes undecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue novem cum semi lineas, extimus septem cum semi

femi lineas, intimus sex lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Basim mandibulæ superioris ambit tænia nigra, quæ deinde majorem obtinens latitudinem, in utroque capitis latere per oculos ducta, ab oris angulis ad aures usque protenditur, & tæniam insuper transversam simili nigro imbutam in parte superiore capitis efformat. Niger autem color latam circumdat tæniam transversam candidam, ab interiore cantho unius oculi ad alterius canthum interiorem extensam, & per syncíput ductam. Reliquum caput superius est griseo-fuscum. Guttur & colli suprema pars albicant; quæ albedo quodammodo torquem efficit, infra quem alius extat latiusculus torquis niger. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices sunt griseo-fuscæ. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albore nitent. Superiores alarum tectrices minimæ & me-

& l'intérieur six lignes. Il a quatorze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La base du demi-bec supérieur est entourée d'une bande noire, qui devient ensuite plus large, s'étend de chaque côté de la tête depuis les coins de la bouche jusqu'aux oreilles, en passant par les yeux, & forme de plus sur la partie supérieure de la tête une bande transversale de la même couleur: le noir entoure une large bande transversale blanche, qui s'étend depuis l'angle intérieur d'un œil jusqu'à l'angle intérieur de l'autre, & passe par le sinciput. Le reste de la partie supérieure de la tête est d'un gris-brun. La gorge & le haut du col sont blancs; ce qui forme une espece de collier, au-dessous duquel est un autre collier noir passablement large. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun: les grandes les plus proches du corps sont

de la même couleur, & terminées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, quelques-unes d'entr'elles étant bordées de blanc par le bout. L'aîle est composée de vingt-six plumes : les dix premieres sont d'un brun d'autant plus foncé, que la plume est plus éloignée du corps; & une grande partie de leur côté intérieur est blanchâtre : de celles-là les quatre premieres ont leur tige blanche depuis environ les deux tiers de leur longueur jusque vers leur bout; les six autres ont dans le même endroit une tache blanche, placée du côté extérieur, & qui devient d'autant plus grande, que la plume se rapproche plus du corps : les neuf suivantes, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la dix-neuviéme inclusivement, sont blanches à leur origine & dans une grande partie de leur côté intérieur; le reste est d'un gris-brun & bordé de blanc; cette bordure est d'autant plus large, que la plume est plus proche du corps : la vingtiéme & la vingt-uniéme sont blanches; & ont seulement une tache d'un gris-brun, placée du côté intérieur, & qui est beaucoup plus grande sur la vingt-uniéme plume que sur la précédente : les cinq plus proches

diæ sunt griseo-fuscæ: majores corpori viciniores concolores, albo terminatæ : majores à corpore remotiores nigricantes; ex istis tamen quædam albo in apice marginantur. Viginti sex remigibus ala conflatur; decem primores fusco imbutæ eò saturatiore, quò remix fit à corpore remotior, & in latere interiore maximâ parte candicantes : inter istas quatuor primores scapis donantur à duabus circiter tertiis ipsarum longitudinis partibus versùs extremitatem usque albis; sex reliquæ eodem in loco maculâ insigniuntur candidâ, in latere exteriore positâ, quæ macula eò major fit, quò remix est corpori vicinior : novem sequentes remiges, ab undecima scilicet ad decimam nonam usque inclusivè, sunt in exortu & maxima lateris interioris parte candidæ, in reliqua longitudine griseo-fuscæ, marginibus albis præditæ; quæ margines eò fiunt latiores, quò remix fit corpori finitimus : vigesima & vigesima prima candidæ, maculâ tantùm notatæ griseo-fuscâ, interiùs collocatâ, & multò quidem majore in vigesima prima remige

quàm in præcedente : quinque corpori viciniores dorso concolores. Quæ ultimæ longissimæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè attingunt. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ sunt griseo-fusco imbutæ ; qui color, versùs rectricis apicem procedendo, nigricat : tres utrinque proximè sequentes eodem colore tinctæ, sed apice albæ : quinta in exortu alba, dein fusco-nigricans, albo terminata, & in latere exteriore albo insuper fimbriata : utrinque extima in tota longitudine candida, minutâ tantùm insignita maculâ fusco-nigricante, versùs duas tertias longitudinis partes in latere interiore positâ. Rectrix autem ista novissimè descripta reliquis paululùm longitudine cedit ; aliæ verò omnes æqualem circiter obtinent longitudinem. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum ab ipsius exortu versùs extremitatem usque eleganter aurantium, ad apicem nigrum. Pars crurum plumis denudata & pedes similiter eleganter aurantii ; ungues verò nigri. Trium digitorum an-

du corps sont de la même couleur que le dos. Ces dernieres sont très-longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presqu'aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un gris-brun qui devient noirâtre en approchant du bout de la plume : les trois suivantes de chaque côté sont de la même couleur, & terminées de blanc : la cinquiéme est blanche à son origine, ensuite d'un brun-noirâtre, & terminée de blanc ; elle est aussi bordée de blanc du côté extérieur : la plus extérieure de chaque côté est blanche dans toute sa longueur, & a seulement une petite tache d'un brun-noirâtre, placée sur le côté intérieur vers les deux tiers de sa longueur. Cette derniere plume est un peu plus courte que les autres, qui sont à peu près d'égale longueur entr'elles. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est d'un bel orangé depuis son origine jusque vers son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont aussi d'un bel orangé ; & les ongles sont noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite

membrane, qui s'étend depuis son origine jusqu'à la premiere articulation. On le trouve aux bords de la mer, dans les rochers desquels il fait son nid. Ses œufs sont verdâtres, tachetés de brun, son extrémité obtuse étant tout-à-fait brune. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

ticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ab ipsius exortu ad primum usque articulum extensâ. Maris littora frequentat; ibique in rupibus nidificat. Ova ponit viridescentia, fusco maculata, extremitate quidem obtusâ penitùs fuscâ. *Ex museo Realmuriano.*

9. Le Pluvier a collier de Virginie.

Pluvialis superne griseo-fusca, infernè alba; tæniâ in syncipite candidâ, per oculos protensâ; maculâ in vertice & tæniâ infra oculos nigris; torque duplici, supremo albo, infimo nigro; uropygio rufo; rectricibus in exortu rufis, versùs apicem nigris, apice rufescentibus .... Pluvialis Virginiana torquata.

Charadrius fasciis pectoris colli frontis genarumque nigris, caudâ luteâ fasciâ nigrâ, pedibus pallidis. Charadrius vociferus. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *sp.* 4.
Gavia brachyptera, vocifera. *Klein. Avi. pag.* 21. *N°.* 8.
Pluvier criard. *Catesb. Tom. I. pag.* 71; *avec une figure très-exacte Pl.* 71.
Les Anglois l'appellent Chattering Plover. *Catesb.*
Les Habitans de Virginie, Kill-deer. *Catesb.*

Il est un peu plus gros que le *Guignard.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ neuf pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue quatre pouces; la partie de ses jambes qui est

Morinellum nonnihil crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem novem pollices & totidem circiter lineas explet; & ad extremos ungues octo pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda quatuor pollices; pars

crurum plumis denudata quatuor lineas; pes unum pollicem cum sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alæ complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. In syncipite lata adest tænia candida, in utroque capitis latere protensa, & per oculos ducta. Supra quam tæniam majuscula extat macula nigra, in capitis vertice posita. Reliquum caput superius est griseo-fuscum. In utroque capitis latere tænia extat nigra, ab exortu rostri orta, infra oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Guttur albicat: quæ albedo utrinque protenditur, collum cingit, & quodammodo torquem efficit, infra quem alius adest latiusculus torquis niger. Dorsum, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices griseo-fusco imbuuntur colore. Uropygium & tectrices caudæ superiores sunt rufæ. Pectus, ventrem, crurum supremam

dégarnie de plumes, quatre lignes; son pied un pouce six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur neuf lignes, & l'intérieur huit lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. Sur le synciput est une large bande blanche, qui s'étend de chaque côté de la tête, & passe par les yeux. Au-dessus de cette bande sur le sommet de la tête est une grande tache noire. Le reste du dessus de la tête est d'un gris-brun. De chaque côté de la tête est une bande noire, qui part de l'origine du bec, passe par-dessous les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. La gorge est blanche : cette couleur s'étend de chaque côté, fait le tour du col, & forme une espece de collier, au-dessous duquel est un autre collier noir passablement large. Le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont d'un gris-brun. Le croupion est roux, ainsi que les couvertures du dessus de la queue. La poitrine, le ventre, le haut des

jambes; les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Sur le haut de la poitrine est une large bande transversale noire. Les grandes plumes de l'aile sont brunes: les moyennes sont de la même couleur que le dos. De ces dernieres les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presqu'aussi loin que les plus longues plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes rousses depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur, ensuite noires vers leur bout & terminées de roussâtre. Les paupieres sont rouges. Le bec est noir. La partie des jambes, qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune très-clair; & les ongles noirâtres. On le trouve en *Virginie* & à la *Caroline*.

partem & latera vestiunt pennæ albæ. Inferiores caudæ tectrices concolores. Summum pectus latâ insignitur tæniâ transversâ nigrâ. Remiges alarum majores sunt fuscæ: minores eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur. Ex minoribus autem remigibus corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque rufis, dein versùs apicem nigris, apice rufescentibus. Palpebræ rubræ sunt. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque dilutissimè lutei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Virginia* & *Carolina*.

** 10. Le Pluvier a collier de S. Domingue.

Voyez Pl. VI. Fig. 2.

Pluvialis superne griseo-fusca, marginibus pennarum rufescentibus, infernè alba; tæniâ in syncipite candidâ, supra oculos protensâ; maculâ in vertice nigrâ; torque duplici, supremo albo, infimo nigro; uropygio rufo; rectricibus binis intermediis griseo-fuscis, apice rufescentibus, binis utrinque proximis griseo-fuscis, versùs apicem nigris, apice rufescentibus, tribus utrinque extimis rufis, versùs apicem

nigris, apice albis, extimâ in exortu albâ, nigricante transversim striata .... PLUVIALIS DOMINICENSIS TORQUATA.

Crassitie *Pluvialem torquatam nostratem* circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues octo pollices & lineam unam. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est; cauda tres pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata octo cum semi lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & quinque pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Partem capitis superiorem & dorsum vestiunt pennæ griseo-fuscæ, marginibus rufescentibus præditæ. Scapulares concolores. Uropygium & superiores caudæ tectrices rufi sunt coloris. In syncipite,

Il est à peu près de la grosseur de *notre Pluvier à collier*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces une ligne. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue trois pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, huit lignes & demie; son pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur neuf lignes, & l'intérieur huit lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied cinq pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête, le dos & les plumes scapulaires sont d'un gris-brun, chaque plume étant bordée de roussâtre. Le croupion est roux, ainsi que les couvertures du dessus de la queue. Sur le synciput, immédiatement au-dessus de l'origine du bec, est une bande transversale blanche, qui s'é-

tend de chaque côté au-dessus des yeux. Sur le sommet de la tête, au-dessus de la bande blanche, est une tache noire. La gorge est blanche : cette couleur s'étend de chaque côté, entoure le col, & forme une espece de collier, au-dessous duquel est une bande noire, qui entoure de même le col, & forme un second collier. Ce dernier collier est beaucoup plus large sur la partie inférieure du col, que sur sa partie supérieure. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Sur la poitrine est une large bande transversale variée de noir & de blanc ; c'est-à-dire qu'en cet endroit les plumes sont blanches à leur origine, ensuite noires, & bordées de blanc par le bout. Les petites couvertures du dessus des aîles les plus proches du corps sont d'un gris-brun : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur, & bordées de roussâtre : enfin les petites & les grandes les plus éloignées du corps sont noires, & bordées de blanc par le bout. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes : les cinq premieres sont noires, & ont

immediatè supra rostri exortum, tænia extat transversa candida, utrinque supra oculos protensa. In capitis vertice, supra tæniam candidam, macula adest nigra. Guttur albicat : albedo autem in utroque latere extenditur, collum ambit, & quodammodo torquem efficit, infra quem tænia extat nigra, collum similiter cingens, & torquem alterum efformans : qui novissimus torquis multò majorem in parte colli inferiore quàm in superiore latitudinem obtinet. Pectus, ventrem, latera & crurum partem supremam vestiunt pennæ albæ. Inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes eodem albore nitent. In pectore latiuscula extat tænia transversa albo & nigro varia ; eo scilicet in loco pennæ sunt in exortu albæ, deinde nigræ, apice albo fimbriatæ. Tectrices alarum superiores minimæ corpori viciniores griseo-fuscæ : mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbutæ colore, sed rufescente marginatæ : minores tandem, majoresque à corpore remotiores nigræ, albo in apice fimbriatæ. Alam componunt viginti

viginti quatuor remiges : quinque primores sunt nigræ, attamen in latere interiore secundùm ipsarum longitudinem maximâ parte candidæ, & maculâ insuper insignitæ candidâ, super scapum versùs ipsarum extremitatem collocatâ; quæ macula eò magìs in latere exteriore extenditur, quò remix fit corpori vicinior : quinque proximè sequentes, à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè, nigræ, & præcedentium instar, in latere interiore maximâ parte candidæ, candidoque imbutæ in lateris exterioris media parte : octo quæ sequuntur, ab undecima scilicet ad decimam octavam usque inclusivè, ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque albæ, in reliqua longitudine nigræ, albo marginatæ; in illis autem color niger eò minus spatium occupat, quò corpori viciniores fiunt : pleræque insuper istæ remiges, à tertia scilicet ad decimam octavam usque inclusivè, albo sunt in apice fimbriatæ : decima nona penitùs candida : vigesima eodem colore tincta, attamen in latere exteriore versùs ipsius exortum griseo-fusca :

la plus grande partie de leur côté intérieur blanche selon leur longueur ; elles sont de plus marquées d'une tache blanche, placée sur leur tige vers leur extrémité, laquelle tache s'étend d'autant plus sur le côté extérieur, que la plume s'approche plus du corps : les cinq suivantes, sçavoir depuis la sixiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont noires, ayant de même une grande partie de leur côté intérieur blanche ; elles sont aussi de cette couleur dans le milieu de leur côté extérieur : les huit qui suivent, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la dix-huitiéme inclusivement, sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, le reste étant noir & bordé de blanc; dans ces plumes le noir occupe d'autant moins d'espace, qu'elles sont plus proches du corps : de plus la plûpart de ces plumes, sçavoir depuis la troisiéme jusqu'à la dix-huitiéme inclusivement, sont bordées de blanc par le bout : la dix-neuviéme est tout-à-fait blanche : la vingtiéme est de la même couleur, excepté du côté extérieur, vers son origine, où elle est d'un gris-brun : la vingt-uniéme est blanche à son origine & à son bout, & d'un gris-brun dans son mi-

lieu ; cette derniere couleur coupant obliquement la plume : enfin les trois plus proches du corps sont d'un gris-brun. Ces trois dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, jusqu'au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. Les deux premieres plumes de l'aîle sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un gris-brun & terminées de roussâtre : les deux qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont d'abord d'un gris-brun, ensuite noires vers leur bout, & terminées de roussâtre : les trois plus extérieures de chaque côté sont d'abord rousses, ensuite noires vers leur bout, & terminées de blanc; la plus extérieure cependant est depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur blanche, & rayée transversalement de noirâtre. Le bec est d'un cendré-bleuâtre, excepté son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont aussi d'un cendré-bleuâtre ; & les ongles sont noirs. On le trouve à *S. Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

vigesima prima in exortu & apice candida, in medio griseo-fusca, griseo-fusco colore remigem obliquè dividente : tres tandem corpori finitimæ griseo-fuscæ. Tres istæ novissimæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Binæ primores remiges sunt omnium longissimæ. Caudam componunt duodecim rectrices : binæ intermediæ griseo-fuscæ, apice rufescentes : binæ utrinque proximè sequentes primùm griseo-fuscæ, dein versùs apicem nigræ, rufescente terminatæ : tres utrinque extimæ primùm rufæ, dein versùs apicem nigræ, apice albæ; attamen extima ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque alba, nigricante transversim striata. Rostrum cinereo-cœrulescens, excepto apice nigro. Pars crurum plumis denudata & pedes quoque cinereo-cœrulescentes ; ungues verò nigri. Habitat in *Dominicensi Insula*, unde in museum *Realmurianum* missa à *D. Chervain*.

11. LE PLUVIER A COLLIER DE LA JAMAIQUE.

Pluvialis ſuperne obſcurè fuſca, infernè alba ; pectore nigris maculis vario, torque albo ; rectricibus albidis, rufo & nigricante variegatis . . . . PLUVIALIS JAMAICENSIS TORQUATA.

Pluvialis viridis ex fuſco & albo varia, caudâ longiore. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 318. *N°. XI. hujus icon peſſima Tab.* 265. *fig.* 3.

Pluvialis ex fuſco & albo varia, caudâ longiore. *Raj. Syn. Avi. pag.* 190. *N°.* 10.

Tringa ſubcinerea ventre albido, collo annulo albo nigro marginato cincto. *Browne. Nat. Hiſt. of Jamaic. pag.* 477.

Les Anglois de la Jamaïque l'appellent GREATEST SNIPE. *Sloane. Raj.* LARGER GREY SNIPE WITH A WHITE NECK. *Browne.*

Præcedenti paululùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam octo circiter pollices explet, & ad extremos ungues ſeptem pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque unum pollicem longum eſt ; cauda tres pollices cum ſex lineis ; pars crurum plumis denudata ſex lineas ; pes unum pollicem & quinque lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus decem cum ſemi lineas, intimus novem lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extenſâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum ſexdecim pol-

Il n'eſt pas tout-à-fait ſi gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ huit pouces, & juſqu'à celui des ongles de ſept pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; ſa queue trois pouces ſix lignes ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſix lignes ; ſon pied un pouce cinq lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur dix lignes & demie, & l'intérieur neuf lignes. Le doigt extérieur eſt réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a ſeize pouces de vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées,

s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun obscur. La gorge, la partie inférieure du col, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. La poitrine est variée de blanc & de noir. La partie du col la plus voisine de la tête est entourée d'un collier blanc. Les plumes de l'aîle sont d'un brun obscur. La queue est composée de douze plumes blanchâtres, variées de roux & de noirâtre. Les paupieres sont orangées. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont blancs; toutes les articulations étant cependant noirâtres; & les ongles sont noirs. On le trouve à la *Jamaïque* sur le bord des rivieres.

licum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad caudam ferè extremam pertingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ tectrices sunt obscurè fuscæ. Guttur, pars colli inferior, venter, latera, crurum pars suprema & tectrices caudæ inferiores albicant. Pectus albo & nigro variegatur. Partem colli corpori finitimam circumdat torquis albus. Alarum remiges tingit color obscurè fuscus. Cauda duodecim conflatur rectricibus albidis, rufo & nigricante variegatis. Palpebræ aurantiæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata & pedes albicantes, omnibus tamen articulis nigricantibus; ungues verò nigri. Habitat in *Jamaica*, ibique juxta flumina degit.

** 12. Le grand Pluvier, appellé vulgairement Courly de terre.

Voyez Pl. VII. Fig. 1.

Pluvialis superne griseo-fulva, pennis in medio fuscis, circa margines fulvis, infernè fulva, medio pennarum in collo inferiore & supremo pectore fusco; tæniâ supra & infra oculos albo-fulvescente; lineolâ infra oculos fuscâ; rec-

tricibus sex intermediis griseis, fasciis fuscis circumferentiæ parallelis, tribus utrinque extimis candidis, binis utrinque extimæ proximis nigricante transversim striatis, lateralibus nigricante terminatis . . . . PLUVIALIS MAJOR, OEDICNEMUS VULGO DICTA.

Oedicnemus Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag.* 98. *hujus icones minimè accuratæ pag.* 99 *&* 100.
Jonst. Avi. pag. 43. *hujus duæ icones ab Aldrovando mutuatæ Tab. XXVI, quarum altera sub titulo*, Charadrios.
Willugh. Ornith. pag. 227. *hujus icon minimè accurata Tab. LVIII; & insuper altera icon ab Aldrovando mutuata Tab. LXXVII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 108. *N°. A.* 4.
Charlet. Exer. pag. 83. *N°. XI.*
Charlet. Onomazt. pag. 74. *N°. XI.*
Charadrius. *Gesn. Avi. pag.* 256, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Charadrius Aristotelis. *Gesn. icon. Avi. pag.* 125, *in qua eadem icon.*
Charadrius brevicaudus, rufescens, maculatus. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. X. sp.* 1.
Charadrius griseus, remigibus primoribus duabus nigris medio albis, rostro aucto, pedibus cinereis. Oedicnemus. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *sp.* 9.
Gavia rostro virescente, conico, acuto. *Klein. Avi. pag.* 20. *N°.* 4.
Arquatæ congener, seu minor. *Charlet. Exer. pag.* 111.
Charlet. Onomazt. pag. 106.
Fedoæ tertia species. *Willugh. Ornith. pag.* 216.
Fedoa nostra tertia. *Raj. Syn. Avi. pag.* 105. *N°. A.* 6.
Ostardeau ou Oedicnemus. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag.* 239, *dans laquelle il y a une figure peu exacte.*
Ostardeau. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 59 *a, dans laquelle est la même figure.*
Outarde ou Ostarde & Bitarde. *Alb. Tom. I. pag.* 61; *avec une mauvaise figure Pl.* 69.
Les Grecs l'appellent Οἰδίκνημος. *Bel.*
Les Italiens, CORUZ. *Gesn. Aldrov.*
Les Romains, CARLOTTE. *Willugh.*
Les Allemands, en quelques endroits, TRIEL *ou* GRIEL. *Gesn. Aldrov.*
Les Anglois, STONE CURLEW. *Willugh. Raj. Charlet. Alb.*
Les Habitans de la Province de Cornouaille, STONE CURLEW. *Willugh. Raj.*

Crassitie *Columbam Romanam* antecellit. Ipsius longi-

Il est plus gros qu'un *Pigeon Romain*. Sa longueur depuis le

bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de seize pouces deux lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce dix lignes & demie de long; sa queue cinq pouces deux lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce six lignes; son pied deux pouces neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes, l'extérieur un pouce, & l'intérieur onze lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds deux pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, le dessus du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes dans leur milieu, & cela selon la longueur de leur tige, & d'un gris-fauve sur les deux côtés, le tout étant bordé de fauve. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une bande d'un blanc tirant tant soit peu sur le fauve, qui s'étend au-dessus des yeux,

tudo à rostri apice ad caudæ extremitatem quindecim pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues sexdecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & decem cum semi lineas longum est; cauda quinque pollices cum lineis binis; pars crurum plumis denudata unum pollicem & sex lineas; pes duos pollices & novem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum totidem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad duas tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem fuscæ, in utroque latere griseo-fulvæ, marginibus fulvis prædi-tæ. Scapulares & superiores caudæ tectrices concolores. In utroque capitis latere tæ-

nia extat ex albo ad fulveſcentem colorem nonnihil inclinans, ſupra oculos ducta, infra quos altera adeſt tænia eodem colore imbuta. Noviſſimam tæniam iſtam inter & oculum lineola extat fuſca. Guttur ex albo nonnihil ad fulvum vergit. Partem colli inferiorem & pectus ſupremum obtegunt pennæ ad latera fulvæ, in medio ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem fuſcæ. Quæ latera cooperiunt, ex albo paululùm ad fulvum inclinant, & ſtrictâ inſigniuntur lineâ fuſcâ, ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem ductâ. Pectus infimum, venter & crurum ſuprema pars albi ſunt coloris. Inferiores caudæ tectrices ſunt fulvæ. Pennæ alas ſubtus obtegentes candidæ, ex iſtis autem ultimis quædam ſtrictâ quoque notantur lineâ fuſcâ ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem protensâ; & majores à corpore remotiores cinereo-fuſco terminantur. Tectrices alarum ſuperiores minimæ pennis dorſum veſtientibus concolores: mediæ cinereo albæ, lineâ fuſcâ, ſecundùm ſcapi longitudinem ductâ, inſignitæ, & ſtrictiſſimâ margine fulvâ præditæ: majores corpori finitimæ

au-deſſous deſquels eſt une autre bande de la même couleur. Entre cette derniere bande & l'œil eſt une petite ligne brune. La gorge eſt d'un blanc tirant tant ſoit peu ſur le fauve. La partie inférieure du col & le haut de la poitrine ſont couverts de plumes fauves ſur leurs côtés, & brunes dans leur milieu ſelon la longueur de leur tige. Celles qui couvrent les côtés, ſont d'un blanc tirant tant ſoit peu ſur le fauve, & marquées chacune d'une étroite ligne brune, qui s'étend tout le long de la tige. Le bas de la poitrine, le ventre & le haut des jambes ſont blancs. Les couvertures du deſſous de la queue ſont fauves. Celles du deſſous des aîles ſont blanches; quelques-unes de ce dernieres ſont auſſi marquées d'une étroite ligne brune, qui s'étend ſelon la longueur de leur tige; & les grandes les plus éloignées du corps ſont terminées de cendré-brun. Les plus petites couvertures du deſſus des aîles ſont de la même couleur que les plumes du dos: les moyennes ſont d'un gris-blanc, marquées d'une ligne brune, qui s'étend ſelon la longueur de leur tige, & bordées très-étroitement de fauve: les grandes les plus proches du corps ſont d'un gris-blanc, & terminées obliquement de

noirâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont tout-à-fait noirâtres. La premiere des plumes de l'aîle est noirâtre à son origine & à son extrémité, & blanche dans son milieu : les cinq suivantes, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la sixiéme inclusivement, sont noirâtres, & ont la plus grande partie de leur côté intérieur blanche ; de plus la seconde est marquée vers les trois quarts de sa longueur d'une large bande transversale blanche ; & la troisiéme est aussi marquée dans le même endroit d'une petite tache blanche, placée auprès de sa tige sur son côté extérieur : les trois qui suivent, sçavoir depuis la septiéme jusqu'à la neuviéme inclusivement, sont blanches depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur, le reste est noirâtre, & terminé d'un peu de blanc : toutes les autres sont noirâtres du côté extérieur & à leur bout, & blanches du côté intérieur ; il faut cependant en excepter les trois plus proches du corps, qui sont grises & bordées de blanc, la bordure de celle qui est la plus proche du corps, tirant un peu sur le fauve. Ces trois dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus

cinereo - albæ, nigricante obliquè terminatæ : majores tandem à corpore remotiores penitùs nigricantes. Remix prima in exortu & apice nigricat, in ipsius medio est candida : quinque proximè sequentes, à secunda scilicet ad sextam usque inclusivè, sunt nigricantes, & in latere interiore maximâ parte candidæ ; secunda insuper versùs tres quartas ipsius longitudinis partes latâ notatur tæniâ transversâ albâ ; & tertia eodem in loco minutâ quoque insignitur maculâ candidâ, prope ipsius scapum in latere exteriore positâ : tres quæ sequuntur, à septima scilicet ad nonam usque inclusivè, ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque albæ, in reliqua longitudine nigricantes, pauco albo terminatæ : reliquæ omnes remiges in latere exteriore & apice nigricantes, in latere interiore candidæ ; ex istis tamen excipiendæ sunt tres corpori viciniores griseæ, marginibus albis præditæ, remigis corpori finitimæ margine paululùm ad fulvum vergente colorem. Tres istæ remiges novissimè descriptæ longæ sunt & acutæ,

&

& dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè attingunt. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediæ griseæ, fasciis variegatæ fuscis, ipsarum circumferentiæ parallelis, apice albido, fasciâ similiter fuscâ, rectricis extremitatis circumferentiæ parellelâ, præditæ: binæ utrinque proximè sequentes concolores, in eo tamen discrepantes quod apicibus nigricantibus præditæ sint, & fasciæ fuscæ in latere exteriore non multùm sint conspicuæ: tres utrinque extimæ candidæ, nigricante terminatæ, nigricante colore majus in latere exteriore spatium occupante quàm in interiore; binæ insuper utrinque extimæ viciniores sunt nigricante transversim striatæ. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. Oculorum irides & palpebræ sunt luteæ. Infra utrumque oculum spatium extat plumis denudatum, luteo - viridescente colore tinctum. Rostrum quoque ab ipsius exortu ultra nares us-

longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont grises, variées de bandes brunes, paralleles à leur circonférence, & terminées de blanchâtre, sur lequel est aussi une bande brune parallele à la circonférence de l'extrémité de la plume : les deux qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont de la même couleur, avec cette différence qu'elles sont terminées de noirâtre, & que les bandes brunes paroissent fort peu sur le côté extérieur : les trois plus extérieures de chaque côté sont blanches & terminées de noiratre, cette derniere couleur occupant plus d'espace sur le côté extérieur que sur l'intérieur; de plus les deux plus proches de la plus extérieure de chaque côté sont rayées de bandes transversales noirâtres. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux & les paupieres sont jaunes. Au-dessous de chaque œil est un espace nud d'un jaune verdâtre. Le bec est de cette derniere couleur depuis son origine jusqu'au-delà

des narines, & noir depuis les narines jusqu'à son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune-verdâtre; & les ongles noirs. On le trouve dans les champs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

que luteo-viridescens, à naribus ad apicem usque nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque luteo-viridescentes; ungues vero nigri. In campestribus locis habitat. *Ex museo Realmuriano.*

13. LE GRAND PLUVIER DE BENGALE.

Pluvialis superne splendidè fusca, nigro resperfa, infernè nigra; capite superiore, gutture & collo nigris; genis dilutè castaneis; rectricibus splendidè fuscis, punctulis & tæniis transversis nigris notatis . . . . PLUVIALIS BENGALENSIS MAJOR.

Outarde des Indes. *Edwards. Glanur. pag. 87. Chap. XL; avec une figure exacte Pl.* 250.
Les Anglois l'appellent, INDIAN BUSTARD. *Edwards.*
Les Habitans de Bengale CHURGE. *Edwards.*

Il est assez menu à proportion de sa grandeur. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds deux pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a environ deux pouces trois lignes de long; sa queue cinq pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, environ deux pouces; son pied cinq pouces trois lignes; & celui du milieu des trois doigts

Pro ratione magnitudinis corpore gracili donatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & undecim circiter pollices explet, & ad extremos ungues duos pedes totidem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & tres circiter lineas longum est; cauda quinque pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata duos circiter pollices; pes quinque pollices cum tribus li-

neis; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & decem lineas: laterales multò sunt breviores. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Partem capitis superiorem, guttur & collum vestiunt pennæ nigræ, longiusculæ, strictæ. Caput ad latera sive genæ sunt dilutè castaneæ. Dorsum, uropygium, superioresque caudæ tectrices splendidè fuscæ, nigro resperfæ: & ex pennis dorsum vestientibus quælibet insuper majusculâ maculâ nigrâ in medio insignitur. Qui color fuscus nigro variegatus in utroque colli inferioris latere protenditur, illud immediatè supra pectus ambit, ibique tæniam transversam efficit. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus cooperientes nigri sunt coloris. Superiores alarum tectrices sunt penitùs candidæ; minimæ tamen, istæ scilicet quæ versùs articulum carpo humano respondentem sunt positæ, nigro marginantur. Remiges majores sunt in latere exteriore albæ, ad apicem obscurè cinereæ: mediæ candidæ, in tota su-

antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce dix lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le dessus de la tête, la gorge & le col sont couverts de plumes noires, assez longues & étroites. Les côtés de la tête ou les joues sont d'un marron clair. Le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun brillant, tout parsemé de noir: de plus les plumes du dos ont chacune dans leur milieu une grande tache noire. Ce brun varié de noir s'étend de chaque côté de la partie inférieure du col, l'entoure immédiatement au-dessus de la poitrine, & forme là une bande transversale. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont noirs. Les couvertures du dessus des aîles sont tout-à-fait blanches, excepté les plus petites, placées vers le pli qui répond à celui du poignet, qui sont bordées de noir. Les plus grandes plumes de l'aîle sont blanches du côté extérieur, & terminées d'un cendré obscur: les moyennes sont d'un blanc tout parsemé de noir, & varié de larges bandes transversales de la même

couleur : enfin les plus proches du corps sont d'un grisâtre tout parsemé de petites taches noires. La queue est composée de douze plumes du même brun que le dos, parsemé pareillement de petits points noirs, & varié de bandes transversales de la même couleur. Les yeux sont grands : leur iris est de couleur de noisette; & les paupieres sont cendrées. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont blanchâtres ; & les ongles sont bruns. On le trouve dans le Royaume de *Bengale*.

perficie nigro respersæ, latisque tæniis transversis similiter nigris variegatæ : corpori tandem viciniores ad griseum accedentes, minutis maculis nigris in universa ipsarum superficie disseminatis. Caudam componunt duodecim rectrices, dorsi instar, splendidè fuscæ, punctulis nigris pariter aspersæ, & tæniis transversis concoloribus variæ. Oculi sunt magni : ipsorum irides avellaneæ; palpebræ verò cinereæ. Pars crurum plumis denudata, pedesque candicantes; ungues verò fusci. Habitat in *Bengalensi* Regno.

14. Le Pluvier hupé de Perse.

Pluvialis cristata, superne castaneo-fusca, infernè nigra; pectore ad violaceum inclinante; imo ventre albo; capite superiore & cristâ nigro-viridantibus; genis, occipitio & collo ad latera candidis; rectricibus albis, apice nigris.... Pluvialis Persica cristata.

Charadrius gulâ pileo pectoreque nigris, occipitio cristato, dorso testaceo, pedibus nigris. Charadrius cristatus. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *sp.* 1.

Garia, s. Vanellus Indicus. *Klein. Avi. pag.* 22. N°. 10.

Pluvier des Indes à la gorge noire. *Edwards. Tom. I. pag. XLVII; avec une figure exacte Pl.* 47.

Il est un peu plus gros que le *Vanneau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ dix

Crassitie *Vanellum* paululùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem cir-

citer pollices æquat, & ad extremos ungues undecim pollices cum tribus lineis. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tredecim lineas longum eſt; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes duos pollices & tres lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue ſexdecim lineas, extimus tredecim lineas, intimus undecim lineas. Alæ complicatæ caudæ extremitatem pertingunt. Capitis ſuperior pars pennis veſtitur nigro-viridantibus; quæ pennæ ſunt longiuſculæ; harum enim quædam unius pollicis longitudine pollent, elegantemque criſtam efformant. Genæ, occipitium & collum ad latera albicant. Pars colli ſuperior, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares & ſuperiores caudæ tectrices ſunt caſtaneo-fuſcæ. Guttur & collum inferius nigri coloris. Pectus ex nigro ad violaceum inclinat. Ventrem ſupremum tingit color niger. Venter imus, pennæ caudam ſubtus cooperientes & crurum ſuprema pars albent. Superiores alarum tectrices, majores ſcilicet & minores, corpori finitimæ ſunt dorſo conco-

pouces, & juſqu'à celui des ongles d'onze pouces trois lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; ſa queue trois pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, huit lignes; ſon pied deux pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, ſeize lignes, l'extérieur treize lignes, & l'intérieur onze lignes. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt couverte de plumes d'un noir mêlé d'un luſtre de verd: ces plumes ſont aſſez longues, quelques-unes ayant juſqu'à un pouce de long, & formant une joli hupe. Les joues, l'occiput & les côtés du col ſont blancs. La partie ſupérieure du col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un marron rembruni. La gorge & la partie inférieure du col ſont noires. La poitrine eſt d'un noir tirant ſur le violet. Le haut du ventre eſt noir. Le bas-ventre, les couvertures du deſſous de la queue & le haut des jambes ſont blancs. Les couvertures du deſſus des aîles, grandes & petites, les plus proches du corps ſont

de la même couleur que le dos; les plus éloignées du corps sont aussi d'un marron rembruni, & terminées de blanc. Le bord de l'aîle depuis le pli qui répond à celui du poignet, jusqu'à son extrémité est varié de blanc & de noir. Les grandes plumes de l'aîle sont noires: les moyennes sont d'un marron rembruni. De ces dernieres les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes blanches depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur, & noires à leur extrémité. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un brun foncé. On le trouve dans le Royaume de *Perse*.

iores; à corpore remotiores similiter castaneo-fuscæ, sed albo terminatæ. Alarum margines ab articulo carpo humano respondente ad ipsarum extremitates usque albo & nigro variegatæ. Remiges majores nigræ: minores castaneo-fuscæ. Ex minoribus autem remigibus corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad duas tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caudam componunt duodecim rectrices ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque albæ, apice nigræ. Rostrum quoque nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque saturatè fusci. Habitat in *Persiæ* Regno.

** 15. Le Pluvier armé du Sénégal.

Voyez Pl. VII. Fig. 2.

Pluvialis cristata, superne grisea, infernè albo-fulva; capite; cristâ, gutture & maculâ ferri equini æmulâ in medio ventre nigris; rectricibus albo-fulvis, nigro terminatis, binis utrinque extimis albo-fulvo in apice marginatis, alis armatis.... Pluvialis Senegalensis armata.

An Charadrius remigibus pectore abdomine pedibusque atris, rectricibus dimidiato-albis, humeris spinosis. Charadrius spinosus? *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *sp.* 11.

Cum *Pluviale aurea* craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam undecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices & lineas binas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tredecim cum ſemi lineas longum eſt; cauda tres pollices & ſeptem lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes duos pollices cum quinque lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus undecim lineas, intimus novem lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum uſque articulum protensâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum unius pedis undecim pollicum & ſex linearum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ ad quatuor linearum diſtantiam ultra caudam extremam protenduntur. In utriuſque alæ ſummitate, id eſt, versùs articulum carpo humano reſpondentem calcar extat ſubſtantiæ cornu æmulæ, ſex cum ſemi lineas longum, acutiſſimum & nigrum. Partem capitis ſuperiorem & guttur tingit elegantiſſimus

Il eſt à peu près de la groſſeur du *Pluvier doré*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'onze pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de douze pouces deux lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; ſa queue trois pouces ſept lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, un pouce; ſon pied deux pouces cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur onze lignes, & l'intérieur neuf lignes. Le doigt extérieur eſt réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a un pied onze pouces ſix lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à quatre lignes au-delà du bout de la queue. Sur le haut de chaque aîle, ſçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, eſt un épron d'une ſubſtance ſemblable à de la corne, long de ſix lignes & demie, très-pointu & noir. La partie ſupérieure de la tête & la gorge ſont d'un très-beau noir; cette couleur deſcend un peu ſur la partie inférieure du col. Les plumes qui couvrent l'occiput, dont

quelques-unes ont juſqu'à un pouce neuf lignes de long, ſont fort étroites, & forment une jolie hupe. La partie ſupérieure du col, le dos & le croupion ſont gris. Les plumes ſcapulaires ſont de la même couleur. Les côtés de la tête au-deſſous des yeux, la partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, & celles du deſſous des aîles ſont d'un blanc-fauve. Le milieu du ventre eſt marqué d'une aſſez grande tache noire, en forme de fer à cheval, dont la convexité eſt tournée vers la poitrine. Les plus petites couvertures du deſſus des aîles, ſçavoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, ſont noires : les moyennes ſont griſes : les grandes les plus proches du corps ſont d'un blanc-fauve ; & les plus éloignées du corps ſont noires. L'aîle eſt compoſée de vingt-cinq plumes : les neuf premieres ſont noires : les dix qui ſuivent, ſçavoir depuis la dixiéme juſqu'à la dix-neuviéme incluſivement, ſont d'un blanc-fauve à leur origine, & noires à leur extrémité, ces deux couleurs coupant obliquement chaque plume, & le noir oc-

color niger ; qui color ſuprà collum inferius paululùm protenditur. Pennæ occipitium obtegentes, quarum quædam unius pollicis & novem linearum longitudinem obtinent, ſunt ſtrictiſſimæ, elegantemque criſtam efficiunt. Pars colli ſuperior, dorſum, uropygium & ſcapulares pennæ ſunt griſeæ. Caput ad latera, idque infra oculos, collum inferiùs & ad latera, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, pennæ caudam ſuperne & infernè cooperientes, inferioreſque alarum tectrices ex albo ad fulvum vergunt. Medius venter majuſculâ inſignitur maculâ nigrâ, ferri equini æmulâ, cujus convexitas pectus ſpectat. Superiores alarum tectrices minimæ, iſtæ ſcilicet quæ articulum carpo humano reſpondentem obtegunt, ſunt nigræ : mediæ griſeæ : majores corpori finitimæ albo-fulvæ ; à corpore autem remotiores nigræ. Viginti quinque remigibus ala conflatur : novem primores ſunt nigræ : decem proximè ſequentes, à decima ſcilicet ad decimam primam uſque incluſivè, ſunt in exortu albo-fulvæ, in extremitate nigræ, duo-

bus

bus istis coloribus unamquamque remigem obliquè dividentibus, nigroque colore eò minus spatium occupante, quò remix sit corpori vicinior: vigesima & vigesima prima albo-fulvæ: quatuor corpori finitimæ griseæ. Quæ novissimæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus albo-fulvis, nigro terminatis: color autem niger tertiam circiter duarum intermediarum longitudinis partem tingit; in lateralibus verò eò minus spatium occupat, quò rectrix sit exterior: binæ insuper utrinque extimæ sunt albo-fulvo in apice marginatæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Senegalensi* regione, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Adanson.*

cupant d'autant moins d'espace, que la plume est plus proche du corps : la vingtiéme & la vingt-uniéme sont d'un blanc-fauve : les quatre plus proches du corps sont grises. Ces dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un blanc-fauve, & terminées de noir : cette derniere couleur occupe environ le tiers de la longueur des deux du milieu; & dans les latérales elle occupe d'autant moins d'espace, que la plume est plus extérieure ; les deux plus extérieures de chaque côté sont de plus bordées de blanc-fauve par le bout. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanson.*

1. Pluvier doré.

2. Petit Pluvier ou Guignard.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Pluvier à collier. 2. Petit Pluvier à collier.

1. Pluvier doré de S. Domingue.

2. Pluvier à collier de S. Domingue.

Dessiné et Gravé par Martinet

1. Grand Pluvier ou Courly de terre. 2. Pluvier armé du Sénégal.

ORDO XVII.

AVES

Digitis quatuor, membranis destitutis, tribus scilicet anticis, uno postico: cruribus in parte inferiore plumis denudatis: alisque sat magnis, & volatui idoneis præditæ.

INTER hujus Ordinis Aves aliæ rostro donantur recto, apice crassiori: aliæ rostro subrecto, sursùm modicè tendente, & horizontaliter paululùm compresso: aliæ rostro superne convexo, & apice lateraliter compresso: aliæ rostro recto, lateraliter compresso: aliæ rostro gracili: aliæ rostro deorsum arcuato: aliæ rostro recto, horizontaliter plano; apice ampliato, subrotundo, spathæformi: aliæ rostro crasso & longo: aliæ rostro crasso, brevi; mandibulâ superiore cochleariformi, apice unguiculatâ: aliæ rostro brevi, recto, apice conico: aliæ

ORDRE XVII.

LES OISEAUX

Qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derriere: la partie inférieure des jambes dénuée de plumes: & les aîles assez grandes, & propres pour le vol.

PARMI les Oiseaux de cet Ordre les uns ont le bec droit & renflé vers le bout: d'autres ont le bec plutôt courbé en en-haut que droit, & un peu comprimé horizontalement: d'autres ont le bec convexe en-dessus, & comprimé par les côtés vers le bout: d'autres ont le bec droit, & comprimé par les côtés: d'autres ont le bec menu: d'autres ont le bec courbé en arc en en-bas: d'autres ont le bec droit, plat horizontalement; & son bout plus large & arrondi en forme de spatule: d'autres ont le bec gros & long: d'autres ont le bec gros, court; la mandibule supérieure ayant la forme d'une cuilliere,

& étant onguiculée à son bout: d'autres ont le bec court, droit & conique vers le bout : d'autres ont le bec en cone courbé: d'autres enfin ont le bec en cone applati par les cotés. Je divise les Oiseaux de cet Ordre en douze sections : dans la premiere sont ceux qui ont le bec droit & renflé vers le bout, comme le *Vanneau*, le *Jacana* : dans la seconde ceux qui ont le bec plutôt courbé en en-haut que droit, & un peu comprimé horizontalement, comme le *Coulon-chaud* : dans la troisiéme ceux qui ont le bec convexe en-dessus, & comprimé par les côtés vers le bout, comme la *Perdrix-de-mer*: dans la quatriéme ceux qui ont le bec droit & comprimé par les côtés; tous ceux-là ont le corps applati par les côtés, comme le *Rale* : dans la cinquiéme ceux qui ont le bec menu, comme le *Beccasseau*, la *Barge*, la *Beccasse*: dans la sixiéme ceux qui ont le bec courbé en arc en en-bas, comme le *Courly* : dans la septiéme ceux qui ont le bec droit, plat horizontalement, & son bout plus large & arrondi en forme de spatule, comme la *Spatule* : dans la huitiéme ceux qui ont le bec gros & long, comme la *Cigogne*,

rostro conico-incurvo : aliæ tandem rostro conico, lateraliter compresso. Hujus Ordinis Aves in duodecim sectiones dividuntur: prima continet eas quæ rostro donantur recto, apice crassiori, ut *Vanellus*, *Jacana*: secunda eas quæ rostrum habent subrectum, sursum modicè tendens, & horizontaliter paululùm compressum, ut *Arenaria*: tertia illas quæ rostrum habent superne convexum, apice lateraliter compressum, ut *Glareola* : quarta eas quæ rostrum habent rectum, lateraliter compressum; quæ omnes corpore donantur quoque lateraliter compresso, ut *Rallus* : quinta illas quæ rostrum habent gracile, ut *Tringa*, *Limosa*, *Scolopax* : sexta illas quæ rostrum habent deorsum arcuatum, ut *Numenius* : septima eas quæ rostrum habent rectum, horizontaliter planum; ipsius apice ampliato, subrotundo, spathæformi, ut *Platea* : octava illas quæ rostro donantur crasso & longo, ut *Ciconia*, *Ardea*, *Scopus* : nona eas quæ rostrum habent crassum & breve; ipsius mandibulâ superiore cochleariformi, apice unguiculatâ,

ut *Cochlearius*: decima illas quæ roſtrum habent breve & rectum; ipſius apice conico; iſtæ autem in capite ornantur corollâ plumis, Graminis radicum æmulis, conflatâ, ut *Balearica*: undecima eas quæ roſtrum habent conico-incurvum; ut *Cariama*, *Anhima*: duodecima tandem illas quæ roſtro donantur conico, lateraliter compreſſo; quæ omnes calvitio in fronte præditæ ſunt, ut *Porphyrio*.

le *Héron*, l'*Ombrette* : dans la neuviéme ceux qui ont le bec gros & court; la mandibule ſupérieure en forme de cuilliere, & onguiculée à ſon bout, comme la *Cuilliere* : dans la dixiéme ceux qui ont le bec court, droit & conique vers le bout; ceux-là ont la tête ornée d'une hupe compoſée de plumes reſſemblantes à des racines de Chiendent, comme l'*Oiſeau-royal* : dans l'onziéme ceux qui ont le bec en cone courbé, comme le *Cariama*, le *Kamichy* : & enfin dans la douziéme ceux qui ont le bec en cone applati par les côtés; tous ceux-là ont le front chauve, comme la *Poule-ſultane*.

SECTIO I.

Eæ quæ roſtrum habent rectum, in apice craſſius.

SECTIO iſta duobus conſtat generibus Avium, unguiculorum longitudine à ſe invicem diſcrepantium. Aliæ enim unguiculis donantur breviſſimis, ut *Vanellus*: aliæ unguiculis gaudent longiſſimis, ut *Jacana*.

SECTION I.

Ceux qui ont le bec droit & renflé vers le bout.

CETTE ſection contient deux genres d'Oiſeaux, qui ſe diſtinguent entr'eux par la longueur de leurs ongles. Les uns ont les ongles très-courts, comme le *Vanneau* : les autres ont les ongles très-longs, comme le *Jacana*.

LXX.

Le genre du Vanneau.

Son caractere eſt d'avoir
Quatre doigts dénués de membranes ; trois devant, un derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec droit & renflé vers le bout :
Les ongles très-courts.

LXX.

Genus Vanelli.

Hujus character eſt
Digiti quatuor, membranis deſtituti ; tres ſcilicet antici, poſticus unus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Roſtrum rectum, in apice craſſius :
Unguiculi breviſſimi.

** 1. LE VANNEAU.

Voyez Pl. VIII. Fig. 1.

Vanellus criſtatus, ſuperne viridi-aureus, infernè albus; capite ſuperiore nigro-viridante; criſtâ nigrâ; tæniâ infra oculos nigricante; gutture albo; collo inferiore nigro-viridante, pennis in apice albo fimbriatis; rectricibus decem intermediis primâ medietate candidis, alterâ nigris, apice albido marginatis, utrinque extima candida, maculâ nigrâ interiùs inſignita . . . . VANELLUS.

Vanellus torquatus, pectore albo, dorſo & alis vireſcentibus. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen VI.*
Vanellus. *Geſn. Avi. pag.* 763. *hujus icon ſatis accurata pag.* 764.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 365.
Jonſt. Avi. pag. 113. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53; *& inſuper altera icon à Geſnero mutuata Tab. XXVII, ſub titulo,* Capella.
Charlet. Exer. pag. 113. *N°. XIII.*
Charlet. Onomazt. pag. 108. *N°. XIII.*
Linn. Syſt. Nat. ed. 6. *Gen.* 60. *ſp.* 4.
Moehr. Avi. Gen. 92.
Vanellus Alberto magno; Pavo agreſtis Geſnero, & Bellonio. *Rzac. Hiſt. nat. Pol. pag.* 296.
Vanellus Aldrovandi; Gavia cinerea Eberi & Peuceri; Capella Gazæ; Pavo agreſtis Geſneri. *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag.* 425.

Capella. *Charlet. Exer. pag.* 113.
Charlet. Onomazt. pag. 109.
Capella Avis. *Gesn. Avi. pag.* 109.
Capella, seu Vanellus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 523. *hujus icon satis accurata pag.* 526.
Willugh. Ornith. pag. 228. *hujus icon satis accurata Tab. LVII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 110. *N°. A.* 1.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.
Capella, seu Capra. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 273.
Capra. *Gesn. Avi. pag.* 240.
Capra vel Capella. *Gesn. icon. Avi. pag.* 99, *in qua hujus icon satis accurata.*
Tringa cristâ dependente, pectore nigro. *Faun. Suec. Linn. N°.* 148.
Tringa pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro. Vanellus. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *sp.* 2.
Gavia vulgaris. *Klein. Avi. pag.* 19. *N°.* 1.
Parcus; Parra Plinii. *Schwenck.*
Kyvitta, *Schwenckfeldii.*
Dixhuit Gallorum. *Bell. Obs. pag.* 17.
Vanneau. *Bel. Hist. nat. des Oiss. pag.* 209; *avec une figure très-peu exacte pag.* 210.
Vaneau, nommé par aucuns Dixhuit, & par d'autres Papechieu. *Bel. Portr. d'Oiss. pag.* 47 *a, dans laquelle est la même figure.*
Vaneau. *Alb. Tom. I. pag.* 65; *avec une figure mal coloriée Pl.* 74.
Les Grecs l'appellent Ἀΐξ. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Bell. Jonst. Charlet.* Ταὼς ἄγριος. *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck.*
Les Turcs, GULGURUK. *Gesn. Aldrov.*
Les Portugais, BYBE. *Gesn. Aldrov.*
Les Catalans, PIGRA. *Barr.*
Les Italiens, PAONCELLO; PAONCHELLO. *Bel. Gesn.* PAONZELLO. *Aldrov.*
Les Italiens aux environs de Padouë, PAVONZINO. *Bel. Gesn. Aldrov.*
Les Vénitiens, PAON. *Gesn. Aldrov.*
Les Boulonnois, FILICETTA. *Aldrov.*
Les Allemands, GYVITT; GYBYTZ; ZWEIEL; KYUUTZ. *Gesn. Aldrov.* PIWIP. *Charlet.* KUVITZ. *Gesn.* KIWIT; HIMMEL-ZIEGE. *Rzac.* GRUNER; BLAW-GRUNER. *Aldrov.*
Les Suisses, GYFITZ. *Gesn. Aldrov. Schwenck.* GYBITZ; GYWITT. *Schwenck.* KIFITZ. *Rzac.*
Les Hollandois, KIVIDIT. *Aldrov.*
Les Illyriens, CZIEYKA. *Gesn. Aldrov.*
Les Polonois, CZAYKA; KOZIELEK; BARANEK. *Rzac.*
Les Suédois, WIPA; KOWIPA. *Linn.*
Les Anglois, LAP-WING. *Gesn. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. & quelques-uns*, LAP-WING PLOVER. *Alb.* BASTARD PLOVER. *Willugh.*

Raj. Charlet. Sibbald.

Les Anglois. Septentrionaux, TEWIT. *Raj.*

Il est à peu près de la grosseur d'un *Pigeon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces huit lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; sa queue quatre pouces cinq lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes & demie; son pied un pouce neuf lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur un pouce, l'intérieur onze lignes; & celui de derriere seulement trois lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds quatre pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un noir qui a un certain lustre de verd. De l'occiput sortent des plumes noires très-longues & étroites, qui forment une joli hupe : quelques-unes de ces plumes ont jusqu'à trois

Columbam crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues undecim pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim cum semi lineas longum est; cauda quatuor pollices & quinque lineas; pars crurum plumis denudata sex cum semi lineas; pes unum pollicem & novem cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas; posticus autem tres tantùm cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & quatuor pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad caudam ferè extremam pertingunt. Capitis superior pars nigra est cum aliquo virore mixta. Ab occipitio pennæ oriuntur nigræ, longissimæ, strictæ,

ſtrictæ, elegantem criſtam efficientes : ex iſtis autem pennis quædam trium pollicum & totidem linearum longitudinem obtinent. Caput ad latera tingit color albo-rufeſcens : quem colorem ſupra oculos & versùs occipitium variegant lineolæ longitudinales nigricantes. In utraque gena majuſcula extat macula nigricans, à qua tænia oritur concolor, infra oculos ducta, & versùs occipitium uſque protenſa. Pars colli ſuperior eſt cinerea, aliquâ viriditate perluſtrata. Dorſum & uropygium tingit elegans viridi-aureus color. Pennæ ſcapulares concolores ; plerarumque tamen minorum extremitates elegantiſſimo cupri puri colore perluſtrantur, majores verò ſunt in apice albido marginatæ. Guttur albicat. Collum inferius ad pectus uſque nigro imbuitur colore, cum aliquo virore mixto, pleriſque pennis in apice albo marginatis. Pectus, venter, latera & crurum ſuprema pars albicant. Pennæ caudam ſuperne cooperientes ſunt ſpadiceæ : quæ eam infernè obtegunt, eodem imbutæ colore, ſed dilutiore, & quælibet penna

pouces trois lignes de long. Les côtés de la tête ſont d'un blanc-rouſſâtre : cette couleur eſt variée au-deſſus des yeux & vers l'occiput de petites lignes longitudinales noirâtres. Sur chaque joue eſt une grande tache noirâtre, de laquelle part une bande de la même couleur, qui paſſe par-deſſous les yeux, & s'étend juſque vers l'occiput. La partie ſupérieure du col eſt d'un cendré orné d'un certain luſtre de verd. Le dos & le croupion ſont d'un beau verd-doré. Les plumes ſcapulaires ſont de la même couleur; mais l'extrémité de la plûpart des petites eſt d'une belle couleur de cuivre de roſette; & les grandes ſont bordées de blanchâtre par le bout. La gorge eſt blanche. La partie inférieure du col juſqu'à la poitrine eſt d'un noir orné d'un certain luſtre de verd, la plûpart des plumes étant terminées par une petite bordure blanche. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés ſont blancs. Les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un rouge-bai : celles du deſſous ſont de la même couleur, mais plus claire, & chaque plume eſt bordée de blanchâtre par le bout. Les couvertures du deſſous des aîles les plus proches du corps

ſont blanches : les plus éloignées du corps ſont noires. Les petites & les moyennes couvertures du deſſus des aîles ſont d'un noir-verd, changeant en violet ſombre : les grandes les plus proches du corps ſont du même verd-doré que le dos, & pluſieurs ſont bordées de blanchâtre par le bout : enfin les grandes les plus éloignées du corps, ainſi que l'aîle bâtarde, ſont d'un beau noir. L'aîle eſt compoſée de vingt-ſept plumes : les quatre premieres ſont noires & terminées de gris-blanc, cette couleur occupant d'autant plus d'eſpace, que la plume eſt plus extérieure : les ſix ſuivantes, ſçavoir depuis la cinquiéme juſqu'à la dixiéme incluſivement, ſont entiérement noires : les douze qui ſuivent, ſçavoir depuis l'onziéme juſqu'à la vingt-deuxiéme incluſivement, ſont blanches à leur origine, & noires dans le reſte de leur longueur, le blanc occupant d'autant plus d'eſpace, que la plume eſt plus proche du corps : les cinq plus proches du corps ont auſſi un peu de blanc à leur origine ; le reſte de leur longueur eſt d'un verd-doré en-deſſus & cendré en-deſſous. Ces dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt

in apice albido marginatur. Tectrices alarum inferiores corpori viciniores ſunt candidæ, à corpore remotiores nigræ. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ nigro-viridantes, violaceo obſcuro variantes : majores corpori finitimæ eodem imbuuntur viridi-aureo ac dorſum ipſum tingitur, & ex iſtis plures albido in apice marginantur: majores tandem à corpore remotiores, ſicut & ala notha, ſunt ſplendidè nigræ. Viginti ſeptem remigibus ala conflatur : quatuor primores nigræ, cinereo albo terminatæ, qui cinereo-albus color eo majus ſpatium occupat, quo remix ſit exterior : ſex quæ ſequuntur, à quinta ſcilicet ad decimam uſque incluſivè, penitùs nigræ : duodecim proximè ſequentes, ab undecima ſcilicet ad vigeſimam ſecundam uſque incluſivè, in exortu albæ, in reliqua longitudine nigræ, albedine eò majus ſpatium occupante, quò remix ſit corpori vicinior : quinque corpori finitimæ ſunt quoque in exortu candidæ, in reliqua longitudine ſuperne viridi-aureæ, infernè cinereæ. Quæ noviſſimè dictæ longæ ſunt & acu-

tæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Tertia & quarta reliquas omnes longitudine ſuperant. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum decem intermediæ ab ipſarum exortu mediam versùs longitudinem uſque candidæ, in reliqua longitudine ſplendidè nigræ, apice albido marginatæ : utrinque extima per totam longitudinem candida, attamen in latere interiore majuſculâ maculâ nigrâ versùs ipſius extremitatem inſignita. Oculorum irides avellaneæ. Roſtrum, ungueſque nigri. Pars crurum plumis denudata & pedes fuſco-rubeſcentes.

Fœmina à *mare* differt magnitudine quâ ei paulò cedit, & coloribus in parte corporis ſuperiore non ita vividis. Ab illo quoque diſcrepat criſtâ multò breviori. In reliquis cum illo perfectè convenit.

Inſectis victitant. In campeſtribus locis & juxta aquas degunt. *Ex muſeo Realmuriano.*

pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La troiſiéme & la quatriéme ſont les plus longues de toutes. La queue eſt compoſée de douze plumes : les dix du milieu ſont blanches depuis leur origine juſque vers la moitié de leur longueur, le reſte eſt d'un noir brillant, & bordé de blanchâtre par le bout : la plus extérieure de chaque côté eſt blanche dans toute ſa longueur, excepté une grande tache noire qu'elle a ſur le côté intérieur vers ſon extrémité. L'iris des yeux eſt de couleur de noiſette. Le bec & les ongles ſont noirs. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un brun-rougeâtre.

La *femelle* différe du *mâle* en ce qu'elle eſt un peu plus petite, & que les couleurs du deſſus de ſon corps ſont moins vives. Elle en différe encore en ce que ſa hupe eſt beaucoup plus courte. Du reſte elle lui reſſemble parfaitement.

Ils ſe nourriſſent d'*Inſectes*. On les trouve dans les champs & ſur les bords des eaux. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. LE VANNEAU GRIS.

Voyez Pl. IX. Fig. 1.

Vanellus superne griseo-fuscus, marginibus pennarum albidis, infernè albo & fusco-nigricante varius; gutture & imo ventre albis; rectricibus candidis, fusco transversim striatis.... VANELLUS GRISEUS.

Pardalus. *Gesn. Avi. pag.* 639.
Pardalus secundus. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 316.
Pluvialis cinerea, seu Pardalus Aristotelis. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 533. *hujus icon non satis accurata pag.* 534.
Pluvialis cinerea. *Jonst. Avi. pag.* 114. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53.
Raj. Syn. Avi. pag. 111. *N°. A.* 3.
Charlet. Exer. pag. 113. *N°.* 1.
Charlet. Onomazt. pag. 109. *N°.* 1.
Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 415.
Pluvialis cinerea flavescens. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag.* 19.
Pluvialis cinerea, Squatarola Venetiis dicta. *Willugh. Ornith. pag.* 229. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LVII.*
Marsil. Danub. Tom. V. pag. 56. *hujus icon non satis accurata Tab.* 26. (*rostrum longius*).
Pluvialis totus cinereus. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. VII. sp.* 2.
Gavia, s. Pluvialis cinerea. *Klein. Avi. pag.* 20. *N°.* 3.
Tringa nigro-fusca, subtus alba, rostro nigro, pedibus virescentibus. *Faun. Suec. Linn. N°.* 155.
Tringa Augusti mensis. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 60. sp.* 11.
Tringa rostro nigro, pedibus virescentibus, corpore griseo, subtus albido. Squatarola. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *sp.* 13.
Numenius pullus subtus albidus. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag.* 478.
Vanellus fuscus: Kyvitta fusca. Merula novalium. *Schwenckfeldii.*
Pluvier gris. *Bel. Hist. nat. des Oif. pag.* 262; *avec une mauvaise figure pag.* 263.
Bel. Portr. d'Oif. pag. 63 *b, dans laquelle est la même figure.*
Alb. Tom. I. pag. 67; *avec une figure mal coloriée Pl.* 76.
Les Grecs l'appellent Πάρδαλος. *Gesn. Aldrov.*
Les Boulonnois, PIVIER MONTANO. *Aldrov.*
Les Vénitiens, SQUATAROLA. *Willugh. Sibbald. Marsil. Klein.*
Les Allemands, GRAVER KEUWIT. *Rzac.* GRAWER GYFITZ; GROSSER

BRACH-VOGEL; BRACH AMSEL. *Schwenck.*
Les Polonois, PTAK DESSCZOWY POPIELATY. *Rzac.*
Les Anglois, GREY PLOVER. *Willugh. Raj. Charlet. Alb. Browne.* STONE-PLOVER. *Charlet.*
Les Anglois de la Jamaïque, WAG-TAIL. *Browne.*

Crassitie *Pluvialem auream* circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem decem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues undecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda duos pollices cum decem lineis; pars crurum plumis denudata decem cum semi lineas; pes unum pollicem & sex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim cum semi lineas, extimus undecim cum semi lineas, intimus decem lineas; posticus autem solummodo sesquilineam. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & decem pollicum intervallo distant, alæ verò complicatæ ad quatuor usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Caput, partem colli

Il est à peu près de la grosseur du *Pluvier doré*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces deux lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue deux pouces dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix lignes & demie; son pied un pouce six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes & demie, l'extérieur onze lignes & demie, l'intérieur dix lignes; & celui de derriere une ligne & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied dix pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à quatre lignes au-delà du bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes d'un gris-brun, bordées de

87634

blanchâtre. Les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur. La gorge eſt blanche. La partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés ſont variés de blanc & de brun-noirâtre. Le bas-ventre & le haut des jambes ſont tout-à-fait blancs, ainſi que les couvertures du deſſous de la queue & celles du deſſous des aîles. Les petites couvertures du deſſus des aîles ſont de la même couleur que les plumes du dos : les grandes les plus proches du corps ſont d'un gris-brun, & marquées ſur leurs bords de taches blanches : enfin les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un brun-noirâtre, & bordées de blanc par le bout. L'aîle bâtarde eſt d'un brun foncé. Les plumes de l'aîle (excepté les trois plus proches du corps) ſont d'un brun-noirâtre d'autant moins foncé, que la plume eſt plus proche du corps, & ont depuis leur origine juſque vers les deux tiers de leur longueur la plus grande partie de leur côté intérieur blanche : toutes, excepté les deux premieres, ſont de plus marquées d'une petite tache blanche, placée auprès de leur tige ſur le côté extérieur vers les deux tiers de

ſuperiorem, dorſum & uropygium veſtiunt pennæ griſeo-fuſcæ, marginibus albidis præditæ. Scapulares & ſuperiores caudæ tectrices concolores. Guttur albicat. Pars colli inferior, pectus, venter ſupremus & latera albo & fuſco-nigricante variegantur. Venter imus, crurum ſuprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas ſubtus obtegentes penitùs albent. Tectrices alarum ſuperiores minores ſunt pennis dorſum veſtientibus concolores : majores corpori finitimæ griſeo-fuſcæ, maculis candidis ſupra ipſarum margines inſignitæ : majores tandem à corpore remotiores fuſco-nigricantes, albo in apice marginatæ. Ala notha eſt ſaturatè fuſca. Alarum remiges (tribus corpori vicinioribus exceptis) tingit color fuſco-nigricans eò minùs ſaturatus, quò remix ſit corpori finitima; attamen ab ipſarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes uſque ſunt in latere interiore maximâ parte candidæ : omnes inſuper, duabus primoribus exceptis, minutâ inſigniuntur maculâ candidâ, prope ſcapum in latere exteriore, versùs duas tertias lon-

gitudinis partes positâ : tres remiges corpori viciniores sunt per totam longitudinem griseo-fuscæ. Quæ tres novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ, fusco transversim striatæ : laterales autem in latere interiore eò minùs insigniuntur tæniis fuscis, quò exteriores fiunt ; & utrinque extima unicâ tantùm tæniâ fuscâ in latere exteriore notatur. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigricant. Juxta maris littora degit. *Ex museo Realmuriano.*

leur longueur : les trois plumes les plus proches du corps sont d'un gris-brun dans toute leur longueur. Ces trois dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches, rayées transversalement de brun : les latérales ont du côté intérieur d'autant moins de bandes brunes, qu'elles sont plus extérieures ; & la plus extérieure de chaque côté n'a même qu'une de ces bandes sur son côté extérieur. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 3. LE VANNEAU VARIÉ.

Voyez Pl. IX. Fig. 2.

Vanellus superne fuscus, albido variegatus, infernè albus ; collo inferiore maculis longitudinalibus griseo-fuscis vario ; rectricibus decem intermediis albis, fusco transversim striatis, utrinque extima alba, tæniâ longitudinali fuscâ exteriùs notata . . . . VANELLUS VARIUS.

Pardali Bellonii congener. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 530, *in qua hujus icon non satis accurata.*

Præcedentem crassitie paululùm antecellit. Ipsius lon-

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur de-

puis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'onze pouces ; & juſqu'à celui des ongles d'onze pouces onze lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long ; ſa queue deux pouces neuf lignes ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, dix lignes ; ſon pied un pouce huit lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur onze lignes, l'intérieur dix lignes ; & celui de derriere une ligne & demie ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a un pied onze pouces huit lignes de vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à ſix lignes au-delà du bout de la queue. La tête, la partie ſupérieure du col, le dos & les plumes ſcapulaires ſont d'un brun varié de blanchâtre, de façon que chaque plume eſt brune, marquée ſur ſes bords de petites taches rondes blanchâtres, & bordée de la même couleur par le bout. Celles qui couvrent le croupion ſont pareillement brunes, bordées & variées de même de taches, mais

gitudo ab apice roſtri ad caudam extremam undecim pollices explet, & ad extremos ungues undecim pollices & totidem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quindecim lineas longum eſt ; cauda duos pollices & novem lineas ; pars crurum plumis denudata decem lineas ; pes unum pollicem cum octo lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus undecim lineas, intimus decem lineas ; poſticus autem ſeſquilineam tantùm. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt unius pedis undecim pollicum & octo linearum ; alæ verò complicatæ ad ſex uſque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Caput, pars colli ſuperior, dorſum & ſcapulares pennæ ſunt fuſcæ, albido variegatæ ; ita ut unaquæque penna ſit fuſca, ſupra margines minutis maculis rotundis albidis inſignita, & eodem colore in apice marginata. Quæ uropygium obtegunt, ſunt quoque fuſcæ, marginibus

marginibus & maculis, non quidem albidis, sed flavicantibus, similiter præditæ. Superiores caudæ tectrices albicant, paucoque griseo & flavicante ad apicem variegantur. Guttur candidum. Partem colli inferiorem vestiunt pennæ in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem griseo-fuscæ, & ad margines candidæ. Pectus, venter, latera, crurum pars suprema, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albent. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori viciniores, sunt pennis dorsum vestientibus concolores: majores à corpore remotiores nigricantes, albo in apice fimbriatæ. Ala notha nigricat. Remiges alarum majores sunt quoque nigricantes, attamen ab ipsarum exortu versùs tres quartas longitudinis partes usque in latere interiore maximâ parte candidæ; ex istis quinque, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, sunt insuper albo in apice marginatæ: proximè sequentes in latere interiore albæ, in latere exteriore griseo-fuscæ, albo fimbriatæ: sex corpori finitimæ fuscæ, maculis

qui, au lieu d'être blanchâtres, sont jaunâtres. Les couvertures du dessus de la queue sont blanches, & variées à leur bout d'un peu de gris & de jaunâtre. La gorge est blanche. La partie inférieure du col est couverte de plumes d'un gris-brun dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & blanches sur leurs bords. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les plumes du dos : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées de blanc par le bout. L'aîle bâtarde est noirâtre. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur, & ont depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur la plus grande partie de leur côté intérieur blanche ; cinq de celles-là, sçavoir depuis la cinquiéme jusqu'à la neuviéme inclusivement, sont de plus bordées de blanc par le bout : les suivantes sont blanches du côté intérieur, d'un gris-brun & bordées de blanc du côté extérieur: les six plus proches du corps

font brunes, & variées sur leurs bords de taches blanchâtres. Ces dernieres sont longues & pointues, & lorsque l'aîle est pliée, il ne s'en faut que de quinze lignes qu'elles ne s'étendent aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La premiere des plumes de l'aîle est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes : les dix du milieu sont blanches, & rayées transversalement de brun; le blanc tire un peu sur le jaunâtre sur les deux plumes du milieu & sur le côté extérieur des latérales : ces dernieres ont du côté intérieur d'autant moins de bandes brunes, qu'elles sont plus extérieures : la plus extérieure de chaque côté est blanche, & marquée seulement sur son côté extérieur d'une bande longitudinale brune. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

candicantibus ad margines variegatæ. Quæ nuper descriptæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates, exceptâ tantùm quindecim linearum distantiâ, pertingunt. Remix prima reliquarum omnium longitudinem excedit. Cauda duodecim constat rectricibus, quarum decem intermediæ albæ, fusco transversim striatæ; quæ albedo in rectricibus binis intermediis & in lateralium exteriore latere ad flavicantem colorem paululùm inclinat : laterales autem eò minùs interiùs insigniuntur tæniis fuscis, quò exteriores fiunt : utrinque extima alba, tæniâ tantùm longitudinali fuscâ in latere exteriore notata. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Juxta maris littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

** 4. Le Vanneau de Suisse.

Voyez Pl. X. Fig. 1.

Vanellus nigricans, superne maculis transversis albis varius syncipite albido; capite & collo superioribus fuscis, marginibus pennarum albidis; imo ventre albo; rectricibus candidis, fusco-nigricante transversim striatis, utrinque

extimâ interiùs penitùs candidâ . . . . VANELLUS HELVETICUS.

Cum *Vanello nostrate* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem decem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues undecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata decem lineas; pes unum pollicem cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas, extimus undecim cum semi lineas, intimus decem cum semi lineas; posticus autem solummodo sesquilineam. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & decem pollicum; alæ verò complicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Synciput candicat. Partes capitis & colli superiores vestiunt pennæ fuscæ, candicante marginatæ: versùs colli latera procedendo, pennæ ferè

Il est à peu près de la grosseur du *nôtre*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix lignes; son pied un pouce huit lignes; celui du milieu des trois doigts anterieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur onze lignes & demie, l'intérieur dix lignes & demie; & celui de derriere une ligne & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied dix pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le sinciput est blanchâtre. Les parties supérieures de la tête & du col sont couvertes de plumes brunes, bordées de blanchâtre: en approchant des côtés du col les plumes sont presque entiérement blanches, & sont seule-

ment marquées dans leur milieu d'une petite tache brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Les plumes qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont noirâtres, & marquées sur les deux côtés de taches transversales blanches. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, sont grises, & marquées de même sur les deux côtés de taches transversales blanches. Les côtés de la tête au-dessous des yeux, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont noirâtres : cependant les côtés de la poitrine sont variés d'un peu de blanc. Le bas-ventre & le haut des jambes sont blancs. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Celles du dessous des aîles sont pareillement blanches, si l'on en excepte les grandes les plus proches du corps, qui sont noirâtres. Les plus petites couvertures du dessus des aîles sont brunes & bordées de blanc : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes, & marquées des deux côtés de grandes taches blanches : les grandes les plus éloig-

penitùs albicant, & in ipsarum medio minutâ tantùm notantur maculâ fuscâ, secundùm scapi longitudinem ductâ. Quæ partem dorsi supremam obtegunt, sicut & scapulares, sunt nigricantes, in utroque latere maculis transversis albis insignitæ. Quæ verò dorsum infimum & uropygium cooperiunt, sunt griseæ, & in utroque latere maculis transversis albis similiter notatæ. Caput ad latera, idque infra oculos, guttur, collum inferiùs & ad latera, pectus, venter supremus & latera nigricant: pectus tamen ad latera pauco variegatur candido. Venter imus & crurum suprema pars albicant. Pennæ caudam superne & infernè tegentes eodem candore nitent. Inferiores alarum tectrices sunt similiter candidæ, exceptis tamen majoribus corpori finitimis nigricantibus. Tectrices alarum superiores minimæ fuscæ, albo fimbriatæ : mediæ, sicut & majores corpori viciniores, fuscæ, in utroque latere majusculis maculis albis notatæ : majores à corpore remotiores fusco-nigricantes, albido in apice marginatæ. Alam componunt viginti sep-

tem remiges : decem primores sunt fusco-nigricantes, attamen ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque in latere interiore maximâ parte candidæ; ex istis quinque primores scapo donantur à tribus circiter quartis ipsarum longitudinis partibus versùs extremitatem usque candido; reliquæ quinque, à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè, eodem in loco maculâ insigniuntur candidâ, in latere exteriore collocatâ; quæ macula eò major est, quò remix sit corpori vicinior : undecim proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, fuscæ, in latere exteriore & apice albo marginatæ, & insuper in latere interiore maximâ parte candidæ : sex tandem corpori finitimæ fuscæ, in utroque latere majusculis maculis transversis sordidè albis insignitæ. Quæ novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim constat rectricibus candidis : binæ intermediæ à quarta circiter longitudinis parte ad ipsa-

nées du corps sont d'un brun-noirâtre, & bordées de blanchâtre par le bout. L'aîle est composée de vingt-sept plumes: les dix premieres sont d'un brun-noirâtre, & ont depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur la plus grande partie de leur côté intérieur blanche; de celles-là les cinq premieres ont leur tige blanche depuis environ les trois quarts de leur longueur jusque vers leur bout; les cinq autres, sçavoir depuis la sixiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont marquées dans le même endroit d'une tache blanche, placée sur leur côté extérieur, & qui est d'autant plus grande, que la plume est plus proche du corps : les onze suivantes, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la vingt-uniéme inclusivement, sont brunes, & bordées de blanc extérieurement & par le bout; elles ont de plus la plus grande partie de leur côté intérieur blanche : enfin les six plus proches du corps sont brunes, & marquées sur les deux côtés de grandes taches transversales d'un blanc sale. Ces dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est

composée de douze plumes blanches : les deux du milieu sont rayées transversalement de brun-noirâtre depuis environ le quart de leur longueur jusqu'à leur extrémité : les latérales sont rayées de même du côté extérieur ; mais leur côté intérieur n'est marqué de ces bandes transversales que vers le bout de la plume : de plus chacune de ces plumes a d'autant moins de bandes transversales, qu'elle est plus extérieure ; de sorte que la plus extérieure de chaque côté n'en a que deux du côté extérieur, & point du tout du côté intérieur : celle qui la suit immédiatement, en a trois du côté extérieur, & une seulement du côté intérieur ; & ainsi des suivantes. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve en *Suisse*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Gannebin*.

rum extremitatem usque sunt fusco-nigricante transversim striatæ : laterales in latere exteriore similiter striatæ, in latere autem interiore tæniis istis transversis versùs ipsarum extremitatem tantùm notatæ : rectrices verò laterales eò minùs tæniis insigniuntur transversis, quò exteriores fiunt ; ita ut utrinque extima in latere exteriore binis tantùm sit notata tæniis, in interiore nullâ : proximè sequens in latere exteriore tribus, in interiore unicâ tantùm tæniâ notetur ; & sic de cæteris. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Helvetia*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Gannebin*.

5. LE GRAND VANNEAU DE BOLOGNE.

Vanellus superne niger, infernè candicans ; capite & collo superiore castaneis ; collo inferiore & pectore maculis ferrugineis vario ; rectricibus nigris . . . . VANELLUS BONONIENSIS MAJOR.

Ginocchiella vulgò. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 538. *hujus icon minimè accurata pag.* 539.

Les Boulonnois l'appellent GINOCCHIELLA. *Aldrov.*

Magnitudine & craſſitie *Vanellum noſtratem* multùm antecellit. Caput & collum ſuperius caſtaneo imbuuntur colore. Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, alas ſuperne veſtientes & ſuperiores caudæ tectrices ſunt nigræ. Guttur, collum inferius & pectus candicant, & maculis variegantur ferrugineis. Venter, latera, crurum ſuprema pars, inferioreſque caudæ tectrices candicant quidem, ſed maculis deſtituuntur. Remiges ſunt nigræ. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Roſtrum in exortu flavicans, in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque ex flavo ad ochræ colorem vergentes; ungues verò nigri. Habitat in *Italia* circa *Bononiam.*

Il eſt beaucoup plus grand & plus gros que *notre Vanneau.* La tête & la partie ſupérieure du col ſont de couleur de marron. Le dos & le croupion ſont noirs. Les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus des aîles & celles du deſſus de la queue ſont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine ſont blanchâtres, & variées de taches ferrugineuſes. Le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du deſſous de la queue ſont blanchâtres & ſans taches. Les plumes de l'aîle ſont noires. La queue eſt compoſée de douze plumes de la même couleur. Le bec eſt jaunâtre à ſon origine, & noir à ſon bout. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un jaune tirant ſur la couleur d'ochre, & les ongles ſont noirs. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne.*

** 6. Le Vanneau armé du Sénégal.

Voyez Pl. X. Fig. 2.

Vanellus griſeo-fuſcus, ſuperne ſaturatiùs, infernè dilutiùs; ſyncipite candido; gutture nigro; imo ventre ſordidè albo; rectricibus primâ medietate ſordidè albis, alterâ nigris, ſordidè albo-rufeſcente terminatis; membranâ utrinque roſtrum inter & oculum luteâ, deorſum dependente; alis armatis . . . . Vanellus Senegalensis armatus.

Il est à peu près de la grosseur de *notre Vanneau.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces dix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; sa queue trois pouces deux lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce neuf lignes; son pied trois pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes & demie, l'extérieur douze lignes & demie, l'intérieur onze lignes; & celui de derriere deux lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds trois pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à quinze lignes au-delà du bout de la queue. De chaque côté de la tête, entre le bec & l'œil, est une membrane mince, d'un beau jaune, longue d'onze lignes sur quatre de largeur, qui n'est attachée à la tête que par un de ses côtés, & qui pend en en-bas, en se terminant en pointe. Le

Cum *Vanello nostrate* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem æquat, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & quinque lineas longum est; cauda tres pollices & lineas binas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum novem lineis; pes tres pollices cum linea unica; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim cum semi lineas, extimus duodecim cum semi lineas, intimus undecim lineas; posticus autem binas solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & trium pollicum; alæ verò complicatæ ad quindecim usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. In utroque capitis latere, rostrum inter & oculum, membrana extat gracilis, eleganter lutea, undecim lineas

neas longa, quatuor lata, in uno tantùm latere capiti adnexa, deorsum dependens, & in acumen desinens. Synciput tingit candidus color. Guttur nigrum est. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & tectrices alarum superiores minores sunt griseo-fuscæ. Pars colli inferior, pectus, venter supremus, latera & crurum pars suprema eodem imbuuntur colore, sed multò dilutiore. Venter imus, tectrices caudæ superiores & inferiores, pennæ alas subtus obtegentes & superiores alarum tectrices majores corpori finitimæ sordidè albicant : majores à corpore remotiores sunt nigræ. Viginti octo remigibus ala conflatur : decem primores nigræ, attamen in latere interiore versùs ipsarum exortum tantùm sordidè albæ : decem proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, in exortu sordidè albæ, versùs extremitatem nigræ ; sordidè albus autem color eò majus spatium occupat, quò remix sit corpori vicinior : vigesima prima grisea, nigricante terminata : reliquæ omnes

synciput est blanc. La gorge est noire. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun. La partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre, le haut des jambes & les côtés sont de la même couleur, mais beaucoup plus claire. Le bas-ventre, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les grandes du dessus les plus proches du corps sont d'un blanc sale : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aîle est composée de vingt-huit plumes : les dix premieres sont noires, excepté leur côté intérieur qui est d'un blanc sale vers l'origine de la plume seulement : les dix suivantes, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont d'un blanc sale à leur origine, & noires vers le bout ; le blanc sale s'étend d'autant plus loin que la plume est plus proche du corps : la vingt-uniéme est grise & terminée de noirâtre : toutes les autres sont d'un gris-brun d'autant plus foncé, que la plume est plus proche du corps. De ces dernieres les plus proches du corps sont longues & pointues ;

& s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, auſſi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un blanc ſale depuis leur origine juſque vers la moitié de leur longueur; le reſte eſt noir, & terminé de blanc ſale & rouſſâtre. Sur la partie antérieure de l'aîle, ſçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, eſt une eſpece d'épron long de deux lignes & demie, & qui ſe termine en une pointe très-aiguë : il eſt noir & d'une ſubſtance pareille à de la corne. Le bec eſt d'un verd-jaunâtre, excepté ſon bout, qui eſt noirâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont auſſi d'un verd-jaunâtre; & les ongles noirâtres. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanſon.*

colore imbutæ griſeo-fuſco eò ſaturatiore, quò remix ſit corpori finitima. Ex iſtis noviſſimè dictis corpori viciniores longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices ab ipſarum exortu mediam versùs longitudinem uſque ſordidè albæ, in reliqua longitudine nigræ, ſordidè albo-rufeſcente terminatæ. In parte alarum anteriore, ſcilicet versùs articulum carpo humano reſpondentem, calcar extat binas cum ſemi lineas longum, in aciem acutiſſimum deſinens, nigrum, ſubſtantiæ corneæ æmulum. Roſtrum viridi-flavicans, attamen in extremitate nigricans. Pars crurum plumis denudata & pedes ſunt quoque viridi-flavicantes; ungues verò nigricant. Habitat in *Senegalenſi* regione, unde in *muſeum Realmurianum* miſſus à *D. Adanſon.*

** 7. LE VANNEAU ARMÉ DE LA LOUISIANE.

Voyez Pl. VIII. Fig. 2.

Vanellus ſuperne griſeo-fuſcus, infernè albo-fulveſcens; capite ſuperiore nigro; rectricibus albo-fulveſcentibus, nigro terminatis, albo-fulveſcente in apice marginatis; membranâ utrinque roſtrum inter & oculum luteo-aurantiâ;

supra oculum ductâ, & deorsum dependente; alis armatis .... VANELLUS LUDOVICIANUS ARMATUS.

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues tredecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim cum semi lineas longum est; cauda tres pollices & novem lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum quinque lineis; pes duos pollices & novem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim cum semi lineas, extimus duodecim cum semi lineas, intimus undecim lineas; posticus autem binas tantùm cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum quatuor pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad sex usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. In utroque capitis latere, rost-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces deux lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes & demie de long; sa queue trois pouces neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce cinq lignes; son pied deux pouces neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes & demie, l'extérieur douze lignes & demie, l'intérieur onze lignes; & celui de derriere deux lignes & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds quatre pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. De chaque côté de la tête, entre le bec & l'œil, est une membrane mince, d'un jaune-orangé, longue de quatorze lignes sur

onze de largeur, dont une partie s'étend au-dessus des yeux, tandis que l'autre pend en en-bas, en se terminant en pointe. Le dessus de la tête est noir. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous des aîles, celles du dessous de la queue & les grandes du dessus sont d'un blanc tirant un peu sur le fauve. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aîle bâtarde est d'un gris-brun. L'aîle est composée de vingt-six plumes : les trois premieres sont noires, & terminées de gris-brun foncé, cette couleur occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus extérieure : les sept suivantes, sçavoir depuis la quatriéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont tout-à-fait noires : les onze qui suivent, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la vingt-uniéme inclusivement, sont grises à leur origine, &

trum inter & oculum, membrana extat gracilis, luteo-aurantia, quatuordecim lineas longa, undecim lata, cujus pars una supra oculum protenditur, dum altera deorsum dependet, & in acumen desinit. Caput superius tingit color niger. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, tectricesque caudæ superiores minores sunt griseo-fuscæ. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ alas subtus obtegentes, & tectrices caudæ inferiores, sicut & superiores majores ex albo nonnihil ad fulvum vergunt. Superiores alarum tectrices, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores sunt nigræ. Ala notha griseo-fusca. Alam componunt viginti sex remiges : tres primores sunt nigræ, griseo-fusco saturato terminatæ, qui color griseo-fuscus eò majus spatium occupat, quò remix exterior fit : septem proximè sequentes, à quarta scilicet ad decimam usque inclusivè, penitùs nigræ : undecim quæ sequuntur, ab

undecima scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, sunt in exortu griseæ, nigro terminatæ, colore griseo eò majus spatium occupante, quò remix fit corpori vicinior; ita ut undecima sit solummodo in exòrtu grisea, in reliqua verò longitudine nigra; in sequentibus autem color niger sensim atque sensim minus spatium occupat, ita ut vigesima prima sit tantùm in extremitate nigra: quinque corpori finitimæ sunt dorso concolores. Quinque istæ novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Ex remigibus tertia & quarta sunt omnium longissimæ. Cauda duodecim constat rectricibus ex albo nonnihil ad fulvescentem vergentibus colorem, nigro terminatis, & albo-fulvescente in apice marginatis. In parte alarum anteriore, scilicet versùs articulum carpo humano respondentem, calcar extat quatuor cum semi lineas longum, in basi duarum cum semi linearum latitudinem obtinens, in aciem acutissimum desinens, flavum, substantiæ corneæ æmulum. Rostrum aurantio

terminées de noir, le gris occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps; de sorte que l'onziéme n'a de gris qu'à son origine, & est noire dans tout le reste de sa longueur; ensuite le noir diminue peu à peu dans les suivantes, de façon que la vingt-uniéme n'a de noir qu'à son extrémité: les cinq plus proches du corps sont de la même couleur que le dos. Ces cinq dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. Les troisiéme & quatriéme plumes de l'aîle sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes d'un blanc tirant tant soit peu sur le fauve, terminées de noir, & bordées par le bout de blanc-fauve. Sur la partie antérieure de l'aîle, sçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, est une espece d'épron long de quatre lignes & demie, large de deux lignes & demie à sa bâse & qui se termine en une pointe très-aiguë: il est jaune, & d'une substance pareille à de la corne. Le bec est orangé. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un rouge foncé; & les ongles noirâtres. On le

trouve à la *Louisiane*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son *cabinet*.

imbuitur colore. Pars crurum plumis denudata, pedesque sunt saturatè rubri; ungues verò nigricantes. Habitat in *Ludovicia*, unde in *museum D. Aubry* missus est.

** 8. Le Vanneau armé de S. Domingue.

Vanellus dilutè fulvus, infernè ad roseum colorem inclinans; rectricibus dilutè fulvis, lateralibus interiùs ad roseum colorem vergentibus; membranâ utrinque rostrum inter & oculum luteâ, supra oculum ductâ & deorsum dependente; alis armatis . . . . Vanellus Dominicensis armatus.

Il est à peu près de la grosseur de *notre Vanneau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces cinq lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long; sa queue deux pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce neuf lignes; son pied trois pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur un pouce, l'intérieur dix lignes & demie; & celui de derriere une ligne & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs

Vanellum nostratem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices explet, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum est; cauda duos pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum novem lineis; pes tres pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus unum pollicem, intimus decem cum semi lineas; posticus autem sesquilineam tantùm. Trium digitorum

anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis decem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. In utroque capitis latere, rostrum inter & oculum, membrana extat gracilis, eleganter lutea, tredecim lineas longa, undecim circiter lata, cujus pars una supra oculum protenditur, dum altera deorsum dependet, & in acumen desinit. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ dilutè fulvæ. Scapulares & superiores caudæ tectrices eodem colore tinguntur. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, pars crurum suprema, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes ex dilutissimo fulvo ad roseum colorem nonnihil inclinant. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur: majores à corpore remotiores fulvo tinguntur nonnihil saturatio-

est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied dix pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. De chaque côté de la tête, entre le bec & l'œil, est une membrane mince, d'un beau jaune, longue de treize lignes sur environ onze de largeur, dont une partie s'étend au-dessus des yeux, tandis que l'autre pend en en-bas, en se terminant en pointe. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un fauve clair. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont aussi d'un fauve très-clair & tirant tant soit peu sur le couleur de rose. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un fauve un peu plus foncé. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un fauve rembruni, ayant la plus grande par-

tie de leur côté intérieur d'un fauve plus clair : les moyennes sont de la même couleur que le dos. De ces dernieres les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un fauve clair : les latérales sont de la même couleur du côté extérieur, & d'un fauve très-clair tirant sur le couleur de rose du côté intérieur. Sur la partie antérieure de l'aîle, sçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, est une espece d'épron long de trois lignes & demie, & qui se termine en une pointe très-aiguë : il est jaune & d'une substance pareille à de la corne. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont jaunes. On le trouve en différens endroits de l'*Amérique*. Il a été envoyé de *S. Domingue* à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

re. Remiges majores sunt fulvæ, ad fuscum paululùm vergentes, attamen in latere interiore maximâ parte fulvo dilutiore tinctæ : minores dorso concolores. Ex minoribus autem remigibus corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ dilutè fulvæ : laterales in latere exteriore concolores, in interiore verò ex dilutissimo fulvo ad roseum colorem nonnihil vergentes. In parte alarum anteriore, scilicet versùs articulum carpo humano respondentem, calcar extat tres cum semi lineas longum, in aciem acutissimum desinens, flavum, substantiæ corneæ æmulum. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque flavi. Habitat in variis *Americæ* regionibus. Ex *Dominicensi Insula* in *museum Realmurianum* missus est à *D. Chervain*.



Dessiné et Gravé par Martinet

1. Vanneau. 2. Vanneau armé de la Louisiane.

Dessiné et Gravé par Martinet

1. *Vanneau gris.* 2. *Vanneau varié.*



Dessiné et Gravé par Martinet

1. Vanneau de Suisse.

2. Vanneau armé du Sénégal.

LXXI.

Genus Jacanæ.

Hujus character eſt
Digiti quatuor, membranis deſtituti; tres ſcilicet antici, poſticus unus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Roſtrum rectum, in apice craſſius:
Unguiculi longiſſimi.

LXXI.

Le genre du Jacana.

Son caractere eſt d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec droit & renflé vers le bout:
Les ongles très-longs.

1. LE JACANA.

Jacana nigro-viridans; capite anteriore membranâ dilutè cœruleâ obducto; capite, collo & pectore ſplendidè violaceo colore variantibus; tectricibus caudæ inferioribus albis; rectricibus nigro-viridantibus . . . . JACANA.

Jacana. *Piſon. Hiſt. Nat. pag.* 90, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*
Jacana Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 190, *in qua hujus icon minùs accurata.*
Jonſt. Avi. pag. 130. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 57.
Gallinula Braſilienſis, Jacana dicta. *Willugh. Ornith. pag.* 237. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LIX.*
Gallinula Braſilienſibus Jacana dicta Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 115. *N°.* 8.
Les Flamands l'appellent WATER-HOEN. *Piſon.* WATER-HUN. *Marcgr. Jonſt.*
Les Braſiliens, JACANA. *Marcgr. Jonſt. Willugh. Raj.*

Craſſitie *Columbam* adæquat; ſed collo & pedibus donatur multò longioribus. Roſtrum habet ab ipſius apice ad oris angulos uſque unum pollicem & ampliùs longum. Pars crurum plu-

Il eſt de la groſſeur d'un *Pigeon*; mais il a le col & les pieds beaucoup plus longs. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a plus d'un pouce de long; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, en-

viron dix-huit lignes ; son pied environ deux pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est extrêmement long. Tous les ongles des doigts antérieurs sont longs d'un demi-pouce. Le devant de la tête est couvert par une membrane ronde d'un bleu clair ou de couleur de Turquoise. La tête, la gorge, le col & la poitrine sont d'un noir-verd, changeant en un violet éclatant. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, celles du dessus de la queue, le ventre, les côtés & le haut des jambes sont d'un noir-verd. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Les plumes de l'aîle sont aussi d'un noir changeant en verd. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec est d'une belle couleur d'écarlate depuis son origine jusqu'à la moitié de sa longueur, & de là jusqu'à son bout il est d'un jaune tirant un peu sur le verd. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune-verdâtre ; & les ongles tout-à-fait jaunes. On le trouve au

mis denudata octodecim circiter lineas longa est ; pes duos pollices cum tribus circiter lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus longissimus. Ungues autem omnes digitorum anticorum semi pollicis longitudinem obtinent. Caput anterius membranâ quâdam obducitur rotundâ dilutè cœruleâ sive Turcoidis colore imbutâ. Caput, guttur, collum & pectus ex nigro viridescunt, & splendidè violaceo colore variant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne vestiunt, superiores caudæ tectrices, venter, latera & pars crurum suprema sunt nigro-viridantes. Tectrices caudæ inferiores albæ. Alarum remiges ex nigro quoque viridescunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Rostrum ab ipsius exortu ad medietatem usque egregii est miniati coloris, à medietate ad apicem flavi, cui aliquid viriditatis admixtum est. Pars crurum plumis denudata, pedesque flavo-viridescentes ; ungues verò lutei. Ha-

bitat in palustribus *Brasiliæ* locis. *Brésil* dans les marais.

2. Le Jacana armé ou le Chirurgien.

Jacana nigro-viridans; alis ad fuscum vergentibus, armatis; rectricibus nigro-viridantibus . . . . Jacana armata.

Jacanæ alia species, Brasiliensibus Aguapecaca dicta. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 191.
Jonst. Avi. pag. 130.
Gallinula Brasiliensis Aguapecaca dicta. *Willugh. Ornith. pag.* 237.
Raj. Syn. Avi. pag. 115. *N*. 9.
Gallina aquatica, minor, alticrura, alis cornutis. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 132.
Porphyrio Americanus, alticrus, alis cornutis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXIV. sp.* 5.
Les François de la Guiane l'appellent Poule-d'eau. *Barr.*
Les Indiens de la Guiane, Kapoua. *Barr.*
Les Brasiliens, Aguapecaca. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Magnitudine & crassitie cum præcedente convenit. Totum corpus pennis vestitur nigro-viridantibus. Alæ tamen ad fuscum vergunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigro-viridantes. In parte alarum anteriore, scilicet versùs articulum carpo humano respondentem, calcar extat rectum, acutissimum, flavum, substantiæ corneæ æmulum, quo se defendit. Habitat in palustribus *Brasiliæ* locis.

Il est de la grandeur & de la grosseur du précédent. Tout son corps est couvert de plumes d'un noir-verd. Ses aîles tirent cependant sur le brun. La queue est composée de douze plumes d'un noir-verd. Sur la partie antérieure de l'aîle, sçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, est une espece d'épron droit, très-pointu, jaune & d'une substance semblable à de la corne, au moyen duquel il se défend. On le trouve dans les marais du *Brésil*.

3. Le Chirurgien noir.

Jacana ſuperne nigra, infernè fuſca; capite anteriore membranâ rufâ obducto; remigibus viridibus, apice fuſcis; rectricibus nigris; alis armatis .... Jacaña armata nigra.

Jacanæ tertia ſpecies. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 191. *Jonſt. Avi. pag.* 131.

Gallinula Braſilienſis tertia Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 237. *Raj. Syn. Avi. pag.* 115. *N°.* 10.

Il eſt de la grandeur & de la groſſeur des précédens. La partie antérieure de la tête eſt couverte par une membrane rouſſe. La tête, la gorge, le col, le dos & le croupion ſont noirs. Les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur. Les plumes qui couvrent la poitrine, le ventre, les côtés & le haut des jambes, ainſi que les couvertures du deſſous de la queue & celles du deſſus des aîles, ſont brunes. Les plumes de l'aîle ſont vertes, excepté leur extrémité, qui eſt brune. La queue eſt compoſée de douze plumes noires Sur la partie antérieure de l'aîle, ſçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, eſt une eſpece d'épron droit, très-pointu, jaune & d'une ſubſtance ſemblable à de la corne. Le bec eſt d'un jaune de ſafran. La partie des jambes

Magnitudine & craſſitie præcedentes æmulatur. Capitis pars anterior membranâ quâdam obducitur rufâ. Caput, guttur, collum, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares & ſuperiores caudæ tectrices nigri ſunt coloris. Pectus, ventrem, latera & crurum ſupremam partem veſtiunt pennæ fuſcæ. Quæ caudam ſubtus obtegunt, ſuperioreſque alarum tectrices concolores. Remiges ſunt virides, attamen in extremitate fuſcæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus nigris. In parte alarum anteriore, ſcilicet versùs articulum carpo humano reſpondentem, calcar extat rectum, acutiſſimum, flavum, ſubſtantiæ corneæ æmulum. Roſtrum croceo colore imbutum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque ci-

nerei. Habitat in paluſtribus *Braſiliæ* locis.

qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont cendrés. On le trouve au *Bréſil* dans les marais.

** 4. LE CHIRURGIEN BRUN.

Voyez Pl. XI. Fig. 1.

Jacana ſuperne caſtaneo-purpurea, infernè ex nigro ad violaceum inclinans; ſyncipite membranâ bipartitâ rubro-aurantiâ obducto; capite, gutture & collo ex nigro ad violaceum vergentibus; remigibus viridi-olivaceis, in extremitate fuſco marginatis; rectricibus binis intermediis fuſcis, caſtaneo-purpureo mixtis, lateralibus caſtaneo-purpureis, omnibus apice nigro-violaceis; alis armatis . . . . JACANA ARMATA FUSCA.

Jacanæ quarta ſpecies. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 191. *Jonſt. Avi. pag.* 131.
Gallinula Braſilienſis quarta Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 237. *Raj. Syn. Avi. pag.* 115. *N°.* 11.
Avis cornuta. *Euſ. Nieremb. pag.* 214.
Anſer Chilenſis, ſeu Caput nocturnum. *Charlet. Exer. pag.* 119. *N°. I. Charlet. Onomazt. pag.* 115. *N°. I.*
Yohualcuachili, ſeu Caput Chilli nocturnum. *Fern. Hiſt. Nov. Hiſp. pag.* 50. *Cap. CLXXXI.*
Yohualquachili ſeu Caput Chilli nocturnum. *Raj. Syn. Avi. pag.* 178. *N°.* 5.
Jochualcuachili, ſeu Caput nocturnum. *Jonſt. Avi. pag.* 126.
Les Anglois l'appellent SPUR-WING'D GOOSE OF AMERICA. *Charlet.*
Les Mexiquains, YOHUALCUACHILI. *Nieremb. Fern.*

Morinello paululùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues tredecim pollices & undecim lineas.

Il n'eſt pas tout-à-fait ſi gros que le *Guignard*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de neuf pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de treize pouces onze lignes. Son bec de-

puis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long ; sa queue un pouce dix lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce huit lignes ; son pied deux pouces deux lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces huit lignes, l'extérieur deux pouces six lignes, l'intérieur deux pouces cinq lignes & demie ; & celui de derriere deux pouces trois lignes ; car son ongle a jusqu'à seize lignes & demie de long, & est tout-à-fait droit. Il a seize pouces dix lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le synciput est couvert par une membrane d'un rouge-orangé, qui a cinq lignes de largeur & six lignes de hauteur, & est arrondie & divisée en deux lobes dans sa partie supérieure. De chaque côté de la tête est une autre petite membrane de la même couleur, arrondie, d'environ deux lignes de large, & qui pend à côté du coin de la bouche. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un noir tirant sur le violet. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les cou-

Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum est ; cauda unum pollicem & decem lineas ; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum octo lineis ; pes duos pollices & totidem lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & octo lineas, extimus duos pollices cum sex lineis, intimus duos pollices & quinque cum semi lineas ; posticus tandem duos pollices & tres lineas ; ungue enim armatur sexdecim cum semi lineas longo, & planè recto. Alis expansis, extremitates majorum remigum sexdecim pollicum & decem linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. Syncipue membranâ quâdam obducitur rubro-aurantiâ, quinque linearum latitudinem & sex linearum altitudinem obtinente, in parte suprema rotundatâ & bipartitâ. In utroque capitis latere altera extat membranula concolor, rotundata, binas circiter lineas lata, & prope oris angulum dependens. Caput, guttur, collum, pectus, venter, inferioresque caudæ

tectrices ex nigro ad violaceum inclinant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt eleganter castaneo-purpureæ. Latera & tectrices alarum inferiores minores idem tingit color, sed saturatior : tectrices alarum inferiores majores sunt fuscæ. Crurum pars suprema nigricat. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur : majores corpori finitimæ fuscæ ; à corpore remotiores nigræ. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, vestiunt plumulæ castaneo-purpureo & nigricante variæ. Viginti tribus remigibus ala conflatur : novemdecim primores sunt dilutè viridi-olivaceæ ; ex istis autem septem primores fusco terminatæ, & quartâ circiter longitudinis parte eodem colore in apice marginatæ ; quæ margo fusca per totam prioris remigis longitudinem in latere exteriore protenditur : duodecim quæ sequuntur, ab octava scilicet ad decimam nonam usque inclusivè, margine fuscâ in apice tantùm præditæ sunt : quatuor corpori

vertures du dessus de la queue sont d'un beau marron-pourpré. Les côtés & les petites couvertures du dessous des aîles sont de la même couleur, mais plus foncée : les grandes couvertures du dessous des aîles sont brunes. Le haut des jambes est noirâtre. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus proches du corps sont brunes ; & les plus éloignées du corps sont noires. Le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes variées de marron-pourpré & de noirâtre. L'aîle est composée de vingt-trois plumes : les dix-neuf premieres sont d'un verd-d'olive clair ; & de celles-là les sept premieres sont terminées & bordées de brun par le bout dans environ le quart de leur longueur ; cette bordure brune s'étend aussi dans toute la longueur du côté extérieur de la premiere plume : les douze suivantes, sçavoir depuis la huitiéme jusqu'à la dix-neuviéme inclusivement, sont seulement bordées de brun par le bout : les quatre plus proches du corps, sçavoir depuis la vingtiéme jusqu'à la vingt-troisiéme inclusivement, sont d'un

marron-pourpré; & la vingtiéme est variée sur son côté extérieur d'un peu de verd-d'olive. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un brun mêlé de marron-pourpré, & terminées de noir-violet : les latérales sont d'un marron-pourpré, & terminées pareillement de noir-violet. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Sur la partie antérieure de l'aîle, sçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, est une espece d'épron large à sa bâse de deux lignes & demie, long de quatre lignes & demie, & qui se termine en une pointe très-aiguë : il est jaune, un peu tourné en-dedans, & d'une substance pareille à de la corne. Le bec est d'un bel orangé. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un cendré-verdâtre. On le trouve au *Brésil*, au *Mexique*, & à *S. Do-*

viciniores, à vigesima scilicet ad vigesimam tertiam usque inclusivè, sunt castaneo-purpureæ; vigesima autem in latere exteriore pauco variegatur viridi-olivaceo. Quatuor novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ; & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ fuscæ, castaneo-purpureo mixtæ, apice nigro-violaceæ: laterales castaneo-purpureæ, similiter nigro-violaceo terminatæ. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem nonnihil excedunt; laterales autem omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. In parte alarum anteriore, scilicet versùs articulum carpo humano respondentem, calcar extat duas cum semi lineas in basi latum, quatuor cum semi lineas longum, in aciem acutissimum desinens, flavum, paululùm introrsum versum, substantiæ corneæ æmulum. Rostrum eleganter aurantium. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque cinereo-viridescentes. Habitat in *Brasilia*,

silia, *Mexico* & *Dominicensi Insula*, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Chervain*.

mingue, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

5. Le Chirurgien varié.

Jacana superne castaneo-purpurea, infernè alba; syncipite membranâ tripartitâ rubro-aurantiâ obducto; tæniâ supra oculos candidâ; fasciâ nigrâ à rostro per oculos & secundùm colli latera productâ; remigibus viridibus, in extremitate nigro marginatis; rectricibus castaneo purpureis; alis armatis . . . . Jacana armata varia.

Fulica fronte carunculata, corpore variegato, humeris spinosis, digitis simplicibus, ungue postico longissimo. Fulica spinosa. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 82. *sp.* 4.

Rallus digitis triuncialibus, calcaneo biunciali, aculeiformi, anomalo. *Klein. Avi. pag.* 104. *N°.* 7.

Poule-d'eau aux aîles épronnées. *Edwards. Tom. I. pag. XLVIII; avec une figure exacte Pl.* 48.

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem novem circiter pollices explet, & ad extremos ungues tredecim pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum est; cauda unum pollicem cum decem lineis; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices cum novem lineis, extimus duos pollices & quatuor lineas, intimus

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long; sa queue un pouce dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes, l'extérieur deux pouces quatre lignes, l'intérieur deux pouces trois lig-

nes; & celui de derriere un pouce onze lignes; car son ongle a jusqu'à quatorze lignes & demie de long, & est tout-à-fait droit. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le synciput est couvert par une membrane d'un rouge-orangé, qui a cinq lignes de largeur & six lignes de hauteur, & est arrondie & divisée en trois lobes dans sa partie supérieure. Le dessus de la tête est brun, & varié de quelques taches d'un brun plus obscur. La partie supérieure du col est d'un brun foncé. Le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un marron-pourpré. De chaque côté de la tête est une bande blanche, qui passe par-dessus les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. Au-dessous de celle-là en est une noire, qui part d'auprès de l'origine du bec, passe par les yeux, & descend ensuite, en se courbant, tout le long des côtés du col. Les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs: cette couleur est variée de quelques taches rougeâtres, placées sur les côtés du ventre & le haut des jambes. Les

duos pollices & tres lineas; posticus autem unum pollicem cum undecim lineis; ungue enim donatur quatuordecim cum semi lineas longo, & planè recto. Alæ complicatæ ad caudam extremam pertingunt. Synciput membranâ quâdam obducitur rubro-aurantiâ, quinque linearum latitudine & sex linearum altitudine pollente, in parte suprema rotundatâ & tripartitâ. Caput superius fuscum est, quibusdamque maculis fusco obscuriore imbutis variegatum. Pars colli superior saturatè fusca. Dorsum, uropygium & superiores caudæ tectrices sunt castaneo-purpureæ. In utroque capitis latere tænia extat candida, supra oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Infra tæniam istam altera adest fascia nigra, prope rostri exortum orta, per oculos ducta, & deinde reflexa deorsum descendit, & secundùm colli latera protenditur. Genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum pars suprema & pennæ caudam subtus cooperientes albicant. Albedinem autem variegant maculæ quædam rubescentes, ad ventris latera,

inque crurum parte suprema collocatæ. Pennæ alas infernè vestientes sunt fusco-rubescentes. Scapulares dilutè fuscæ. Tectrices alarum superiores minimæ castaneo-purpureæ : mediæ fuscæ : majores verò nigræ. Alarum remiges (quatuor corpori vicinioribus exceptis) eleganter virides, nigro in extremitate marginatæ; quæ margo nigra per totam primoris remigis longitudinem in latere exteriore protenditur : quatuor corpori finitimæ fuscæ. Quæ novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè attingunt. Duodecim rectricibus castaneo-purpureis cauda conflatur. In parte alarum anteriore, scilicet versùs articulum carpo humano respondentem, calcar quoddam extat crassiusculum, in aciem acutissimum desinens, flavum, paululùm introrsum versum, substantiæ corneæ æmulum. Rostrum flavo-aurantium. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque cinereo-cœrulescentes. Habitat circa *Carthagenam novam* in *America Meridionali.*

couvertures du dessous des aîles sont d'un brun-rougeâtre. Les plumes scapulaires sont d'un brun clair. Les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un marron-pourpré : les moyennes sont brunes : & les grandes sont noires. Les plumes de l'aîle (excepté les quatre plus proches du corps) sont d'un beau verd, & bordées de noir par le bout : cette bordure noire s'étend aussi dans toute la longueur du côté extérieur de la premiere plume : les quatre plus proches du corps sont brunes. Ces dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un marron-pourpré. Sur la partie antérieure de l'aîle, sçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, est une espece d'épron assez gros & qui se termine en une pointe très-aiguë : il est jaune, un peu tourné en-dedans, & d'une substance semblable à de la corne. Le bec est d'un jaune-orangé. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un cendré-bleuâtre. On le trouve aux environs de *Carthagene* dans l'*Amérique Méridionale.*

SECTION II.

Ceux qui ont le bec plutôt courbé en en-haut que droit, & un peu comprimé horizontalement.

CETTE section ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui du *Coulon-chaud.*

LXXII.

Le genre du Coulon-chaud.

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec plutôt courbé en en-haut que droit, & un peu comprimé horizontalement.

SECTIO II.

Eæ quæ rostrum habent subrectum, sursum modicè tendens, & horizontaliter paululùm compressum.

UNICO genere, *Arenariæ* scilicet, constituitur hæc sectio.

LXXII.

Genus Arenariæ.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Rostrum subrectum, sursum modicè tendens, horizontaliter paululùm compressum.

** I. LE COULON-CHAUD.

Arenaria superne nigro, fusco & ferrugineo varia, infernè alba ; genis & collo inferiore nigris ; collo superiore & uropygio candidis ; rectricibus binis intermediis in exortu albis, in reliqua longitudine fuscis, in apice albo marginatis, quatuor utrinque proximis primâ medietate candidis, alterâ fuscis, albo terminatis, utrinque extima candida, maculâ fuscâ interiùs notata .... ARENARIA.

Tringa nigro, albo, ferrugineoque variegata, pectore abdomineque albo. *Faun. Suec. Linn. N°.* 154.

Tringa pedibus rubris, corpore nigro albo ferrugineoque vario, pectore abdomineque albo. Interpres. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *sp.* 4.

Tringa maritima. *Linn. Systh. Nat. ed.* 6. *Gen.* 60. *sp.* 10.

Morinellus marinus D. Brown. *Willugh. Ornith. pag.* 231. *hujus icon minùs accurata Tab. LVIII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 112. *N°. A.* 5.

Cinclus. *Moehr. Avi. Gen.* 95.

Gavia, quæ Pluvialis Arenaria nostra, Raji. *Klein. Avi. pag.* 21. *N°.* 9.

Tourne Pierre de la Baye de Hudson. *Edwards. Tom. III. pag. CXLI*; *avec une figure assez exacte Pl.* 141.

Les Gothlandois l'appellent TOLCK. *Linn.*

Les Anglois, TURN-STONE ; SEA-DOTTEREL. *Raj.* SEA-DOTTREL ; SEA-DOTTRELL. *Willugh.* TURN-STONE FROM HUDSON'S-BAY. *Edwards.*

Crassitie *Merulam* circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim cum semi lineas longum est; cauda duos pollices & quatuor lineas; pars crurum plumis denudata quatuor lineas ; pes undecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim cum semi lineas, extimus decem lineas, intimus novem lineas; posticus autem quatuor lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum ala-

Il est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes & demie de long ; sa queue deux pouces quatre lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes quatre lignes; son pied onze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes & demie, l'extérieur dix lignes, l'intérieur neuf lignes; & celui de derriere quatre lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a quinze pouces six lignes de vol;

& ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Immédiatement au-dessus de l'origine du demi-bec supérieur est une petite bande noire, qui s'étend de chaque côté jusqu'aux yeux. Au-dessous de cette petite bande l'espace contenu entre la narine & l'œil est blanc. Le sommet de la tête est couvert de petites plumes noires, bordées de blanc. Le synciput, les côtés de la tête derriere les yeux, la gorge & le dessus du col sont blancs; cette couleur s'étend de chaque côté jusque vers l'origine de l'aîle. Les joues ou les côtés de la tête au-dessous des yeux, la partie inférieure & les côtés du col sont noirs. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont variées de noir, de brun & de ferrugineux. La partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessus de la queue sont noires; il faut cependant en excepter les plus longues, qui sont blanches. Les petites & les moyennes du dessus des aîles sont variées de gris-brun, de noirâtre & de ferrugineux

rum extensarum distantia est quindecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Immediatè supra mandibulæ superioris exortum exigua extat tænia nigra, utrinque ad oculos usque producta. Infra quam tæniam spatium narem inter & oculum contentum albicat. Summum caput obtegunt plumulæ nigræ, albo fimbriatæ. Synciput, caput ad latera, idque ponè oculos, guttur & collum superius sunt candida; qui candor utrinque versùs alarum exortum usque protenditur. Genæ sive capitis latera infra oculos, collum inferiùs & ad latera nigri sunt coloris. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ nigro, fusco & ferrugineo variegantur. Dorsum infimum, uropygium, pectus, ventrem, latera, crurumque partem supremam vestiunt pennæ albæ. Quæ caudam infernè cooperiunt, alarumque tectrices inferiores concolores. Superiores caudæ tectrices nigræ, exceptis tamen longioribus candidis. Tectrices alarum superiores minimæ & mediæ griseo-fusco, nigri-

tante & ferrugineo diluto variegantur : majores corpori finitimæ sunt in latere interiore & apice candidæ, in latere exteriore saturatè fuscæ, albo marginatæ : majores tandem à corpore remotiores saturatè fuscæ ; ex istis autem intimæ apicibus albis præditæ sunt. Alam componunt viginti quatuor remiges : decem primores subtus candicant, superne verò sunt fuscæ, attamen in latere interiore maximâ parte cinereo-albæ, & scapo albo præditæ ; ex istis quinque, à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè, albo sunt in apice fimbriatæ : quatuor proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè, in exortu candidæ, deinde fuscæ, albo in apice marginatæ ; quæ margo alba eò majorem obtinet latitudinem, quò remix fit corpori vicinior : sex quæ sequuntur, à decima quinta scilicet ad vigesimam usque inclusivè, candidæ, maculâ fuscâ, in latere interiore versùs ipsarum extremitatem positâ, notatæ ; quæ macula eò major est, quò remix fit à corpore remotior : quatuor tandem corpori finitimæ fuscæ. Quatuor istæ no-

clair : les grandes les plus proches du corps sont blanches du côté intérieur & à leur bout ; leur côté extérieur est d'un brun foncé, & bordé de blanc : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé ; & de celles-là les plus intérieures sont terminées de blanc. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes : les dix premieres sont blanchâtres en-dessous ; mais en-dessus elles sont brunes, & la plus grande partie de leur côté intérieur est d'un gris-blanc, & leur tige blanche ; cinq de celles-là, sçavoir depuis la sixiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont bordées de blanc par le bout : les quatre suivantes, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la quatorziéme inclusivement, sont blanches à leur origine, ensuite brunes, & bordées de blanc par le bout ; cette bordure blanche est d'autant plus large, que la plume est plus proche du corps : les six qui suivent, sçavoir depuis la quinziéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont blanches, & marquées d'une tache brune, placée sur leur côté extérieur vers leur extrémité ; cette tache est d'autant plus grande, que la plume est plus éloignée du corps : enfin les quatre plus

proches du corps sont brunes. Ces quatre dernieres sont longues, étroites & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont blanches à leur origine, ensuite d'un brun foncé dans le reste de leur longueur, & bordées de blanc par le bout : les quatre qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, l'autre moitié est d'un brun foncé, & terminée de blanc, le brun occupant d'autant moins d'espace, que la plume est plus extérieure : la plus extérieure de chaque côté est blanche, & marquée seulement d'une assez grande tache brune, placée sur son côté intérieur vers le bout. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont orangés ; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

vissimæ remiges longæ sunt; strictiores & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Cauda duodecim constat rectricibus, quarum binæ intermediæ sunt in exortu albæ, dein in reliqua longitudine saturatè fuscæ, albo in apice marginatæ : quatuor utrinque proximè sequentes ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque candidæ, alterâ medietate saturatè fuscæ, albo terminatæ ; fusco tamen colore eò minus spatium occupante, quò rectrix exterior fit : utrinque extima candida, majusculâ tantùm notata maculâ fuscâ, in latere interiore versùs ipsius apicem positâ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque aurantii ; ungues verò nigricantes. Juxta maris littora degit. *Ex museo Realmuriano.*

** 2. LE

** 2. LE COULON-CHAUD CENDRÉ.

Voyez Pl. XI. Fig. 2.

Arenaria ſuperne cinereo-fuſca, marginibus pennarum albidis, infernè alba; collo inferiore & pectore ſaturatè fuſcis; uropygio candido; rectricibus binis intermediis in exortu albis, in reliqua longitudine fuſcis, in apice albo marginatis, quatuor utrinque proximis primâ medietate candidis, alterâ fuſcis, albo terminatis, utrinque extima candida, maculâ fuſcâ interiùs notata.... ARENARIA CINEREA.

Allouette de mer. *Cateſb. Tom. I. pag.* 72; *avec une figure exacte Pl.* 72. *Les Anglois l'appellent*, TURN-STONE; SEA-DOTTREL. *Catesb.*

Præcedentem craſſitie nonnihil antecellit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem novem pollices & ſex lineas explet, & ad extremos ungues novem pollices & tres lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque undecim cum ſemi lineas longum eſt; cauda duos pollices cum quinque lineis; pars crurum plumis denudata tres lineas; pes undecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim cum ſemi lineas, extimus decem lineas, intimus octo cum ſemi lineas; poſticus autem tres tantùm cum ſemi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad

Il eſt un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de neuf pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de neuf pouces trois lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a onze lignes & demie de long; ſa queue deux pouces cinq lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, trois lignes; ſon pied onze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes & demie, l'extérieur dix lignes, l'intérieur huit lignes & demie; & celui de derriere trois lignes & demie ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend

jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied cinq pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête & le dessus du col sont d'un gris-brun. La partie supérieure du dos est couverte de plumes de la même couleur, & bordées de blanchâtre. Les scapulaires sont pareillement d'un gris-brun, & bordées de même de blanchâtre; cependant deux de celles-là, sçavoir les inférieures, sont tout-à-fait blanches. La gorge est de cette derniere couleur. La partie inférieure du col & la poitrine sont d'un brun foncé; & la poitrine est variée sur ses côtés d'un peu de blanchâtre. La partie inférieure du dos, le croupion, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus de la queue sont brunes : les grandes sont blanches. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur que les plumes du dos : les grandes les plus proches du corps sont d'un gris-brun, bordées & terminées de blanc : & les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé. L'aîle est com-

primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis quinque pollicum & trium linearum invallo distant; alæ verò complicatæ ad extremitatem caudæ pertingunt. Caput & collum superius sunt griseo-fusca. Dorsi supremam partem vestiunt pennæ eodem colore imbutæ, marginibus albidis præditæ. Scapulares sunt quoque griseo-fuscæ, albido similiter marginatæ; ex istis tamen binæ, inferiores scilicet, penitùs albent. Guttur quoque albicat. Collum inferius & pectus sunt saturatè fusca; pectus tamen ad latera pauco candicante varium. Dorsum infimum, uropygium, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albent. Tectrices caudæ superiores minores sunt fuscæ: majores candidæ. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ pennis dorsum vestientibus concolores : majores corpori finitimæ griseo-fuscæ, albo fimbriatæ & terminatæ : majores à corpore remotiores saturatè fuscæ. Viginti quatuor remigibus ala conflatur : decem pri-

mores subtus candicant, superne verò sunt fuscæ, attamen in latere interiore maximâ parte cinereo-albæ, & scapo albo præditæ; ex istis quinque, à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè, albo sunt in apice fimbriatæ: quatuor proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè, in exortu candidæ, dein fuscæ, albo in apice marginatæ; quæ margo alba eò majorem obtinet latitudinem, quò remix sit corpori vicinior: sex quæ sequuntur, à decima quinta scilicet ad vigesimam usque inclusivè, candidæ, maculâ fuscâ, in latere interiore versùs ipsarum extremitatem positâ, notatæ; quæ macula eò major est, quo remix fit à corporé remotior: quatuor tandem corpori finitimæ fuscæ. Quatuor istæ nuper descriptæ remiges longæ sunt, strictiores & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices: binæ intermediæ sunt in exortu albæ, dein in reliqua longitudine saturatè fuscæ, albo in apice marginatæ: quatuor utrinque proximæ ab ipsarum

posée de vingt-quatre plumes: les dix premieres sont blanchâtres en-dessous, mais en-dessus elles sont brunes, & la plus grande partie de leur côté intérieur est d'un gris-blanc, & leur tige blanche; cinq de celles-là, sçavoir depuis la sixiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont bordées de blanc par le bout: les quatre suivantes, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la quatorziéme inclusivement, sont blanches à leur origine, ensuite brunes, & bordées de blanc par le bout; cette bordure blanche est d'autant plus large, que la plume est plus proche du corps: les six qui suivent, sçavoir depuis la quinziéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont blanches, & marquées d'une tache brune, placée sur leur côté extérieur vers leur extrémité; cette tache est d'autant plus grande, que la plume est plus éloignée du corps: enfin les quatre plus proches du corps sont brunes. Ces quatre dernieres sont longues, étroites & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont blanches à leur origine, ensuite d'un

brun-foncé dans le reste de leur longueur, & bordées de blanc par le bout : les quatre qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, l'autre moitié est d'un brun foncé, & terminée de blanc, le brun occupant d'autant moins d'espace, que la plume est plus extérieure : la plus extérieure de chaque côté est blanche, & marquée seulement d'une assez grande tache brune, placée vers son bout sur son côté intérieur. Le bec est brun. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges ; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

exortu mediam versùs longitudinem usque candidæ, in altera medietate saturatè fuscæ, albo-terminatæ ; fusco tamen colore eò minus spatium occupante, quò rectrix exterior fit : utrinque extima candida, majusculâ tantùm notata maculâ fuscâ, in latere interiore versùs ipsius apicem positâ. Rostrum fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedesque rubri ; ungues verò nigricantes. Circa maris littora versatur. *Ex museo D. Aubry.*

SECTION III.

Ceux qui ont le bec convexe en-dessus & comprimé par les côtés vers le bout.

IL n'y a dans cette section qu'un seul genre, sçavoir celui de la *Perdrix-de-mer.*

SECTIO III.

Eæ quæ rostrum habent superne convexum & apice lateraliter compressum.

IN illa sectione unicum continetur genus, scilicet *Glareolæ.*



Dessiné et Gravé par Martinet

1. Chirurgien brun. 2. Coulon-chaud cendré.

LXXIII.

Genus Glareolæ.

Hujus character est

Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:

Crura in parte inferiore plumis denudata:

Rostrum superne convexum, apice lateraliter compressum.

LXXIII.

Le genre de la Perdrix-de-mer.

Son caractere est d'avoir

Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:

Le bec convexe en-dessus, & comprimé par les côtés vers le bout.

** 1. La Perdrix-de-mer.

Voyez Pl. XII. Fig. 1.

Glareola superne splendidè griseo-fusca, infernè ex albo nonnihil rufescens; gutture & collo inferiore albo-rufescentibus, lineâ nigrâ circumdatis; pectore griseo-rufescente; lateribus dilutè castaneis; rectricibus quatuor utrinque extimis in exortu albis, versùs apicem fusco-nigricantibus, tribus extimæ proximis exteriùs griseo-fusco marginatis .... Glareola.

Glareola secunda. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 281.
Erythropus minor. *Gesn. icon. Avi. pag.* 109, *in qua hujus icon pessima.*
Gallinulæ aquaticæ undecimum genus, quod Erythropodem minorem appello, vulgus Koppriegerle. *Gesn. Avi. pag.* 513, *in qua eadem icon.*
Gallinula Erythropos minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 454, *in qua hujus icon pessima.*
Gallinula Erythropus minor. *Jonst. Avi. pag.* 110.
Hirundo marina. *Jonst. Avi. pag.* 84.
Charlet. Exer. pag. 96. *N°.* 5.
Charlet. Onomazt. pag. 90. *N°.* 5.
Hirundo marina Avis. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag.* 696. *hujus icon non satis accurata pag.* 697.
Hirundo marina Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 156.

Raj. Syn. Avi. pag. 72.
Hirundinis ripariæ ſpecies. *Marſil. Danub. Tom. V. pag.* 96. *hujus icon non ſatis accurata Tab.* 46.
Pratincola. *Kramer. Elench. veget. & Anim. pag.* 381; *cum icone ſatis accurata.*
Les Allemands l'appellent KOBEL REGERLIN ; SAND-VOGEL. *Schwenck.*
Les Allemands aux environs de Straſbourg, KOPPRIEGERLE. *Geſn. Aldrov. Schwenck.*
Les Autrichiens, BRACH-VOGEL. *Kramer.*
Les Anglois, SEA-SWALLOW. *Charlet.*

Elle eſt à peu près de la groſſeur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de neuf pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de ſept pouces huit lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; ſa queue quatre pouces une ligne; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, trois lignes & demie; ſon pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes & demie, l'extérieur ſept lignes & demie, l'intérieur ſept lignes; & celui de derriere quatre lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Elle a un pied dix pouces trois lignes de vol; & ſes aîles lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à quatre lig-

Merulam craſſitie circiter æquat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues ſeptem pollices & octo lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque decem cum ſemi lineas longum eſt; cauda quatuor pollices cum linea unica; pars crurum plumis denudata tres cum ſemi lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim cum ſemi lineas, extimus ſeptem cum ſemi lineas, intimus ſeptem lineas; poſticus autem quatuor lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum unius pedis decem pollicum & trium linearum intervallo

distant; alæ verò complicatæ ad quatuor usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ splendidè griseo-fuscæ. Scapulares concolôres. Guttur & collum inferius albo-rufescente tinguntur colore; quem colorem circumdat linea nigra, ab oris angulo versùs pectus ducta, & sic ad alterum oris angulum protensa. Pectus ex griseo rufescit. Venter, crurum suprema pars, tectricesque caudæ superiores & inferiores ex albo nonnihil rufescunt; latus tamen crurum exterius pauco griseo variegatur. Latera sunt dilutè castanea. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori viciniores, eodem imbuuntur griseo-fusco ac dorsum ipsum tingitur: majores à corpore remotiores ex fusco nigricant. Inferiores alarum tectrices minores sunt splendidè fuscæ: majores corpori finitimæ dilutè castaneæ: majores à corpore remotiores fusco-nigricantes. Alam componunt viginti tres remiges: novem primores ex fusco nigricant; omnium tamen prior scapo

nes au-delà du bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un gris-brun assez brillant. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc-roussâtre; cette couleur est entourée d'une ligne noire, qui s'étend d'un coin de la bouche à l'autre, en passant vers la poitrine, qui est d'un gris-roussâtre. Le ventre, le haut des jambes, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un blanc mêlé d'une très-légere teinte de roussâtre; il y a cependant un peu de gris sur le côté extérieur des jambes. Les côtés sont d'un marron clair. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même gris-brun que celui du dos: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre. Les petites du dessous des aîles sont d'un brun brillant: les grandes les plus proches du corps sont d'un marron-clair: & les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre. L'aîle est composée de vingt-trois plumes: les neuf premieres sont d'un brun-noirâtre, la premiere de toutes ayant sa tige blanchâtre: les huit suivantes, sçavoir depuis la dixié-

me jusqu'à la dix-septiéme inclusivement, & la dix-neuviéme sont d'un gris-brun brillant du côté extérieur, d'un brun foncé du côté intérieur, & terminées obliquement de blanc; cette couleur ne s'étend que sur le côté intérieur des dixiéme, onziéme, douziéme & treiziéme plumes : la dix-huitiéme & les quatre plus proches du corps sont d'un gris-brun brillant comme celui du dos. Ces quatre dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un gris-brun brillant : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est blanche à son origine, ensuite d'un gris-brun brillant dans le reste de sa longueur du côte extérieur, & d'un brun-noirâtre terminé de blanc du côté intérieur : les quatre plus extérieures de chaque côté sont blanches à leur origine, & d'un brun-noirâtre vers le bout, le blanc occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus extérieure ; toutes ces plumes, excepté la plus extérieure de chaque côté, sont bordées extérieurement d'un gris-brun bril-

candicante donatur : octo proximè sequentes, à decima scilicet ad decimam septimam usque inclusivè, & insuper decima nona sunt in latere exteriore splendidè griseo-fuscæ, in interiore saturatè fuscæ, albo obliquè terminatæ ; albedo autem quatuor remigum, decimæ scilicet, undecimæ, duodecimæ & tredecimæ, latus tantùm interius occupat : decima octava & quatuor corpori viciniores sunt, dorsi instar, splendidè griseo-fuscæ. Quatuor istæ novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ splendidè griseo-fuscæ : utrinque proximè sequens in exortu candida, dein in reliqua longitudine exteriùs splendidè griseo-fusca, interiùs fusco-nigricans & albo terminata : quatuor utrinque extimæ in exortu albæ, versùs apicem fusco-nigricantes, albore eò majus spatium occupante, quò rectrix exterior sit ; omnes autem istæ rectrices, si utrinque extimam excipias, sunt exteriùs griseo-fusco splendido marginatæ;

marginatæ. Binæ rectrices intermediæ lateralibus longitudine cedunt; laterales autem gradatim longiores fiunt ad utrinque extimam usque binas intermedias unius pollicis & decem linearum longitudine excedentem; unde fit cauda maximè bifurca. Rostrum basi rubrum, in reliqua longitudine nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque saturatissimè sanguinei. Maris, fluviorum & stagnorum littora frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

lant. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus courtes que les latérales, qui vont toutes en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus longue que les deux du milieu d'un pouce dix lignes; ce qui rend la queue très-fourchue. Le bec est rouge à sa bâse, & noir dans le reste de sa longueur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un rouge de sang très-foncé. On la trouve sur les bords de la mer, des rivieres & des étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

2. LA PERDRIX-DE-MER A COLLIER.

Glareola superne griseo-fusca, infernè subalbida; maculâ in syncipite nigrâ; maculâ utrinque circa oculos, gutture & collo candidis; torque fusco; rectricibus griseo-fuscis.... GLAREOLA TORQUATA.

Glareola quinta. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 282.
Glareola quinta Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°. 6.*
Ochropus minor. *Gesn. icon. Avi. pag.* 109, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 461. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 464.
Gallinulæ aquaticæ duodecimum genus, quod Ochropodem minorem nomino, vulgus Riegerle. *Gesn. Avi. pag.* 514, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Gallinula Ochropus minor. *Jonst. Avi. pag.* 110.
Les Allemands aux environs de Strasbourg l'appellent RIEGERLE. *Gesn. Aldrov.* RIEGERLIN. *Schwenck.*
Les Siléfiens, SAND REGERLIN; TULLFISZ. *Schwenck.*

Præcedenti multùm crassitie cedit. Caput superius,

Elle est beaucoup plus petite que la précédente. Le dessus

de la tête, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un gris-brun. De chaque côté de la tête eſt une tache blanche, placée vers les yeux. L'eſpace contenu entre ces taches ou le ſynciput eſt noir. La gorge & le col ſont blancs; mais le bas du col eſt entouré d'une ligne brune, qui forme une eſpece de collier. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, & les côtés ſont blanchâtres. Les couvertures du deſſous de la queue ſont de la même couleur. Les petites du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont d'un gris-brun : les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle ſont de cette derniere couleur : les moyennes ſont de la même couleur que le dos. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un gris-brun. Le bec eſt noirâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont jaunâtres; & les ongles noirâtres. Elle fait ſon nid dans le ſable ſur le bord des rivieres, dont elle ne s'éloigne jamais. Elle pond ordinairement ſept œufs oblongs.

dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares & ſuperiores caudæ tectrices ſunt griſeo-fuſcæ. In utroque capitis latere macula extat candida, circa oculos poſita. Spatium autem maculas inter iſtas contentum, in ſyncipite ſcilicet, nigrum eſt. Guttur & collum albent; collum autem in parte infima lineâ cingitur fuſcâ, torquem efficiente. Pectus, ventrem, crurum partem ſupremam & latera veſtiunt pennæ ſubalbidæ. Quæ caudam ſubtus obtegunt, concolores. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, ſunt griſeo-fuſcæ : majores à corpore remotiores nigricantes. Remiges majores ſimiliter nigricant : minores eodem imbuuntur colore ac dorſum ipſum tingitur. Caudam componunt duodecim rectrices griſeo-fuſcæ. Roſtrum nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedeſque ſunt ſublutei; ungues verò nigricantes. In arenis ad littora fluviorum nidificat; quæ littora nunquam deſerit. Ova parit ut plurimùm ſeptem oblonga.

3. La Perdrix-de-mer tachetée.

Glareola ſuperne fuſca, maculis obſcurioribus varia, infernè rufa, maculis fuſcis & albicantibus variegata; capite & collo pectori concoloribus; imo ventre rufo-candicante, nigris maculis vario; rectricibus candicantibus, apice nigris . . . . Glareola nævia.

Melampus. *Geſn. icon. Avi. pag.* 107, *in qua hujus icon peſſima.*
Gallinulæ aquaticæ ſeptimum genus, quod Rot-Knillis vocitant, ego Melampodem cognomino. *Geſn. Avi. pag.* 510, *in qua eadem icon.*
Gallinula Melampos. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 464. *hujus icon à Geſnero mutuata pag.* 465.
Gallinula Melampus Geſnero, Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 109. *N°.* 9.
Gallinula Melampus Willughby. *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag.* 380.
Glareola, Gallinula Melampus Geſneri, Aldrovandi, Willughbeji. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 9.
Rot-Knuſſell Leonardi Baltneri; Gallinula Melampus Geſnero, Aldrovando. *Willugh. Ornith. pag.* 225. *hujus icon non ſatis accurata Tab. LVI.*
Les Boulonnois l'appellent Giarola. *Aldrov.*
Les Allemands, Rot-Knillis. *Geſn. Aldrov. Willugh.* Wasser-heunlein. *Rzac.*
Les Polonois, Kokosska. *Rzac.*

Magnitudine & craſſitie præcedentem antecellit. Caput, guttur, collum, pectus & venter ſupremus rufo tinguntur, maculiſque fuſcis & albicantibus variegantur. Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares & ſuperiores caudæ tectrices fuſcæ ſunt, maculis quibuſdam obſcurioribus diſtinctæ. Venter imus, latera, crurum pars ſuprema & pennæ caudam ſubtus cooperientes ex rufo candi-

Elle eſt plus grande & plus groſſe que la précédente. La tête, la gorge, le col, la poitrine & le haut du ventre ſont d'un roux varié de taches brunes & de taches blanches. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un brun varié de quelques taches plus obſcures. Le bas-ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un roux-blan-

châtre, joliment varié de taches noires. Les couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur que le dos, & variées de plus de taches blanches. Les grandes plumes de l'aîle sont noires : les moyennes sont variées de cendré & de noir. La queue est composée de douze plumes blanchâtres, terminées de noir. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve sur les bords de la mer & des rivieres.

cant, & nigris maculis eleganter variegantur. Superiores alarum tectrices dorso concolores, maculis insuper candidis variæ. Remiges majores nigræ : minores cinereo & nigro distinctæ. Caudam componunt duodecim rectrices candicantes, in extremitate nigræ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Circa maris & fluminum littora versatur.

** 4. La Perdrix-de-mer du Sénégal.

Glareola in toto corpore fusca ; rectricibus interiùs & subtus cinereo-fuscis . . . . Glareola Senegalensis.

Elle est à peu près de la grosseur de la *nôtre*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long ; sa queue quatre pouces trois lignes ; la partie de ses jambes qui est degarnie de plumes, quatre lignes ; son pied quatorze lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lig-

Glareolam nostratem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & sex lineas æquat ; & ad extremos ungues septem pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim lineas longum est ; cauda quatuor pollices cum tribus lineis ; pars crurum plumis denudata quatuor lineas ; pes quatuordecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim

lineas, extimus septem lineas, intimus sex cum semi lineas; posticus autem tres cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis undecim pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ ad novem usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. In universo corpore, capite scilicet, gutture, collo, dorso, uropygio, pectore, ventre, crurum parte supremâ & lateribus, pennis vestitur fuscis. Scapulares, quæ caudam superne & infernè obtegunt, & superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, concolores: majores à corpore remotiores fusco nonnihil dilutiore imbutæ. Tectrices alarum inferiores minores fuscæ: majores cinereo-fuscæ. Remiges majores sunt saturatè fuscæ, attamen in latere interiore maximâ parte cinereo-fuscæ: minores subtus ex cinereo quoque fuscescunt, superne verò eodem imbuuntur colore ac

nes, l'extérieur sept lignes, l'intérieur six lignes & demie; & celui de derriere trois lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a un pied onze pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à neuf lignes au-delà du bout de la queue. Tout son corps, sçavoir la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés, est couvert de plumes brunes. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les petites du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun un peu plus foncé. Les petites couvertures du dessous des aîles sont brunes: les grandes sont d'un cendré-brun. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un brun foncé; cependant la plus grande partie de leur côté intérieur est d'un cendré-brun: les moyennes sont en-dessous de cette derniere couleur, & en-dessus elles sont de la même couleur que le dos. De ces dernieres

les plus proches du corps font longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-brun en-dessous; mais en-dessus les deux du milieu sont brunes: toutes les latérales sont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & d'un cendré-brun du côté intérieur. Les deux du milieu sont beaucoup plus courtes que les latérales, qui vont toutes en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus longue que les deux du milieu de près de deux pouces; ce qui rend la queue très-fourchue. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On la trouve au *Sénégal*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Adanson.*

dorsum ipsum tingitur. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates fermè pertingunt. Cauda duodecim constat rectricibus subtus cinereo-fuscis; superne verò binæ intermediæ fuscæ sunt: laterales omnes in latere exteriore & apice concolores; in latere interiore cinereo-fuscæ. Binæ rectrices intermediæ lateralibus longitudine multò cedunt; laterales autem gradatim majori longitudine pollent ad utrinque extimam usque binas intermedias duorum ferè pollicum longitudine excedentem; unde fit cauda valdè bifurca. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusci. Habitat in *Senegalensi* regione, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Adanson.*

SECTION IV.

Ceux qui ont le bec droit & comprimé par les côtés.

CETTE section ne contiént qu'un seul genre, sçavoir celui du *Râle.*

SECTIO IV.

Eæ quæ rostrum habent rectum & lateraliter compressum.

UNICUM genus, *Ralli* scilicet, hanc sectionem constituit.

Omnes hujus sectionis Aves corpore donantur lateraliter compresso.

Tous les Oiseaux de cette section ont le corps applati par les côtés.

LXXIV.

Genus Ralli.

Le genre du Râle.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Rostrum rectum, lateraliter compressum :
Corpus lateraliter compressum.

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec droit & comprimé par les côtés :
Le corps applati par les côtés.

** 1. Le Rasle d'eau.

Voyez Pl. XII. Fig. 2.

Rallus pennis in medio nigricantibus, ad margines fusco-rufescente-olivaceis superne vestitus, infernè cinereus, pennis in imo ventre apice dilutè fulvo marginatis; lateribus nigricantibus, albo transversim striatis; rectricibus nigricantibus, utrinque fusco-rufescente-olivaceo fimbriatis ..... Rallus aquaticus.

Rallus alis griseis fusco-maculatis, hypochondriis albo-maculatis, rostro luteo. Rallus aquaticus. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 83. *sp.* 2.
Rallus aquaticus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 234. *hujus icon pessima Tab. LVIII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 113. *N°. A.* 2.
Raj. Syn. Avi. pag. 190. *N°.* 12.
Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 321. *N°. XVI.*
Klein. Avi. pag. 103. *N°.* 2.
Ralla Anglorum & Gallorum ex Gallinularum genere. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 455.
Ralla Anglorum aquatica. *Jonst. Avi. pag.* 110.
Ortygometra alis fuscis. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen.* 58. *sp.* 1.

Ortygometra ſubtus albeſcens, tergore fulvo, maculis caſtaneis. *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen. XXXV. ſp.* 2.
Ortygometra Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 455. *hujus icon à Bellonio mutuata pag.* 456.
Gallinula ſerica. *Geſn. icon. Avi. pag.* 101, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Jonſt. Avi. pag. 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31; *& inſuper altera icon à Geſnero mutuata Tab.* 53.
Charlet. Onomazt. pag. 107. *N°.* 4.
Gallinula ſerica Geſneri, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 235.
Raj. Syn. Avi. pag. 114. *N°.* 4.
Gallinula, ſeu Gallinago ſerica dicta. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 470, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Gallinaginis, vel Gallinulæ genus nomine ignoto, quod Samethounle nomino. *Geſn. Avi. pag.* 517, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Gallinula Holoſericea. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°.* 4.
Gallinula chloropus, rarior ſpecies. *Marſil. Danub. Tom. V. pag.* 68. *hujus icon minimè accurata Tab.* 32.
Gallinæ aquaticæ ſpecies prima de novo adjecta. *Geſn. Avi. pag.* 515, *in qua hujus icon ſatis accurata* (*excepto roſtro*).
Glareola ſexta. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 283.
Glareola ſeptima. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 283.
Glareola ſeptima Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 3.
Gallinago cinerea; Glareola ſeptima Schwenckfeldii. *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Vol. pag.* 381.
Râle d'eau. *Alb. Tom. I. pag.* 67; *avec une figure paſſable* (*excepté le bec*) *Pl.* 77.
Raſle noir. *Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag.* 212; *avec une figure peu exacte pag.* 213.
Raſle, Ralle, Roy & Mere des Cailles. *Bel. Portr. d'Oiſ. pag.* 49 *a, dans laquelle eſt la même figure.*
Les Catalans l'appellent, GALLA MAREZA. *Barr.*
Les Vénitiens, FORZANE *ou* PORZANA. *Willugh. Alb.*
Les Allemands, SAMETHOUNLE. *Geſn. Aldrov. Schwenck. Willugh.* AESCH-HEUNLEIN. *Rzac.* AESCH-HEUNLIN; MOTT-HEUNLIN; SCHWARTZ WASSER HEUNLE. *Schwenck.*
Les Anglois, WATER-RAIL. *Willugh. Raj. Sloane. Alb. & quelques-uns* BILCOCK *ou* BROOK-OUZELL. *Willugh. Raj.* VELVET KUNNER. *Charlet.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du *Râle de Genet* ou *Roi de Cailles*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui

Craſſitie *Rallum Geniſtarum* ſive *Ortygometram* circiter æquat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam

extremam novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues undecim pollices. Roftrum ab ipfius apice ad oris angulos ufque unum pollicem & quinque lineas longum eft; cauda unum pollicem cum octo lineis; pars crurum plumis denudata fex cum femi lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas, extimus unum pollicem cum quinque lineis, intimus fexdecim lineas; pofticus autem quinque cum femi lineas. Omnes digiti funt à fe invicem ad exortum ufque difcreti. Alis expanfis, extremitates majorum remigum duodecim pollicum & trium linearum intervallo diftant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Partes capitis & colli fuperiores, dorfum & uropygium veftiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines verò ex fufco-rufefcente nonnihil ad olivaceum vergentes. Scapulares, fuperiorefque caudæ tectrices eodem imbuuntur colore, iifdemque marginibus præditæ funt. Quæ margines in pennis dorfum veftientibus

de la queue eft de neuf pouces trois lignes, & jufqu'à celui des ongles d'onze pouces. Son bec depuis fon bout jufqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; fa queue un pouce huit lignes; la partie de fes jambes qui eft dégarnie de plumes, fix lignes & demie; fon pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes, l'intérieur feize lignes; & celui de derriere cinq lignes & demie. Tous fes doigts font féparés les uns des autres jufqu'à leur origine. Il a douze pouces trois lignes de vol; & fes aîles, lorfqu'elles font pliées, s'étendent jufqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties fupérieures de la tête & du col, le dos & le croupion font couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un brun-roux tirant un peu fur l'olivâtre fur leurs bords. Les plumes fcapulaires & les couvertures du deffus de la queue font de la même couleur & bordées de même. Cette bordure eft extrêmement large fur les plumes du dos & fur les fcapulaires. Les côtés de la tête au-deffous des yeux ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col,

la poitrine & le haut du ventre sont d'un joli cendré. (Dans quelques individus les plumes de la partie inférieure du col sont bordées de blanchâtre.) Les côtés sont couverts de plumes noirâtres, rayées transversalement de blanc. Celles qui couvrent le bas-ventre, & le haut des jambes sont cendrées & bordées par le bout de fauve clair. Les petites couvertures du dessous de la queue sont fauves : les grandes sont blanches, & seulement terminées de fauve. Les couvertures du dessous des aîles sont rayées transversalement de blanc & de cendré brun. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont noirâtres, & bordées d'un brun-roux tirant un peu sur l'olivâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur; les moyennes sont pareillement brunes, mais elles sont bordées extérieurement d'un brun-roux tirant sur l'olivâtre. La queue est composée de douze plumes d'un noirâtre brillant, & bordées des deux côtés d'un brun-roux tirant sur l'olivâtre. Le demi-bec supérieur est rougeâtre à son origine & noirâtre à son extrémité; l'inférieur est

& scapularibus sunt latissimæ. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genæ, guttur, collum inferius, pectus & venter supremus eleganti tinguntur cinereo. (In quibusdam individuis pennæ collum inferius obtegentes marginibus gaudent candicantibus). Latera cooperiunt pennæ nigricantes, albo transversim striatæ. Quæ imum ventrem & crurum partem supremam vestiunt, sunt cinereæ, fulvo diluto in apice fimbriatæ. Inferiores caudæ tectrices minores fulvæ : majores candidæ, fulvo solummodo terminatæ. Pennæ alas subtus obtegentes albo & cinereo-fusco transversim striatæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, nigricantes, fusco-rufescente paululùm ad olivaceum vergente marginatæ : majores à corpore remotiores fuscæ. Remiges majores sunt quoque fusco imbutæ : minores concolores, sed fusco-rufescente ad olivaceum inclinante exteriùs marginatæ. Caudam componunt duodecim rectrices splendidè nigricantes, in utroque latere fusco-rufescente-olivaceo fimbriatæ.

Mandibula superior in exortu rubescens, in extremitate nigricans; inferior verò per totam longitudinem nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusco-viridescentes. Juxta aquas degit. *Ex museo Realmuriano.*

rougeâtre dans toute sa longueur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un brun-verdâtre. On le trouve sur le bord des eaux. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. LE PETIT RASLE D'EAU OU LA MAROUETTE.

Voyez Pl. XIII. Fig. 1.

Rallus pennis in medio nigricantibus, ad margines fusco-olivaceis, maculis candidis variegatis, superne vestitus, infernè cinereus, albido varius; syncipite, gutture & collo inferiore cinereis; collo superiore saturatè cinereo, maculis albis vario; collo ad latera & pectore cinereo-olivaceis, maculis albis variegatis; lateribus cinereo-olivaceis, albo transversim striatis; rectricibus in medio nigricantibus, ad margines fusco-olivaceis, binis intermediis lineâ candidâ utrinque notatis .... RALLUS AQUATICUS MINOR SIVE MARUETTA.

Ochra. *Gesn. icon. Avi. pag.* 108, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Gallinulæ aquaticæ decimum genus, cui Ochræ nomen fecimus, vulgò Wynkernell appellant. *Gesn. Avi. pag.* 513, *in qua eadem icon.*
Gallinula Ochra. *Jonst. Avi. pag.* 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31.
Gallinula Ochra, quam Germani Wynkernnell appellant. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 468, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Gallinula Ochra Gesneri, quam Germani Wynkernnell appellant, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 236.
Raj. Syn. Avi. pag. 115. *N°.* 7.
Porzana minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 558, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Jonst. Avi. pag. 111.
Porzana Italorum. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°.* 5.
Charlet. Onomazt. pag. 108. *N°.* 5.
On l'appelle en quelques endroits de France COCOUAN.

Les Boulonnois l'appellent PORZANA. *Aldrov.*
Les Milanois, GIRARDINA. *Aldrov.*
Les Allemands aux environs de Strasbourg, WYNKERNNELL. *Gesn. Aldrov. Willugh. Raj.*
Les Anglois, GIRARDIN. *Charlet.*

Il est beaucoup plus petit que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces onze lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue un pouce neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre lignes & demie; son pied treize lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes, l'extérieur treize lignes, l'intérieur douze lignes & demie; & celui de derriere cinq lignes & demie. Il a douze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le synciput est cendré; cette couleur s'étend de chaque côté au-dessus des yeux. Le sommet de la tête est couvert de plumes noirâtres, bordées d'un brun tirant sur l'olive. La partie supérieure du col est d'un cendré foncé, varié de petites taches blanches. La partie supérieure

Præcedenti multùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & decem lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices & undecim lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem lineas longum est; cauda unum pollicem cum novem lineis; pars crurum plumis denudata quatuor cum semi lineas; pes tredecim cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim lineas, extimus tredecim lineas, intimus duodecim cum semi lineas; posticus autem quinque cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Syncipput cinereo imbuitur colore; qui color supra oculos utrinque protenditur. Summum caput vestiunt pennæ nigricantes, fusco ad olivaceum vergente

marginatæ. Pars colli superior saturatè cinerea, minutis maculis albis varia. Partem dorsi supremam obtegunt pennæ in medio nigricantes, ad margines fusco-olivaceæ, minutis variegatæ maculis candidis, in utroque cujuslibet pennæ latere protensis. Scapulares & superiores caudæ tectrices concolores. Dorsum infimum & uropygium cooperiunt pennæ nigricantes, fusco-olivaceo in apice tantùm fimbriatæ, minutisque maculis candidis ad latera variegatæ. Guttur tingit color cinereus, ad oculos usque utrinque productus, & supra collum inferius protensus. Collum ad latera, pectusque ex cinereo paululùm ad olivaceum vergunt, minutisque maculis albis variegantur. Latera cooperiunt pennæ similiter cinereo-olivaceæ, albo transversim striatæ. Quæ ventrem & crurum partem supremam obtegunt, sunt cinereæ, albido terminatæ; qui color albidus in imo ventre & crurum parte suprema paululùm ad fulvum dilutum vergit. Inferiores caudæ tectrices sunt dilutè fulvæ. Pennæ alas subtus obtegentes albæ, cinereo

du dos est couverte de plumes noirâtres dans leur milieu, d'un brun-olivâtre sur leurs bords, & variées de petites taches blanches, qui s'étendent sur chaque côté de chaque plume vers ses bords. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres, bordées par le bout seulement de brun-olivâtre, & variées sur leurs côtés de petites taches blanches. La gorge est cendrée; cette couleur s'étend de chaque côté jusqu'aux yeux, ainsi que sur la partie inférieure du col. Les côtés du col & la poitrine sont d'un cendré tirant un peu sur l'olivâtre, & varié de petites taches blanches. Les côtés sont couverts de plumes du même cendré, rayé transversalement de blanc. Celles qui couvrent le ventre & le haut des jambes sont cendrées, & terminées de blanchâtre; cette derniere couleur sur le bas-ventre & le haut des jambes tire un peu sur le fauve clair. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un fauve clair. Celles du dessous des aîles sont blanches, & variées de cendré. Le bord de l'aîle, au-dessus & au-dessous du pli qui répond

à celui du poignet, est blanc. Les plus petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont d'un brun-olivâtre, & variées de petites taches blanches, placées des deux côtés sur leurs bords : les grandes les plus proches du corps sont noirâtres dans leur milieu, d'un brun-olivâtre sur leurs bords, & variées de bandes blanches transversales & en zigzags : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-olivâtre du côté extérieur, & d'un cendré-brun du côté intérieur. La premiere des plumes de l'aîle est blanche du côté extérieur depuis son origine jusque vers son bout, qui est d'un brun-olivâtre; son côté intérieur est d'un cendré-brun : toutes les autres (excepté les cinq plus proches du corps) sont d'un brun-olivâtre du côté extérieur, & d'un cendré-brun du côté intérieur : enfin les cinq plus proches du corps sont noirâtres dans leur milieu, d'un brun-olivâtre sur leurs bords, & variées sur leur côté extérieur seulement de lignes blanches transversales & en zigzags. Ces cinq dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de

variæ. Alarum margines, supra & infra articulum carpo humano respondentem, candidæ. Superiores ipsarum tectrices minimæ & mediæ fusco olivaceæ, minutisque variegatæ maculis albis, in utroque latere supra margines positis : majores corpori viciniores in medio nigricantes, ad margines fusco-olivaceæ, & tæniis transversis undatisque candidis variæ : majores à corpore remotiores in latere exteriore fusco-olivaceæ, in interiore cinereo-fuscæ. Remix prima in latere exteriore ab ipsius exortu versùs apicem usque candida, ad apicem fusco-olivacea, in latere autem interiore cinereo-fusca : reliquæ omnes remiges (quinque tamen corpori vicinioribus exceptis) exteriùs fusco-olivaceæ, interiùs cinereo-fuscæ : quinque tandem corpori viciniores in medio nigricantes, ad margines fusco-olivaceæ, lineis transversis & undatis albis in latere tantùm exteriore variegatæ. Quæ quinque nuper descriptæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam com-

ponunt duodecim rectrices in medio nigricantes, ad margines fusco-olivaceæ: binæ intermediæ exiguâ insuper lineâ candidâ, ab ipsarum exortu versùs tres quartas longitudinis partes usque secundùm margines protensâ, in utroque latere notantur. Rostrum, unguesque flavo-olivacei. Pars crurum plumis denudata & pedes fusco-olivaceo imbuti. Juxta stagnorum & fluviorum ripas versatur. *Ex museo D. de Bandeville.*

douze plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un brun-olivâtre sur leurs bords: les deux du milieu sont de plus marquées sur chacun de leurs côtés d'une petite ligne blanche, qui s'étend tout le long de leurs bords depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur. Le bec & les ongles sont d'un jaune-olivâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un brun-olivâtre. On le trouve sur le bords des étangs & des rivieres. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

** 3. Le Rasle de Genet ou Roi de Cailles.

Voyez Pl. XIII. Fig. 2.

Rallus pennis in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus superne vestitus, infernè albo-rufescens; genis, collo inferiore & pectore dilutè cinereis; lateribus rufis, albo transversim striatis; rectricibus in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus . . . . Rallus Genistarum sive Ortygometra.

Rallus alis rufo-ferrugineis. Crex. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 83. *sp.* 1.
Rallus terrestris. *Klein. Avi. pag.* 102. *N°.* 1.
Crex. *Gesn. Avi. pag.* 362.
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 428.
Charlet. Exer. pag. 111. *N°. III.*
Charlet. Onomazt. pag. 106. *N°. III.*
Linn. Systh. Nat. ed. 6. *Gen.* 58. *sp.* 2.
Ortygometra alis rufo-ferrugineis. *Faun. Suec. Linn. N°.* 162.
Ortygometra tota rufa, plerumque in Genistis degens. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXV. sp.* 1.
Ortygometra. *Gesn. Avi. pag.* 360. *hujus icon minimè accurata pag.* 361.

Gesn. icon. Avi. pag. 71, *in qua eadem icon.*
Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 174. *hujus icon non satis accurata pag.* 176.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 313.
Bell. Obs. pag. 19.
Jonst. Avi. pag. 48. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXVIII: altera icon non satis accurata Tab. XXVII: & tertia icon à Gesnero mutuata eâdem Tab. sub titulo*, Coturnix.
Charlet. Exer. pag. 83. *N°. XIV.*
Charlet. Onomazt. pag. 75. *N°. XIV.*
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.
Moehr. Avi. Gen. 85.

Ortygometra Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 122. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXIX.*
Raj. Syn. Avi. pag. 58. *N°. A.* 8.

Ortygometra Aldrovandi, Gesneri; Cenchramus Plinii; Coturnix magna; Rex Coturnicum; Rallus terrestris. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 400.

Coturnico-mater Scaligero. *Charlet.*

Rasle rouge, ou de Genet. *Bel. Hist. nat. des Oys. pag.* 214, *dans laquelle il y a une figure peu exacte.*

Rasle rouge, ou Rasle de Genet. *Bel. Portr. d'Oys. pag.* 49 *b, dans laquelle est la même figure.*

Roy ou Mere des Cailles. *Alb. Tom. I. pag.* 27; *avec une figure mal coloriée Pl.* 32.

Les Grecs l'appellent Ορτυγομήτρα. *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck.* Κρέξ. *Aldrov.*

Les Italiens, RE DE QUAGLIE. *Bel. Gesn. Aldrov. Willugh.*

Les Allemands, SCHRYCK. *Willugh.* SCHRYK; WACHTELN KOENIG. *Gesn. Aldrov.* WACHTEL KOENIG. *Schwenck. Rzac.* ALTE KNECHTE. *Schwenck.*

Les Silésiens, SCHNERCKER. *Schwenck.*

Les Polonois, CHROSCIEL; DERKACZ; KASPER. *Rzac.*

Les Suédois, KORN KNARREN. *Linn.*

Les Uplandois, AENGSNAERPA. *Linn.*

Les Anglois, DAKER-HEN. *Gesn. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald.* RAIL. *Willugh. Raj.* LAND RAIL. *Alb.*

Les Ecossois, CORN-CREK. *Sibbald.*

Il est un peu plus gros & plus grand qu'une *Caille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces six lignes, & jus-

Magnitudine & crassitie *Coturnicem* paululùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & sex

sex lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes unum pollicem cum quinque lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem longitudine pollet, extimus quatuordecim lineas longus, intimus duodecim cum semi lineas; posticus autem solummodo quinque lineas. Antici digiti rudimento membranæ in exortu inter se connectuntur. Alis expansis, extremitates majorum remigum sexdecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudæ extremitatem attingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines griseo-rufescentes. Superiores caudæ tectrices & scapulares concolores; attamen ex scapularibus exteriores nullo modo nigricant, & ad rufum magìs inclinant. Guttur ex albo rufescit. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genæ, collum

qu'à celui des ongles de dix pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long; sa queue deux pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes; son pied un pouce cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a aussi un pouce cinq lignes de long, l'extérieur quatorze lignes, l'intérieur douze lignes & demie; & celui de derriere cinq lignes seulement. Les doigts antérieurs sont réunis à leur origine par un très-petit commencement de membrane. Il a seize pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-roussâtre sur leurs bords. Les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont de la même couleur; cependant les plus extérieures de ces dernieres n'ont rien de noirâtre, & tirent plus sur le roux. La gorge est d'un blanc-roussâtre. Les côtés de la tête au-dessous des yeux ou les joues, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un cendré clair, les bords des plu-

mes de la poitrine tirant un peu sur le roussâtre. Le ventre est d'un blanc mêlé d'une très-légere teinte de roussâtre. Les côtés sont roux & rayés transversalement de blanc. Le haut des jambes est roussâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont rousses dans leur milieu, & marquées d'une large bordure blanche. Celles du dessous des aîles sont entiérement rousses. Le bord de l'aîle est dans toute sa longueur d'un blanc mêlé d'une très-légere teinte de roussâtre. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps sont rousses : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un fauve clair du côté extérieur, & d'un gris-brun du côté intérieur. L'aîle est composée de vingt-trois plumes, qui sont d'un gris clair en-dessous ; mais en-dessus la premiere est d'un fauve très-clair du côté extérieur, & d'un gris-brun du côté intérieur : les cinq suivantes, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la sixiéme inclusivement, sont d'un gris-brun du côté intérieur & à leur bout, & fauves du côté extérieur : les treize qui suivent, sçavoir depuis la septiéme jusqu'à la dix-neuviéme inclusivement, sont entiérement fauves :

inferius & pectus diluto tinguntur cinereo, pennarum pectus cooperientium marginibus nonnihil ad rufescentem colorem inclinantibus. Venter albet cum lævissima rufescentis mixtura. Latera sunt rufa, albo transversim striata. Crurum pars suprema rufescit. Inferiores caudæ tectrices in medio rufæ, latâ margine albâ præditæ. Pennæ alas subtus obtegentes penitùs rufæ. Alarum margines per totam longitudinem albæ, lævissimâ rufescentis mixturâ adumbratæ. Superiores ipsarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, rufæ : majores à corpore remotiores in latere exteriore dilutè fulvæ, in interiore griseo-fuscæ. Alam componunt viginti tres remiges subtus dilutè griseæ ; superne verò prior est in latere exteriore dilutissimè fulva, in latere interiore griseo-fusca : quinque proximè sequentes, à secunda scilicet ad sextam usque inclusivè, in latere interiore & apice griseo-fuscæ, in latere exteriore fulvæ : tredecim quæ sequuntur, à septima scilicet ad decimam nonam usque inclusivè, penitus fulvæ : quatuor corporis

finitimæ pennis scapularibus concolores. Sex remiges corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus. Mandibula superior grisco-fusca, inferior grisea. Pars crurum plumis denudata, pedesque similiter grisei; ungues verò colore saturatiore imbuti sive griseo-fusci. Inter Ericas humi nidificat; & sexdecim aut octodecim ova ponit. Pullos recenter exclusos vestit penitùs nigra lanugo. *Ex museo Realmuriano.*

les quatre plus proches du corps sont de la même couleur que les plumes scapulaires. Les six plumes de l'aîle les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-roussâtre sur leurs bords. Le demi-bec supérieur est d'un gris-brun, l'inférieur est gris. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont de cette derniere couleur; & les ongles sont d'une couleur plus foncée, ou gris-bruns. Il fait son nid par terre dans les Bruyeres; & pond jusqu'à seize ou dix-huit œufs. Ses petits en naissant sont couverts d'un duvet entiérement noir. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 4. LE RASLE DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XIV. Fig. 1.

Rallus pennis in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus superne vestitus, infernè fusco & griseo transversim striatus; tæniâ supra oculos albidâ, per oculos castaneo-fuscâ; collo inferiore grisco-rufescente, griseo-fusco transversim striato; rectricibus in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus, lateralibus interiùs spadiceo maculatis . . . . . RALLUS PHILIPPENSIS.

On l'appelle aux Isles Philippines TIKLIN.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; sa queue deux pouces sept lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, neuf lignes; son pied dix-huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes, l'extérieur quinze lignes, l'intérieur quatorze lignes; & celui de derriere six lignes & demie. Tous ses doigts sont séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Il a quatorze pouces huit lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-roussâtre sur leurs bords. Les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont de la même couleur; cependant quelques-unes de ces dernieres sont marquées de quelques petites taches blanches, placées sur leurs bords. De cha-

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim cum semi lineas longum est; cauda duos pollices & septem lineas; pars crurum plumis denudata novem lineas; pes octodecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & septem lineas, extimus quindecim lineas, intimus quatuordecim lineas; posticus autem sex cum semi lineas. Omnes digiti sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum & octo linearum; alæ verò complicatæ ad duas tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines griseo-rufescentes. Tectrices caudæ superiores, scapularesque pennæ concolores; attamen ex scapularibus aliquot minutis quibus-

dam maculis candidis, ad ipsarum margines collocatis, sunt notatæ. In utroque capitis latere tænia extat albida, ab exortu rostri orta, supra oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Infra tæniam hanc altera adest tænia majorem latitudinem obtinens, castaneo-fusca, ab oris angulis orta, per oculos ducta, & pariter versùs occipitium usque protensa. Guttur sordidè albicat. Pars colli inferior est ex griseo rufescens, minutisque tæniis transversis griseo-fuscis, minimè conspicuis striata. Pectus, venter & latera fusco & griseo transversim quoque striantur; qui color griseus in ventre ferè candicat. Crurum suprema pars ex griseo-rufescit. Inferiores caudæ tectrices sunt fusco-nigricantes, albo-rufescente transversim striatæ. Pennæ alas subtus obtegentes cinereo-fuscæ, & quælibet tæniâ insignitur transversâ candicante, eodemque colore terminatur. Tectrices alarum superiores minimæ sunt griseo-rufescentes: mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, in exortu fuscæ, griseo-rufescente terminatæ, & per totam longitudinem maculis,

que côté de la tête est une bande blanchâtre, qui part de l'origine du bec, & s'étend jusque vers l'occiput, en passant par-dessus les yeux. Au-dessous de cette bande en est une plus large, d'un marron rembruni, qui part des coins de la bouche, passe par les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. La gorge est d'un blanc sale. La partie inférieure du col est d'un gris-roussâtre, rayé de petites bandes transversales d'un gris-brun, fort peu apparentes. La poitrine, le ventre & les côtés sont rayés transversalement de brun & de gris; cette derniere couleur est presque blanchâtre sur le ventre. Le haut des jambes est d'un gris-roussâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun-noirâtre, & rayées transversalement de blanc-roussâtre. Celles du dessous des aîles sont d'un cendré-brun, marquées chacune d'une bande transversale blanchâtre, & terminées de la même couleur. Les plus petites couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-roussâtre: les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes à leur origine, terminées de gris-roussâtre, & marquées dans toute leur longueur de taches, les unes de

rouge-bai & les autres blanches : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & rayées transversalement de rouge-bai. Les plumes de l'aile bâtarde sont brunes, marquées sur leur côté extérieur de taches roussâtres, sur leur côté intérieur de bandes transversales blanches, & terminées de gris-roussâtre. L'aile est composée de vingt-quatre plumes : les deux premieres sont brunes, & marquées des deux côtés de taches transversales qui sont d'un rouge-bai vers la tige de la plume & blanches en approchant vers ses bords : les seize suivantes, sçavoir depuis la troisiéme jusqu'à la dix-huitiéme inclusivement, sont brunes, & rayées de larges bandes transversales d'un rouge-bai; dans quelques-unes de ces plumes les bandes transversales blanchissent un peu en approchant vers le bord intérieur de la plume : les six plus proches du corps sont noirâtres dans leur milieu, d'un gris-roussâtre sur leurs bords, & marquées de taches à peu près rondes, dont celles qui sont placées vers l'origine de la plume, sont d'un rouge-bai, & celles qui sont placées vers son extrémité, sont blanches. Ces six plumes ont d'autant moins de ces taches,

aliis spadiceis, aliis candidis notatæ : majores à corpore remotiores fuscæ, spadiceo transversim striatæ. Ala notha pennis conflatur fuscis, maculis rufescentibus in latere extériore insignitis, in latere interiore tæniis transversis albis notatis, & griseo-rufescente terminatis. Alam componunt viginti quatuor remiges : binæ priores sunt fuscæ, in utroque latere maculis notatæ transversis versùs remigis scapum spadiceis, & versus margines procedendo candidis : sexdecim proximè sequentes, à tertia scilicet ad decimam octavam usque inclusivè, fuscæ, latis tæniis transversis spadiceis striatæ; in quibusdam ex istis remigibus tæniæ transversæ, versùs marginem remigis interiorem procedendo, paululùm canescunt : sex tandem corpori finitimæ in medio nigricantes, ad margines griseo-rufescentes, subrotundis insignitæ maculis, quarum quæ versus remigis exortum collocantur, sunt spadiceæ, quæ vero remigis extremitatem variegant, candidæ. Quæ sex remiges eò minori istarum macularum numero insigniuntur, quò sunt cor-

pori viciniores. Sex istæ nuper descriptæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates pertingunt. Remix prima secundæ octo linearum longitudine cedit; secunda verò reliquas omnes longitudine superat. Caudam componunt duodecim rectrices in medio nigricantes, ad margines griseo-rufescentes : lateralium insuper latus interius minutis quibusdam maculis spadiceis insignitur. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque grisei. Habitat in *Philippensibus Insulis*, unde in *museum D. Aubry* missus est.

qu'elles sont plus proches du corps. Ces six dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La premiere des plumes de l'aîle est plus courte de huit lignes que la seconde, qui est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-roussâtre sur leurs bords : le côté intérieur des latérales est de plus marqué de quelques petites taches de rouge-bai. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont gris. On le trouve aux *Isles Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son *cabinet*.

** 5. Le Rasle rayé des Philippines.

Voyez Pl. XIV. Fig. 2.

Rallus superne fusco-nigricans, pennis maculis transversis albidis utrinque notatis, infernè cinereo-olivaceus; colli superioris parte supremâ castaneâ; gutture albo-rufescente; imo ventre, lateribus & rectricibus fusco-nigricantibus, albido transversim striatis . . . . Rallus Philippensis striatus.

On l'appelle aux Isles Philippines Tiklin.

Præcedenti multùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab

Il est beaucoup moins gros que le précédent. Sa longueur

depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces dix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes & demie de long; sa queue un pouce six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes; son pied quatorze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes & demie, l'extérieur quatorze lignes & demie, l'intérieur treize lignes; & celui de derriere six lignes. Il a treize pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est variée de marron & de noirâtre. Le haut de la partie supérieure du col est d'un marron sans mêlange d'autre couleur. Le bas de la partie supérieure du col, le dos & les plumes scapulaires sont d'un brun-noirâtre, chaque plume étant marquée des deux côtés de taches transversales blanchâtres. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun plus clair, & chaque plume est marquée de même des deux côtés de taches transversales blanchâtres. La gorge est d'un blanc-roussâtre.

apice rostri ad caudam extremam octo pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues novem pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem cum sex lineis; pars crurum plumis denudata sex lineas; pes quatuordecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim cum semi lineas, extimus quatuordecim cum semi lineas, intimus tredecim lineas; & posticus sex lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est tredecim pollicum & quatuor linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput superius castaneo & nigricante variegatur. Colli superioris pars suprema castaneo imbuitur absque ulla alterius coloris mixtura. Colli superioris pars infima, dorsum & scapulares pennæ sunt fusco-nigricantes, unaquâque pennâ maculis transversis albidis utrinque notatâ. Uropygium & superiores caudæ tectrices tingit color dilutiùs fuscus, & quælibet penna similiter maculis transversis albidis

utrinque insignitur. Guttur ex albo rufescit. Caput ad latera, pars colli inferior, pectus & venter supremus ex cinereo ad olivaceum vergunt. Venter imus, latera, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes ex fusco nigricant, & albido transversim striantur. Crurum suprema pars grisea, tæniis transversis albidis pariter striata. Superiores alarum tectrices minores sunt fusco-fulvæ, tæniis transversis candicantibus utrinque notatæ: majores à corpore remotiores fusco-fulvæ quidem, sed tæniis destitutæ: majores corpori finitimæ fusco-nigricantes, albido transversim striatæ. Remiges alarum primores sunt quoque fusco-fulvæ: proximè sequentes, istæ scilicet quæ medium locum occupant, fusco imbutæ nonnihil saturatiore: corpori finitimæ fusco-nigricantes: omnes autem strictioribus insigniuntur tæniis transversis, in latere exteriore albo-rufescentibus, in interiore candidis. Ex remigibus corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè

Les côtés de la tête, la partie inférieure du col, la poitrine & le haut du ventre sont d'un cendré tirant sur l'olivâtre. Le bas-ventre, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont d'un brun-noirâtre, rayé transversalement de blanchâtre. Le haut des jambes est gris, & rayé pareillement de bandes transversales blanchâtres. Les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un brun-fauve, chacune étant marquée des deux côtés de bandes transversales blanchâtres: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-fauve & sans rayures; les grandes les plus proches du corps sont d'un brun-noirâtre, & rayées transversalement de blanchâtre. Les premieres plumes de l'aîle sont d'un brun-fauve: les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont d'un brun un peu plus foncé: & les plus proches du corps sont d'un brun-noirâtre: toutes sont marquées d'étroites bandes transversales, qui sont d'un blanc-roussâtre du côté extérieur, & blanches du côté intérieur. De ces plumes les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle.

Les troisiéme & quatriéme plumes de l'aîle sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes d'un brun-noirâtre, & rayées d'étroites bandes transversales blanchâtres. Le bec est de couleur de corne claire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un gris-brun; & les ongles gris. On le trouve aux *Isles Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. Turgot* qui le conserve dans son *cabinet*.

pertingunt. Ex remigibus tertia & quarta reliquarum omnium longitudinem antecellunt. Cauda duodecim constat rectricibus fusco-nigricantibus, strictis tæniis transversis albidis striatis. Rostrum dilutè corneo colore imbutum. Pars crurum plumis denudata, pedesque griseo-fusci; ungues verò grisei. Habitat in *Philippensibus Insulis*, unde in *museum D. Turgot* missus est.

** 6. Le Rasle a collier des Philippines.

Voyez Pl. XV. Fig. 1.

Rallus superne fuscus, ad olivaceum obscurum inclinans; infernè fuliginosus, albo transversim striatus; tæniâ infra oculos candidâ; fasciâ supra pectus transversâ castaneâ; rectricibus fuscis, oris exterioribus ad olivaceum obscurum vergentibus . . . . Rallus Philippensis torquatus.

On l'appelle aux Isles Philippines Tiklin.

Il est un peu plus gros que le *Râle de Genet*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces huit lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce huit lignes de long; sa queue un pouce neuf lignes; la partie de ses jambes qui est

Crassitie *Rallum Genistarum* paululùm excedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem explet, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem & octo lineas longum est; cauda unum pollicem & no-

vem lineas; pars crurum plumis denudata decem lineas; pes unum pollicem cum decem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas, extimus octodecim lineas, intimus unum pollicem & quinque lineas; & posticus octo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis novem pollicum & trium linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices ex fusco ad olivaceum obscurum paululùm inclinant. Caput ad latera sive genæ, gutturque fuliginoso imbuuntur colore. In utroque capitis latere tænia extat candida, ab oris angulis orta, infra oculos ducta, ad collum usque protensa. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes fuliginei sunt coloris, strictisque tæniis transversis albis striantur. Crurum pars suprema grisea, strictis tæniis transversis candicantibus pa-

dégarnie de plumes, dix lignes; son pied un pouce dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur un pouce six lignes, l'intérieur un pouce cinq lignes; & celui de derriere huit lignes. Il a un pied neuf pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun tirant un peu sur un olivâtre sombre. Les côtés de la tête ou les joues, & la gorge sont de couleur de suye. De chaque côté de la tête est une bande blanche, qui part des coins de la bouche, passe par-dessous les yeux, & s'étend jusqu'au col. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont de couleur de suye, & rayés d'étroites bandes transversales blanches. Le haut des jambes est gris, & rayé pareillement d'étroites bandes transversales blanchâtres. Au-dessus de la poitrine est une bande transversale d'un beau marron, large de huit ou neuf lignes,

qui forment une espece de collier. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont tout-à-fait brunes, mais bordées extérieurement d'une couleur un peu plus claire. L'aîle est composée de vingt-deux plumes brunes, & bordées extérieurement d'une couleur un peu plus claire : les trois premieres de ces plumes sont marquées sur leur côté intérieur de bandes transversales blanches : les six suivantes, sçavoir depuis la quatriéme jusqu'à la neuviéme inclusivement, sont de même marquées sur leur côté intérieur de bandes transversales d'un marron-roussâtre. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. Les troisiéme & quatriéme plumes de l'aîle sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes brunes, bordées extérieurement d'un brun tirant un peu sur un olivâtre sombre. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un gris-brun; & les ongles

riter striata. Supra pectus fascia extat transversa eleganter castanea, octo aut novem lineas lata, torquem quodammodo efficiens. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, dorso concolores : majores à corpore remotiores penitùs fuscæ, colore tamen nonnihil dilutiore exteriùs fimbriatæ. Alam componunt viginti duo remiges fuscæ, fusco paululùm dilutiore in latere exteriore marginatæ : ex istis remigibus tres primores tæniis transversis albis in latere interiore notantur : sex proximè sequentes, à quarta scilicet ad nonam usque inclusivè, tæniis transversis castaneo-rufescentibus interiùs similiter insigniuntur. Ex remigibus corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Ex remigibus tertia & quarta reliquarum omnium longitudinem superant. Caudam componunt duodecim rectrices fuscæ, oris exterioribus ex fusco ad olivaceum obscurum nonnihil vergentibus prædītæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedesque

sunt griseo-fusci; ungues verò grisei. Habitat in *Philippensibus Insulis*, unde in *museum D. Turgot* missus est.

gris. On le trouve aux *Isles Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. Turgot*, qui le conserve dans son *cabinet*.

** 7. Le Rasle brun des Philippines.

Voyez Pl. XV. Fig. 2.

Rallus superne fuscus, infernè fusco-vinaceus, gutture dilutiore; imo ventre griseo-fusco; tectricibus caudæ inferioribus nigris, albo transversim striatis; rectricibus fuscis... RALLUS PHILIPPENSIS FUSCUS.

On l'appelle aux Isles Philippines TIKLIN.

Rallo aquatico minori sive *Maruettæ* paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices æquat, & ad extremos ungues octo pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem lineas longum est; cauda unum pollicem cum novem lineis; pars crurum plumis denudata sex cum semi lineas; pes duodecim cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus undecim cum semi lineas, intimus undecim lineas; posticus autem solummodo quinque lineas. Omnes digiti sunt ad exortum

Il est un peu moins gros que le *petit Râle d'eau* ou *la Maroüette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue un pouce neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes & demie; son pied douze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur onze lignes & demie, l'intérieur onze lignes; & celui de derriere cinq lignes seulement. Tous ses doigts sont séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Il a dix pouces six lig-

nes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La partie postérieure de la tête, le dessus du col, le dos & le croupion sont bruns. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La partie antérieure de la tête, les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont d'un joli brun-vineux; cette couleur est beaucoup plus claire sous la gorge qu'ailleurs. Le bas-ventre & le haut des jambes sont d'un gris-brun. Les couvertures du dessous de la queue sont noires, & rayées transversalement de blanc. Celles du dessous des aîles sont pareillement noires, & marquées seulement de quelques petits points blancs. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un gris-brun du côté extérieur, & brunes du côté intérieur. Les grandes plumes de l'aîle sont de la même couleur que ces dernieres couvertures : les moyennes sont entiérement brunes. La queue est composée de douze plumes d'un fort beau

usque à se invicem discreti. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est decem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Capitis posterior pars, sicut & colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt fuscæ. Capitis partem anteriorem, genas, guttur, collum inferius, pectus, ventrem supremum & latera tingit color fusco-vinaceus elegans, sub gutture multò dilutior quàm in reliquis prædictis partibus. Ventrem infimum & crurum partem supremam vestiunt pennæ griseo-fuscæ. Inferiores caudæ tectrices sunt nigræ, albo transversim striatæ. Pennæ alas subtus obtegentes similiter nigræ, quibusdam tantùm punctulis candidis notatæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, fuscæ : majores à corpore remotiores in latere exteriore griseo-fuscæ, in interiore fuscæ. Remiges majores novissimè dictis tectricibus concolores : minores penitùs fuscæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus

elegantissimè fuscis. Rostrum quoque fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque flavi. Habitat in *Philippensibus Insulis*, unde in *museum D. Aubry* missus est.

brun. Le bec est de la même couleur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont jaunes. On le trouve aux *Isles Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son *cabinet*.

8. LE RASLE DE VIRGINIE.

Rallus superne fuscus, infernè fusco-rufescens; rectricibus fuscis . . . . RALLUS VIRGINIANUS.

Rallus terrestris Americanus. *Klein. Avi. pag.* 103. *N°.* 4.
Râle de l'Amérique. *Catesb. Tom. I. pag.* 70; *avec une figure exacte Pl.* 70.
Les Anglois l'appellent SOREE. *Catesb.*

Rallo aquatico nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues octo pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem longum est; cauda octodecim lineas; pars crurum plumis denudata tres lineas; pes sexdecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas; & posticus septem lineas. Alæ complicatæ caudam ferè extremam attin-

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Râle d'eau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue dix-huit lignes; la partie de ses jambes, qui est dégarnie de plumes, trois lignes; son pied seize lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur un pouce, l'intérieur onze lignes; & celui de derriere sept lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jus-

qu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, & le croupion sont bruns. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un brun-roussâtre. Les plumes de l'aîle sont tout-à-fait brunes. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. Il devient très-gras en Automne, & est alors très-bon à manger. On le trouve en *Virginie*.

gunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ fuscæ. Scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ tectrices concolores. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes ex fusco rufescunt. Alarum remiges sunt penitùs fuscæ. Duodecim rectricibus concoloribus cauda constat. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusci. Per Autumnum maximè pinguescit, & tunc in cibis delicatissimus. Habitat in *Virginia*.

SECTION V.

Ceux qui ont le bec menu.

CETTE Section contient trois genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la longueur du bec & par son extrémité ou lisse ou raboteuse. Les uns ont le bec de moyenne longueur, droit, & dont le bout est obtus &

SECTIO V.

Eæ quæ rostrum habent gracile.

IN illa sectione tria continentur Avium genera, longitudine rostri & ipsius apice sive levi sive rugoso à se invicem discrepantia. Aliæ enim rostro donantur mediæ longitudinis, recto; ipsius apice obtuso & levi, ut



Dessiné et Gravé par Martinet.

1 Perdrix-de-mer. 2. Râle d'eau.



1. Petit Râle d'eau ou Marouette.

2. Râle de Genet ou Roi de Cailles.



Dessinée et Gravée par Martinet.

1. Râle des Philippines. 2. Râle rayé des Philippines.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Râle à collier des Philippines. 2. Râle brun des Philippines.

ut *Tringa* : aliæ roſtro longiſſimo præditæ ſunt. Inter quas aliæ roſtrum habent ſubrectum, ſurſum modicè tendens; ipſius apice obtuſo & levi, ut *Limoſa*: aliæ roſtrum planè rectum; ipſius apice obtuſo & rugoſo, ut *Scolopax*.

liſſe, comme le *Beccaſſeau* : les autres ont le bec très-long. De ces derniers les uns ont le bec plutôt recourbé en en-haut que droit, & dont le bout eſt obtus & liſſe, comme la *Barge* : les autres ont le bec tout-à-fait droit, & dont le bout eſt obtus & raboteux, comme la *Beccaſſe*.

LXXV.

Genus Tringæ.

Hujus character eſt

Digiti quatuor, membranis deſtituti; tres ſcilicet antici, poſticus unus :

Crura in parte inferiore plumis denudata :

Roſtrum gracile, mediæ longitudinis, rectum; ipſius apice obtuſo & levi.

LXXV.

Le genre du Beccaſſeau.

Son caractere eſt d'avoir

Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere :

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :

Le bec menu, de moyenne longueur, droit, & dont le bout eſt obtus & liſſe.

** 1. Le Beccasseau, appellé vulgairement Cul-blanc.

Voyez Pl. XVI. Fig. 1.

Tringa ſuperne ſplendidè fuſca, maculis candicantibus varia, infernè alba; tæniâ ſupra oculos candidâ; collo inferiore cinereo-fuſco maculato; lateribus cinereo-fuſcis, albo tranſverſim ſtriatis; rectricibus binis intermediis in exortu albis, apice fuſco-nigricantibus, albo tranſverſim ſtriatis, lateralibus candidis, ad apicem fuſco-nigricante tranſverſim ſtriatis . . . . Tringa.

Tringa roſtri apice punctato ; pedibus livido-vireſcentibus, dorſo fuſco-viridi nitido. *Faun. Suec. Linn. N°.* 146.

Tringa roſtri apice punctato, pedibus vireſcentibus, dorſo fuſco-viridi nitido. Ochropus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *ſp.* 8.

Tringa nigra albo punctata, pectore maculato, abdomine ſubalbido, pedibus vireſcentibus. *Faun. Suec. Linn. N°.* 152.

Tringa roſtro lævi, pedibus vireſcentibus, corpore albo punctato, pectore ſubalbido. Glareola. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *ſp.* 11.

Tryngas. *Geſn. Avi. pag.* 501.

Trynga. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 480. *hujus icon minimè accurata pag.* 481.

Trynga alia, ſeu ſecunda. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 480. *hujus icon minimè accurata pag.* 482.

Tringa Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 222. *hujus icon minùs accurata Tab. LV; & inſuper altera icon minimè accurata Tab. LVI, ſub titulo,* Cinclus Bellonii.

Raj. Syn. Avi. pag. 108. *N°. A.* 7.

Tringa prima. *Jonſt. Avi. pag.* 111. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53, *ſub titulo*, Trynga.

Tringa tertia. *Jonſt. Avi. pag.* 112.

Tringa alia, ſeu tertia. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 480. *hujus icon minùs accurata pag.* 483.

Trynga altera. *Jonſt. Avi. pag.* 112. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53.

Tringa tertia Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 109. *N°.* 8.

Tringa tertia Aldrovandi, Giaroncello, & Pinirolo Italis dicta. *Willugh. Ornith. pag.* 223.

Gallinula pedibus viridibus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 6. *Gen.* 60. *ſp.* 8.

Cinclus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 6. *Gen.* 60. *ſp.* 2.

Cinclus Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 480.

Cinclus tertius. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 490. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 492.

Cinclus tertius Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 227.

Raj. Syn. Avi. pag. 110. *N°.* 14.

Cincli congener altera. *Jonſt. Avi. pag.* 112. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53, *ſub titulo*, Cinclus.

Rhodopus. *Geſn. icon. Avi. pag.* 106, *in qua hujus icon peſſima.*

Gallinulæ aquaticæ quintum genus, quod Rhodopodem appellamus; vulgus Germanicum Steingaellyl. *Geſn. Avi. pag.* 508, *in qua eadem icon.*

Gallinula Rhodopus. *Jonſt. Avi. pag.* 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31.

Gallinula Rhodopos, ſive phœnicopos. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 456. *hujus icon peſſima pag.* 457.

Gallinula Rhodopus, sive phœnicopus Gesneri. *Willugh. Ornith. pag* 223.

Gallinæ aquaticæ species secunda de novo adjecta. *Gesn. Avi. pag.* 516, *in qua hujus icon non satis accurata.*

Glareola octava. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 283.

Glareola octava Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 7.

Glareola quarta. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 282.

Glareola quarta Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 4.

Ochropus medius. *Gesn. icon. Avi. pag.* 107, *in qua hujus icon non satis accurata.*

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 461. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 463.

Gallinulæ aquaticæ octavum genus, vulgò dictum Mattknillis: nobis Ochropus medius. *Gesn. Avi. pag.* 511, *in qua hujus icon non satis accurata.*

Gallinula aquatica octava Gesneri: Ochropus medius ejusdem. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 380.

Gallinula Ochropus. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°.* 3.

Gallinula Ochropus medius. *Jonst. Avi. pag.* 110.

Gallinula Ochra. *Charlet. Onomazt. pag.* 107. *N°.* 3.

Porphyrio nigricans, pedibus & rostro roseis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXIV. sp.* 5.

Steingallell Leonardi Baltneri. *Willugh.*

Autre Beccassine. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag.* 216.

Les Grecs l'appellent Τρύγλας. *Gens.* Κιγκλος. *Bel.*

Les Boulonnois, GIAROLO. *Aldrov. Jonst.* GIARONCELLO; PINIROLO. *Aldrov. Jonst. Willugh. Raj.* SGAINOLO. *Aldrov.*

Les Allemands, STEINGAELLYL. *Gesn. Aldrov. Willugh.* BUNDT WASSER HEUNLIN; GESCHECKT MOTT HEUNLE. *Schwenck.* GREUN-FEUSSEL. *Schwenck. Rzac.*

Les Allemands aux environs de Strasbourg, MATTKNILLIS. *Gesn. Aldrov. Schwenck.*

Les Suédois, HORSGJOEK. *Linn.*

Pluviali aureæ paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum polli-

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Pluvier doré*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes

de long; sa queue deux pouces deux lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, huit lignes & demie; son pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur onze lignes & demie, l'intérieur dix lignes & demie; & celui de derriere quatre lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a quinze pouces neuf lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un cendré-brun. Les joues & la partie supérieure du col sont couvertes de plumes d'un cendré-brun dans leur milieu, & blanchâtres sur leurs bords. Celles qui couvrent le dos, ainsi que les scapulaires, sont d'un brun brillant, & variées sur chacun de leurs bords de petites taches blanchâtres. Le croupion est couvert de plumes brunes, variées de même sur chacun de leurs bords de très-petites taches blanchâtres, & de plus bordées de la

cem & quinque lineas longum est; cauda duos pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata octo cum semi lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus undecim cum semi lineas, intimus decem cum semi lineas; posticus autem quatuor solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensa, & digito intimo rudimento membranæ coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum quindecim pollicum & novem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput superius ex cinereo fuscescit. Genas & partem colli superiorem vestiunt pennæ in medio cinereo-fuscæ, ad margines candicantes. Quæ dorsum cooperiunt, sicut & scapulares, sunt splendidè fuscæ, in utraque margine minutis maculis candicantibus variæ. Uropygium pennis vestitur fuscis, in utraque pariter margine minutissimis maculis albidis variegatis,

eodemque colore insuper in apice fimbriatis. In utroque capitis latere latiuscula extat tænia candida, ab exortu mandibulæ superioris orta, & supra oculos protensa. Infra quam tæniam altera adest fascia cinereo - fusca, ab exortu quoque mandibulæ superioris orta, & ad oculum usque producta. Guttur albicat. Partem colli inferiorem obtegunt pennæ candidæ, maculis cinereo - fuscis in medio insignitæ. Pectus, venter & crurum suprema pars albent. Tectrices caudæ superiores & inferiores concolores. Pennæ alas subtus & latera cooperientes sunt cinereo-fuscæ, albo transversim striatæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, fusco imbutæ nonnihil quàm in dorso saturatiore, & in utraque margine minutis maculis candicantibus variegatæ : majores à corpore remotiores fusco - nigricantes & immaculatæ. Alam componunt viginti quatuor remiges, quarum novemdecim primores ex fusco nigricant; quinque corpori viciniores eodem imbuuntur fusco ac dorsum ipsum tingitur, & in exteriore margine maculis

même couleur par le bout. De chaque côté de la tête est une assez large bande blanche, qui part de l'origine du demi-bec supérieur, & s'étend jusqu'au-dessus des yeux. Au-dessous de cette bande en est une autre d'un cendré-brun, qui part de même de l'origine du demi-bec supérieur, & s'étend jusqu'à l'œil. La gorge est blanche. La partie inférieure du col est couverte de plumes blanches, marquées dans leur milieu de taches d'un cendré-brun. La poitrine, le ventre & le haut des jambes sont blancs. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Celles du dessous des aîles & les côtés sont d'un cendré-brun, rayé transversalement de blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un brun un peu plus foncé que celui du dos, & variées sur chacun de leurs bords de petites taches blanchâtres : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun - noirâtre & sans taches. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes : les dix-neuf premieres sont d'un brun-noirâtre : les cinq plus proches du corps sont du même brun que le dos, & variées sur

leur bord extérieur de taches blanchâtres. Ces dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle; dont la premiere est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont blanches à leur origine; le reste est d'un brun-noirâtre, & rayé des deux côtés de bandes transversales blanches : toutes les latérales sont blanches, & rayées vers leur extrémité seulement de larges bandes transversales d'un brun-noirâtre : ces plumes ont d'autant moins de ces bandes, qu'elles sont plus extérieures; de façon que la plus extérieure de chaque côté n'en a qu'une seule : celle qui la suit immédiatement en a deux du côté extérieur & une du côté intérieur : la troisiéme en a deux de chaque côté : la quatriéme en a trois du côté extérieur & deux du côté intérieur : la cinquiéme enfin en a quatre du côté extérieur & deux du côté intérieur. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est d'un verd obscur, excepté son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont de couleur de plomb verdâtre; &

candicantibus variegantur. Quæ novissimè dictæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt; remix autem prior omnium longissima. Caudam componunt duodecim rectrices : binæ intermediæ in exortu albæ, in reliqua longitudine fusco-nigricantes, in utroque latere albo transversim striatæ : laterales omnes candidæ, latis quoque tæniis transversis fusco-nigricantibus versùs ipsarum apicem tantùm striatæ : quæ rectrices eò minori insigniuntur tæniarum numero, quò exteriores fiunt; ita ut utrinque extima unicâ tantùm sit notata tæniâ : proximè sequens binis in latere exteriore, unicâ in latere interiore : tertia in utroque latere duabus : quarta exteriùs tribus, binis interiùs : quinta tandem in latere exteriore quatuor, in interiore binis tæniis sit insignita. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum obscurè viride, attamen apice nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque plumbeo virescentes; ungues vero nigri. Solitaria est; attamen pariendi tempore binæ volant, mas & fœmina. Pisci-

narum, lacuum, fluviorumque ripas frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

Exquisito sapore gaudet hæc Avis; ideoque illam venantur aucupes: quam ob causam ad ripas aquarum, quas frequentat, virgulas apponunt glutine imbutas, quibus ope capitur.

les ongles noirs. Il est solitaire, excepté dans le temps de l'amour, où il s'associe avec sa femelle. On le trouve sur les bords des étangs, des lacs & des rivieres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Cet Oiseau est très-bon à manger; c'est pourquoi on en fait la chasse : elle consiste à tendre aux bords des eaux, qu'il fréquente, des gluaux dans lesquels il vient se prendre.

** 2. La Guignette.

Voyez Pl. XVI. Fig. 2.

Tringa superne splendidè griseo-fusca, lineis longitudinalibus & transversis undatisque fusco-nigricantibus varia, infernè albâ; gutture, collo inferiore & pectore supremo cinereo-albis, pennis lineâ longitudinali fuscâ in medio notatis; rectricibus decem intermediis griseo-fuscis, viridescente adumbratis, fusco-nigricante transversim & undatim striatis, utrinque extimâ candidâ, interiùs griseo-fusco transversim striatâ, binis extimæ proximis apice albis . . . . Guinetta.

Tringa rostro lævi, corpore cinereo lituris nigris, subtus albo. *Faun. Suec. Linn. N°.* 147.
Tringa rostro lævi, pedibus lividis, corpore cinereo lituris nigris, subtus albo. Hypoleucos. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *sp.* 9.
Tringa minor. *Willugh. Ornith. pag.* 223. *hujus icon non satis accurata Tab. LV.*
Raj. Syn. Avi. pag. 108. *N°. A.* 6.
Charlet. Exer. pag. 112. *N°. IX.*
Tringa quinta. *Jonst. Avi. pag.* 112.
Motacillæ genus. *Gesn. Avi. pag.* 119, *in qua hujus icon pessima.*
Gesn. icon. Avi. pag. 123, *in qua eadem icon.*

Motacillæ, seu Cincli genus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 485. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 486.

Hypoleucos. *Gesn. icon. Avi. pag.* 106, *in qua hujus icon pessima. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen.* 60. *sp.* 3.

Gallinulæ aquaticæ sextum genus, quod Hypoleucon cognomino; vulgus Germanicum appellat Fysterlin. *Gesn. Avi. pag.* 509, *in qua hujus icon pessima.*

Gallinula Hypoleucos. *Jonst. Avi. pag.* 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31.

Gallinula Hypoleucos, quam vulgus Germanicum Fysterlin appellat. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 469, *in qua hujus icon minùs accurata.*

An Pluvialis fusco-cinerea, rarior species? *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 62. *hujus icon minùs accurata Tab.* 29.

Pfisterlein Leonardi Baltneri. *Willugh.*

Les Génevois l'appellent BECCASSINE. *Willugh.*

Les Allemands, FYSTERLIN. *Gesn. Aldrov. Jonst.*

Les Misniens, PILWENCKGEN; PILWEGICHEN. *Gesn. Aldrov. Jonst.* PILENTE. *Gesn. Aldrov.*

Les Suédois, SNAEPPA. *Linn.*

Les Habitans de la Province d'Yorck, SAND-PIPER. *Raj. Charlet.*

Elle est un peu plus grosse que l'*Alouette-de-mer*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces sept lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue deux pouces deux lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre lignes & demie; son pied dix lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur neuf lignes, l'intérieur huit lignes; & celui de derriere trois lignes seulement. Celui du

Crassitie *Cinclum* nonnihil superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda duos pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata quatuor cum semi lineas; pes decem cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas; posticus autem tres

solummodo

solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum duodecim pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput & partem colli superiorem vestiunt pennæ griseo-fuscæ, lineâ fusco saturatiore imbutâ, secundùm scapi longitudinem ductâ, notatæ. Quæ dorsum & uropygium obtegunt, sicut & scapulares, superioresque caudæ tectrices, sunt splendidè griseo-fuscæ, lineâ fusco-nigricante, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, pluribusque aliis lineis transversis & undatis concoloribus insignitæ. Guttur, partem colli inferiorem, supremumque pectus cooperiunt pennæ cinereo-albæ, lineâ fuscâ, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, & versùs ipsarum extremitatem paululùm ampliatâ, notatæ. Pectus infimum, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices albicant.

milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a douze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont couvertes de plumes d'un gris-brun, marquées chacune d'une ligne d'un brun plus foncé, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Celles qui couvrent le dos & le croupion, ainsi que les scapulaires & les couvertures du dessus de la queue, sont d'un gris-brun fort brillant, marquées chacune d'une ligne d'un brun-noirâtre, qui s'étend selon la longueur de leur tige, & de plusieurs autres lignes transversales & en zigzags de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col & le haut de la poitrine sont couverts de plumes d'un gris-blanc, marquées chacune d'une ligne brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige, & qui s'élargit un peu vers le bout de la plume. Le bas de la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue, le haut des jambes & les côtés sont blancs. Les couvertures

du dessous des aîles les plus proches du corps sont de la même couleur : les plus éloignées du corps sont d'un cendré-brun & terminées de blanc. Les petites & les grandes couvertures du dessus des aîles les plus proches du corps sont de la même couleur que les plumes du dos; cependant quelques-unes des grandes sont terminées de blanc : les petites les plus éloignées du corps, sçavoir celles qui couvrent le pli de l'aîle qui répond à celui du poignet, sont d'un gris-brun, & bordées de blanchâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & bordées obliquement de blanc par le bout. Les grandes plumes de l'aîle sont brunes, excepté une partie de leur côté intérieur, qui est blanche, & cela depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur, le blanc occupant d'autant plus de largeur, que la plume est plus proche du corps : les moyennes (excepté les quatre plus proches du corps) sont blanches, & marquées vers leur extrémité d'une tache brune, qui est d'autant plus grande que la plume est plus éloignée du corps; elles ont aussi leur côté extérieur brun, mais à leur origine seulement : les qua-

Tectrices alarum inferiores corpori viciniores concolores : à corpore remotiores sunt cinereo-fuscæ, apicibus albis præditæ. Superiores alarum tectrices, minores scilicet & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur colore ac pennæ dorsum vestientes; ex majoribus tamen quædam albo terminantur : minores à corpore remotiores, istæ scilicet quæ alæ articulum carpo humano respondentem obtegunt, griseo-fuscæ, candicante fimbriatæ : majores à corpore remotiores fuscæ, albo in apice obliquè marginatæ. Remiges alarum majores sunt quoque fuscæ, attamen in latere interiore partim candidæ, ab ipsarum exortu scilicet ad duas circiter tertias longitudinis partes usque, albedine eò majorem latitudinem obtinente, quò remix fit corpori vicinior : minores (exceptis tamen quatuor corpori finitimis) candidæ, versùs ipsarum extremitatem fuscâ insignitæ maculâ, eò majus spatium occupante, quò remix fit à corpore remotior; sunt quoque in latere exteriore fuscæ, sed in ipsarum exortu tantùm : quatuor cor-

pori viciniores eodem imbuuntur griseo-fusco ac dorsum ipsum tingitur, tæniisque transversis & undatis fusco-nigricantibus striantur. Quæ quatuor nuper descriptæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur : quatuor intermediæ sunt splendidè griseo-fuscæ, paululùm viridescente adumbratæ, fusco-nigricante transversim & undatim striatæ : binæ utrinque proximè sequentes eodem imbutæ colore, sed apice albæ : quinta novissimis istis concolor, maculis insuper candidis, ad ipsius margines positis, insignita : utrinque tandem extima candida, in latere interiore latiusculis tæniis transversis splendidè griseo-fuscis notata ; quædam autem tæniæ griseo-fuscæ supra latus exterius nonnihil protenduntur. Rectrices quatuor intermediæ lateralium longitudinem excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum fuscum. Pars crurum

tre plus proches du corps sont du même gris-brun que celui du dos, & rayées de bandes transversales & en zigzags d'un brun-noirâtre. Ces quatre dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les quatre du milieu sont d'un gris-brun brillant, un peu ombré de verdâtre, & rayé transversalement & en zigzags de brun-noirâtre : les deux qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont de la même couleur, mais terminées de blanc : la cinquiéme est colorée comme ces dernieres, & est de plus marquée de taches blanches, placées sur chacun de ses bords : enfin la plus extérieure de chaque côté est blanche, & marquée sur son côté intérieur de larges bandes transversales d'un gris-brun brillant, dont quelques-unes s'étendent un peu sur le côté extérieur. Les quatre plumes du milieu de la queue sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est brun. La partie des

jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un brun-verdâtre. On la trouve sur les bords des étangs, des lacs & des rivieres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

plumis denudata, pedes unguesque fusco-viridescentes. Juxta stagnorum, lacuum & fluviorum ripas versatur. *Ex museo Realmuriano.*

** 3. LE CHEVALIER.

Voyez Pl. XVII. Fig. 1.

Tringa pennis in medio fuscis, ad margines griseis superne vestita, infernè alba; collo inferiore griseo, marginibus pennarum albidis; rectricibus griseo-fuscis, albido in apice marginatis, quatuor intermediis & binis utrinque extimis nigricante transversim striatis; pedibus dilutè rubris .... TOTANUS.

Tringa rostro nigro, basi rubrâ: pedibus coccineis. *Faun. Suec. Linn.* *N°.* 149.
Erythropus major. *Gesn. icon. Avi. pag.* 101, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Gallinulæ aquaticæ primum genus, quod vulgò germanicè vocant Rotbein, id est, Erythropodem. *Gesn. Avi. pag.* 504, *in qua eadem icon.*
Gallinula Erythropos major Ornithologi. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 453, *in qua hujus icon pessima.*
Gallinula Erythropus. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°.* 2.
Charlet. Onomazt. pag. 107. *N°.* 2.
Gallinula Erythropus major. *Jonst. Avi. pag.* 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31, *sub titulo*, Erythropus.
Gallinula Erythropus major Gesneri. *Raj. Syn. Avi. pag.* 107. *N°. A.* 1.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.
Marsil. Danub. Tom. V. pag. 50. *hujus icon pessima Tab.* 23.
Gallinula Erythropus major Gesneri Aldrovando. *Willugh. Ornith. pag.* 221.
Scolopax rostro recto basi rubro, pedibus coccineis, remigibus secundariis albis. Totanus. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 4.
Calidris Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 431. *hujus icon minimè accurata pag.* 433.
Jonst. Avi. pag. 108.
Chalidris Bellonii, Fedoa. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°. V.*
Charlet. Onomazt. pag. 106. *N°. V.*

Totanus. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°. IV.*
Charlet. Onomazt. pag. 106. *N°. IV.*
Linn. Syst. Nat. ed. 6. Gen. 60. *sp.* 5.
Totanus Gesneri. *Raj. Syn. Avi. pag.* 107. *N°. A.* 1.
Glareola prima. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 281.
Glareola prima Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 1.
Glareola prima Schwenckfeldii ; Erythropus primus Gesneri ; Redshanca Turneri. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 383.
Chevalier rouge. *Bel. Hist. nat. des Oif. pag.* 207 ; *avec une figure passable pag.* 208.
Bel. Portr. d'Oif. pag. 46 *b*, *dans laquelle est la même figure.*
Becassine d'étang. *Alb. Tom. III. pag.* 37 ; *avec une figure mal coloriée Pl.* 87.
Les Grecs l'appellent Καλίδρις. *Bel.*
Les Allemands, ROT-BEIN. *Gesn. Aldrov. Rzac.* ROTT-BEIN ; WASSER-HEUNLIN MIT ROTEN BEINEN. *Schwenck.* ROT-FEUSSEL. *Schwenck. Rzac.*
Les Anglois, RED-SHANK. *Aldrov. Willugh. Raj. Sibbald.* POOL-SNIPE. *Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb.*

Cum *Pluviali aurea* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices & undecim lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & quinque lineas longum est ; cauda duos pollices cum novem lineis ; pars crurum plumis denudata quatuordecim lineas ; pes unum pollicem & novem lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quinque cum semi lineas, extimus quatuordecim cum semi lineas, intimus trede-

Il est à peu près de la grosseur du *Pluvier doré.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces onze lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long ; sa queue deux pouces neuf lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatorze lignes ; son pied un pouce neuf lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes & demie, l'extérieur quatorze lignes & demie, l'intérieur treize lignes ; & celui de derriere quatre lignes & de-

mie ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a un pied ſept pouces trois lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La tête, la partie ſupérieure du col, le dos & le croupion ſont couverts de plumes brunes dans leur milieu, & griſes ſur leurs bords. Les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur; cependant quelques-unes des plus grandes de ces dernieres ſont blanches, & s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue; & les bords de quelques-unes des plumes du dos tirent un peu ſur le fauve. La gorge eſt blanche. La partie inférieure du col eſt couverte de plumes griſes, & bordées de blanchâtre : celles qui ſont les plus proches de la gorge, ſont de plus marquées dans leur milieu d'une petite tache brune. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & celles du deſſous des aîles ſont d'un beau blanc. Les cô-

cim lineas; poſticus autem quatuor tantùm cum ſemi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ, & ad digitum intimum rudimento membranæ adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt unius pedis ſeptem pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, pars colli ſuperior, dorſum & uropygium pennis veſtiuntur in medio fuſcis, ad margines griſeis. Scapulares & ſuperiores caudæ tectrices concolores; attamen ex tectricibus caudæ ſuperioribus majores quædam candidæ, & caudæ extremitatem ferè pertingentes; & ex pennis dorſum veſtientibus quædam quoque ad margines nonnihil ad fulvum inclinant. Guttur albicat. Partem colli inferiorem veſtiunt pennæ griſeæ, marginibus albidis præditæ; quæ gutturi magìs appropinquant, minutâ maculâ fuſcâ inſuper in medio notatæ. Pectus, venter, crurum ſuprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas ſubtus obtegentes ele-

ganter albent. Laterà cooperiunt pennæ dilutè griseæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minores sunt griseo-fuscæ, colore dilutiore marginatæ : majores corpori viciniores concolores, sed candicante in apice fimbriatæ; ex istis quædam insuper maculis quibusdam nigricantibus variegantur : majores à corpore remotiores nigricantes, albo in apice marginatæ. Remiges majores subtus cinereæ, superne nigricantes, pauco candicante in extremitate fimbriatæ, & scapo albido præditæ : minores in latere exteriore fusco-nigricantes, in latere interiore versùs ipsarum exortum candidæ, versùs extremitatem griseæ, in tota circumferentia albo marginatæ : ex istis tamen excipiendæ sunt quinque corpori finitimæ griseo-fuscæ, maculis quibusdam nigricantibus variæ, & versùs apicem albido fimbriatæ. Quæ novissimè dictæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices griseo-fuscæ, albido in apice marginatæ : quatuor intermediæ & binæ

tés sont couverts de plumes d'un gris clair, bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun, & bordées d'une couleur plus claire : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur, & bordées de blanchâtre par le bout, quelques-unes sont de plus variées de quelques taches noirâtres : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées de blanc par le bout. Les grandes plumes de l'aîle sont cendrées en-dessous, noirâtres en-dessus, bordées à leur extrémité d'un peu de blanchâtre, & ont leur tige de cette derniere couleur : les moyennes sont d'un brun-noirâtre du côté extérieur; mais leur côté intérieur est blanc vers leur origine & gris vers leur extrémité; & tout le tour de la plume est bordé de blanc : il faut cependant excepter les cinq plus proches du corps, qui sont d'un gris-brun, variées de quelques taches noirâtres & bordées de blanchâtre vers leur extrémité. Ces dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un gris-brun, & bor-

dées de blanchâtre par le bout: les quatre du milieu & les deux plus extérieures de chaque côté sont marquées de taches transversales noirâtres, sçavoir trois placées sur le côté extérieur, & une seulement placée sur le côté intérieur; tandis que les deux intermédiaires de chaque côté n'ont aucunes de ces taches. Les quatre plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est d'un rouge clair, excepté son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont aussi d'un rouge clair; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

utrinque extimæ maculis insigniuntur transversis nigricantibus, tribus scilicet in latere exteriore positis, unicâ verò in latere interiore collocatâ; binæ autem utrinque medium locum obtinentes maculis penitùs destituuntur. Rectrices quatuor intermediæ lateralium longitudinem paululùm superant; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum dilutè rubrum, excepto apice nigricante. Pars crurum plumis denudata, pedesque pariter dilutè rubri; ungues verò nigricantes. Juxta maris littora degit. *Ex museo Realmuriano.*

** 4. Le Chevalier rouge.

Tringa pennis in medio fuscis, ad margines griseis supernè vestita, infernè alba, maculis griseo-fuscis varia; uropygio candido; rectricibus griseo-fuscis, nigricante transversim striatis, albo in apice marginatis; pedibus rubris . . . . Totanus ruber.

Tringa luteo cinereoque maculata subtus alba, rostro pedibusque rubris. *Faun. Suec. Linn. N°.* 153.

Tringa

Tringa rostro pedibusque rubris, corpore luteo cinereoque variegato, subtus albo. Gambetta. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *sp.* 3.
Calidris nigra, quæ Gambetta. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 434, *hujus icon minimè accurata pag.* 432.
Gambetta Italis dicta. *Jonst. Avi. pag.* 109.
Gambetta Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 222.
Raj. Syn. Avi. pag. 117. *N°.* 2.
Totanus alter. *Willugh. Ornith. pag.* 221.
Raj. Syn. Avi. pag. 106. *N°.* 11.
Gallinula pedibus nigris. *Linn. Systh. Nat. ed.* 6. *Gen.* 60. *sp.* 9.
Glareola alia primæ similis, pedibus ex luteo rubentibus. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 1.
An Yacatopil, seu Rostrum Sudis? *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag.* 29. *Cap. LXIX.*
Raj. Syn. Avi. pag. 164.
Chevalier. *Gesn. Avi. pag.* 795.
Chevalier aux pieds rouges. *Alb. Tom. II. pag.* 43; *avec une figure mal coloriée Pl.* 68.
Les Boulonnois l'appellent GAMBETTA. *Aldrov.*
Les Anglois, RED LEGGED HORSEMAN. *Alb.*
Les Mexiquains, YACATOPIL. *Fern.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est; cauda duos pollices & octo lineas; pars crurum plumis denudata, quatuordecim lineas; pes duos pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas, extimus duodecim cum semi lineas, intimus undecim li-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce neuf lignes de long; sa queue deux pouces huit lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatorze lignes; son pied deux pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur douze lignes & demie, l'intérieur onze lignes; & celui de derriere quatre lig-

nes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a un pied sept pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, & le dos sont couverts de plumes brunes dans leur milieu, & grises sur leurs bords. Les plumes scapulaires sont de la même couleur. Le croupion est blanc. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les côtés sont d'un blanc varié de taches de gris-brun, qui occupent le milieu de chaque plume. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes dans leur milieu, & grises sur leurs bords : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre, quelques-unes étant bordées de blanc par le bout. L'aîle est composée de vingt-cinq plumes : les neuf premieres sont

neas; posticus autem quatuor solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & digito intimo rudimento membranæ coadunatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & septem pollicum ; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, partem colli superiorem, dorsumque vestiunt pennæ in medio fuscæ, ad margines griseæ. Scapulares concolores. Uropygium est candidum. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, tectricesque caudæ superiores & inferiores albent, maculisque variegantur griseo-fuscis, cujuslibet pennæ medium occupantibus. Pennæ alas subtus obtegentes albore nitent. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt in medio fuscæ, ad margines griseæ : majores à corpore remotiores fusco-nigricantes, quibusdam albo in apice marginatis. Viginti quinque remigibus ala conflatur : novem primores sunt

subtus cinereæ, superne nigricantes, pauco albido in apice marginatæ, scapis quoque albidis præditæ : undecim quæ proximè sequuntur, à decima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, in latere exteriore fusco-nigricantes, in interiore fuscæ, inque tota circumferentia albo simbriatæ : quinque corpori viciniores in medio fuscæ, latè griseo-marginatæ. Quæ quinque novissimæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices griseo-fuscæ, nigricante transversim striatæ, albo in apice marginatæ. Quatuor intermediæ lateralium longitudinem nonnihil superant; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. Oculorum irides sunt flavo-viridescentes, easque ambit circulus niger. Rostrum ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque rubrum, à medietate ad apicem nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque rubri; ungues verò nigri. Juxta maris & fluviorum littora degit. *Ex mu-*

cendrées en-dessous, noirâtres en-dessus, bordées à leur extrémité d'un peu de blanchâtre, & ont leur tige de cette derniere couleur : les onze suivantes, sçavoir depuis la dixiéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont d'un brun-noirâtre du côté extérieur, brunes du côté intérieur, & bordées de blanc dans toute leur circonférence : les cinq plus proches du corps sont brunes dans leur milieu, avec une large bordure grise. Ces cinq dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un gris-brun, rayées transversalement de noirâtre, & bordées de blanc par le bout. Les quatre du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est d'un jaune-verdâtre, entouré d'un cercle noir. Le bec est rouge depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur, & noir de là jusqu'à son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges; & les

ongles noirs. On le trouve ſur les bords de la mer & des rivieres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

ſeo Realmuriano.

** 5. Le Chevalier rayé.

Voyez Pl. XVIII. Fig. 1.

Tringa pennis griſeo-fuſcis, fuſco-nigricante tranſverſim ſtriatis ſuperne veſtita, infernè alba, tæniis aliis tranſverſis, aliis longitudinalibus fuſcis varia; collo fuſco, marginibus pennarum in collo ſuperiore albo-rufeſcentibus, in collo inferiore albis; uropygio candido; rectricibus albis, fuſco-nigricante tranſverſim ſtriatis, binis intermediis in albo colore griſeo-fuſco maculatis; pedibus pallidè rubris . . . . Totanus striatus.

Il n'eſt pas tout-à-fait ſi gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue eſt de neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces neuf lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a dix-huit lignes de long; ſa queue deux pouces trois lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, treize lignes; ſon pied un pouce ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes & demie, l'extérieur un pouce, l'intérieur onze lignes; & celui de derriere quatre lignes ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni

Præcedenti paululùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues decem pollices & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque octodecim lineas longum eſt; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata tredecim lineas; pes unum pollicem & ſex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim cum ſemi lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas; poſticus autem quatuor lineas tantùm. Trium digitorum

anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & ad digitum intimum rudimento membranæ adnectitur. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & sex pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad sex linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Partem capitis superiorem cooperiunt pennæ fusco-nigricantes, in utroque latere rufescente marginatæ. Quæ collum superius obtegunt, sunt in medio secundum ipsarum scapi longitudinem fuscæ, ad margines albo-rufescentes. Quæ partem dorsi supremam vestiunt, sicut & scapulares, griseo-fuscæ, tæniis transversis fusco-nigricantibus notatæ: scapo quoque fusco-nigricante præditæ. Dorsum infimum & uropygium sunt candida. Guttur & pars colli inferior pennis vestiuntur in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem fuscis, ad margines albis. Quæ pectus, ventrem & latera obtegunt, albæ, tæniis variegatæ fuscis, aliis transversis, aliis quibusdam longitudinalibus. Cru-

avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a un pied six pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes d'un brun-noirâtre, bordées des deux côtés de roussâtre. Celles qui couvrent le dessus du col, sont brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & d'un blanc-roussâtre sur leurs bords. Celles qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont d'un gris-brun, & marquées de rayes transversales d'un brun-noirâtre : leur tige est de cette derniere couleur. La partie inférieure du dos & le croupion sont blancs. La gorge & la partie inférieure du col sont couvertes de plumes brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & blanches sur leurs bords. Celles qui couvrent la poitrine, le ventre, & les côtés, sont blanches & variées de bandes brunes, les unes transversales & quelques autres longitudinales. Le haut des jambes est blanc. Les couvertures du dessus & du des-

ſous de la queue ſont de la même couleur, & rayées tranſverſalement de brun-noirâtre. Celles du deſſous des aîles ſont entiérement blanches, ſi l'on en excepte les plus grandes, qui ſont rayées de bandes tranſverſales d'un gris-blanc. Le bord de l'aîle, au-deſſous du pli qui répond à celui du poignet, eſt couvert de petites plumes brunes, bordées de blanc. Les plus petites couvertures du deſſus des aîles ſont d'un gris-brun : les moyennes ſont de la même couleur, & rayées tranſverſalement de brun-noirâtre : les grandes les plus proches du corps ſont brunes, & terminées d'un blanc ſur lequel eſt une bande brune tranſverſale & en zig-zags : enfin les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un brun-noirâtre. L'aîle eſt compoſée de vingt-ſix plumes : les ſept premieres ſont en-deſſous d'un gris-blanc, & en-deſſus d'un brun-noirâtre, ayant cependant une grande partie de leur côté intérieur d'un gris-blanc ; de plus la tige de la premiere eſt blanche : les treize qui ſuivent celles-ci, ſçavoir depuis la huitiéme juſqu'à la vingtiéme incluſivement, ſont brunes à leur origine, & blanches dans le reſte de leur longueur, cette der-

rum ſuprema pars albicat. Tectrices caudæ ſuperiores & inferiores ſunt quoque candidæ, fuſco-nigricante tranſverſim ſtriatæ. Inferiores alarum tectrices penitùs albicantes, ex illis tamen majores tæniis tranſverſis cinereo-albis ſtriatæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano reſpondentem, obtegunt plumulæ fuſcæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minimæ ſunt griſeo-fuſcæ : mediæ concolores, ſed fuſco-nigricante tranſverſim ſtriatæ : majores corpori viciniores fuſcæ, apice albo, tæniâ tranſversâ & undatâ fuſcâ inſignito : majores tandem à corpore remotiores ex fuſco nigricant. Alam componunt viginti ſex remiges, quarum ſeptem primores ſunt ſubtus cinereo-albæ, ſuperne verò fuſco-nigricantes, attamen in latere interiore maximâ parte cinereo-albæ ; prioris inſuper ſcapus albicat : tredecim proximè ſequentes, ab octava ſcilicet ad vigeſimam uſque incluſivè, in exortu fuſcæ, in reliqua longitudine candidæ, candore ſcilicet eò majus ſpatium occupante, quò remix ſit

corpori vicinior; ita ut octava sit ferè in toto fusca, vigesima verò ferè penitùs candida : in quatuor ex istis remigibus, ab octava scilicet ad undecimam usque inclusivè, albor lineolis quibusdam transversis fuscis insignitur : vigesima prima pauco in exortu fusco notatur, inde ad apicem alba est, lineis quibusdam transversis fuscis striata : vigesima secunda griseo-fusca, in utraque margine alba, griseo-fusco transversim striata : quatuor corpori finitimæ griseo-fuscæ, tæniis notatæ transversis fusco-nigricantibus; quæ tæniæ eo minùs sunt conspicuæ, quò remix fit corpori vicinior. Sex remiges corpori finitimæ longæ sunt, strictiores & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices albæ, fusco-nigricante transversim striatæ : duarum insuper intermediarum alba intervalla sunt griseo-fusco maculata. Rostrum ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque rubescens, à medietate ad apicem nigrum. Pars crurum plumis denudata,

niere couleur occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps; de sorte que la huitiéme est presqu'entiérement brune, & la vingtiéme presqu'entiérement blanche : dans quatre de ces plumes, sçavoir depuis la huitiéme jusqu'à l'onziéme inclusivement, le blanc est marqué de quelques petites lignes transversales brunes : la vingt-uniéme a un peu de brun à son origine; tout le reste est blanc & rayé de quelques lignes transversales brunes : la vingt-deuxiéme est d'un gris-brun, & bordée des deux côtés d'un blanc rayé transversalement de gris-brun : les quatre plus proches du corps sont d'un gris-brun rayé transversalement de brun-noirâtre; cette rayure est d'autant moins apparente, que la plume est plus proche du corps. Les six plumes les plus proches du corps sont longues, étroites & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches, rayées transversalement de brun-noirâtre : de plus dans les deux du milieu les intervales blancs sont tachés de gris-brun. Le bec est rougeâtre depuis son origine

jusque vers la moitié de sa longueur, & de là jusqu'à son extrémité il est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un rouge pâle; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de Madame de Bandeville, & de celui de M. l'Abbé Aubry.*

pedesque pallidè rubri; ungues verò nigricantes. Circa maris littora versatur. *Ex museis D. de Bandeville & D. Aubry.*

** 6. Le Chevalier tacheté.

Voyez Pl. XVIII. Fig. 2.

Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus superne vestita, infernè alba, maculis nigricantibus varia; uropygio & imo ventre candidis; lateribus, rectricibusque albo & nigricante transversim striatis; pedibus rubris . . . . TOTANUS NÆVIUS.

An Pluvialis flavo-cinerea? *Marsil. Danub. Tom. V. pag. 64. hujus icon minimè accurata Tab.* 30.

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long; sa queue deux pouces quatre lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix lignes & demie; son pied un pouce sept lignes & demie; celui du milieu des trois doigts

A præcedente paululùm crassitie superatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem novem pollices æquat, & ad extremos ungues decem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & septem lineas longum est; cauda duos pollices cum quatuor lineis; pars crurum plumis denudata decem cum semi lineas; pes unum pollicem & septem cum semi lineas;

lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim cum semi lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas; posticus autem tres tantùm cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & ad digitum intimum rudimento membranæ adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis quinque pollicum & quatuor linearum; alæ vero complicatæ nonnihil ultra caudam extremam protenduntur. Caput, partem colli superiorem, sicut & dorsi supremam, vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines griseo-rufescentes. Scapulares sunt quoque in medio nigricantes, sed ad latera nigricante & griseo-rufescente transversim striantur. Dorsum infimum & uropygium sunt candida. Guttur, collum inferius & pectus supremum nigricante & albido varia, nigricante scilicet uniuscujusque pennæ medium occupante, & albido circa margines posito; qui color albidus ad colli

antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes & demie, l'extérieur un pouce, l'intérieur onze lignes; & celui de derriere trois lignes & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a un pied cinq pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. La tête & les parties supérieures du col & du dos sont couvertes de plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-roussâtre sur leurs bords. Les scapulaires sont pareillement noirâtres dans leur milieu, mais leurs côtés sont rayés transversalement de noirâtre & de gris-roussâtre. La partie inférieure du dos & le croupion sont blancs. La gorge, la partie inférieure du col & la partie supérieure de la poitrine sont variées de noirâtre & de blanchâtre, le noirâtre occupant le milieu de chaque plume, & le blanchâtre en occupant les bords; cette derniere couleur tire un peu sur le roussâtre sur les côtés du col. Le bas de la poitrine & le haut du

ventre ſont blancs, & variés de quelques petites taches noirâtres. Le bas ventre eſt blanc & ſans taches. Les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, ainſi que les plumes qui couvrent les côtés, ſont rayées tranſverſalement de blanc & de noirâtre. Les couvertures du deſſous des aîles ſont blanches, & variées d'un peu de noirâtre. Les petites du deſſus ſont d'un gris-brun : les grandes les plus proches du corps ſont de la même couleur à leur origine, rayées tranſverſalement de noirâtre & de gris-rouſſâtre à leur extrémité : les grandes les plus éloignées du corps ſont tout-à-fait noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle ſont de cette derniere couleur, ayant cependant une grande partie de leur côté intérieur d'un gris-blanc; la premiere de ces plumes a ſa tige blanche ; & les dernieres ſont variées vers leur extrémité ſeulement de quelques lignes noirâtres, placées du côté intérieur ſur le gris-blanc : les moyennes (excepté les quatre plus proches du corps) ſont d'un gris-brun depuis leur origine juſque vers la moitié de leur longueur, & de-là juſqu'à leur extrémité elles ſont blanches & rayées tranſverſalement de brun : les qua-

latera nonnihil ad rufeſcentem vergit colorem. Pectus infimum & venter ſupremus albent, & minutis quibuſdam maculis nigricantibus variegantur. Venter imus candidus eſt & immaculatus. Tectrices caudæ ſuperiores & inferiores, & pennæ latera cooperientes albo & nigricante tranſverſim ſtriantur. Tectrices alarum inferiores ſunt candidæ, pauco nigricante variæ. Superiores minores griſeo-fuſcæ : majores corpori viciniores in exortu concolores, in extremitate nigricante & griſeo-rufeſcente tranſverſim ſtriatæ : majores à corpore remotiores penitùs nigricantes. Remiges alarum majores ſimiliter nigricant, attamen in latere interiore maximâ parte ex cinereo albent ; ex iſtis prior inſuper ſcapo donatur candido ; & ultimæ versùs ipſarum extremitatem tantùm lineis quibuſdam variegantur nigricantibus, in latere interiore ſupra cinereo-album colorem poſitis : minores (quatuor corpori vicinioribus exceptis) ſunt ab ipſarum exortu mediam versùs longitudinem uſque griſeo-fuſcæ, à medietate ad api-

cem candidæ, fusco transversim striatæ: quatuor corpori finitimæ in medio griseo-fuscæ, ad latera nigricante & griseo-rufescente transversim striatæ. Quæ novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim constat rectricibus albo & nigricante transversim striatis. Rostrum rubrum, attamen in extremitate nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque similiter rubri; ungues verò nigricantes. Juxta maris littora degit. *Ex musæis D. de Bandeville & D. Aubry.*

tre plus proches du corps sont d'un gris brun dans leur milieu, mais leurs côtés sont rayés transversalement de noirâtre & de gris-roussâtre. Ces dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes rayées transversalement de blanc & de noirâtre. Le bec est rouge, excepté son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont pareillement rouges; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de Madame de Bandeville & de celui de M. l'Abbé Aubry.*

** 7. Le Chevalier cendré.

Voyez Pl. XVII. Fig. 2.

Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines rufis superne vestita, infernè albo-rufescens; vertice nigricante; collo inferiore & pectore griseo-rufescentibus; uropygio cinereo-fusco, maculis nigricantibus vario; rectricibus splendidè griseo-fuscis, versùs apicem tæniâ nigricante circumferentiæ parallelâ notatis, in apice rufescente marginatis, octo intermediis versùs apicem exteriùs rufescente maculatis; pedibus saturatè cinereis . . . . Totanus cinereus.

Tringa remigibus fuscis, primâ rachi niveâ. *Faun. Suec. Linn. N°.* 151.
Tringa rostro lævi, pedibus fuscis, remigibus fuscis: rachi primæ niveâ. Tringa littorea. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *sp.* 12.

Gallinula pedibus nigricantibus. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 60. sp. 7.*
Chalidris nigra. *Jonst. Avi. pag.* 109.
Charlet. Exer. pag. 112. *N°.* 2.
Charlet. Onomazt. pag. 107. *N°.* 2.
Chalidris nigra Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 432.
Charadrius nigricans. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. X. sp.* 3.
Chevalier noir. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag.* 208.
Héron blanc de M. Oldham. *Alb. Tom. III. pag.* 37 ; *avec une figure mal coloriée Pl.* 89.

Il est à peu près de la grosseur du *Chevalier rouge.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue deux pouces quatre lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes; son pied un pouce dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes & demie, l'extérieur treize lignes, l'intérieur douze lignes & demie; & celui de derriere quatre lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a un pied neuf pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées,

Cum *Totano rubro* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudam extremam decem pollices & totidem lineas explet, & ad extremos ungues tredecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda duos pollices & quatuor lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes unum pollicem & decem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim cum semi lineas, extimus tredecim lineas, intimus duodecim cum semi lineas; posticus autem solummodo quatuor lineas. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & cum intimo digito rudimento membranæ connectitur. Alis expansis, extremitates majorum remi-

gum unius pedis & novem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad trium usque linearum distantiam ultra caudæ extremitatem protenduntur. Capitis vertex nigricat. Reliquum caput superius pennis vestitur in medio fuscis, in tota circumferentia griseis. Pars colli superior penitùs grisea. Dorsum cooperiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines rufæ. Scapulares concolores; in scapularibus tamen majoribus color nigricans ad viridescentem splendidum colorem vergit. Uropygium & superiores caudæ tectrices sunt cinereo-fuscæ; quælibet tamen pennæ versùs extremitatem nigricante insignitur maculâ; color insuper cinereo-fuscus in pennarum marginibus paululùm ad rufescentem colorem inclinat. Guttur ex albo rufescit. Collum inferius & pectus sunt griseo-rufescentia. Venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices ex albo nonnihil ad rufescentem inclinant colorem. Pennæ alas subtus obtegentes candidæ, minoribus, illis scilicet quæ versùs alarum margines locum

s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. Le sommet de la tête est noirâtre. Tout le reste du dessus de la tête est couvert de plumes brunes dans leur milieu, & grises dans leur circonférence. La partie supérieure du col est entiérement de cette derniere couleur. Le dos est couvert de plumes noirâtres dans leur milieu, & rousses sur leurs bords. Les scapulaires sont de la même couleur; cependant sur les plus grandes de ces dernieres le noirâtre tire sur le verdâtre brillant. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-brun, & chaque plume est marquée vers son bout d'une tache noirâtre; de plus le cendré-brun tire un peu sur le roussâtre sur les bords des plumes. La gorge est d'un blanc-roussâtre. La partie inférieure du col & la poitrine sont d'un gris-roussâtre. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un blanc tirant un peu sur le roussâtre. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches, les petites, sçavoir celles qui sont vers le bord de l'aîle, étant variées d'un peu de cendré-brun. Les petites couvertures

du dessus des aîles sont noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-brun sur leurs bords : les grandes les plus proches du corps sont noirâtres & bordées de roux : les grandes les plus éloignées du corps sont pareillement noirâtres, & bordées de blanchâtre par le bout seulement. L'aîle est composée de vingt-deux plumes : les neuf premieres sont d'un brun-noirâtre, cette couleur étant plus claire sur le côté intérieur, & bordées de blanchâtre par le bout seulement : les neuf suivantes, sçavoir depuis la dixiéme jusqu'à la dix-huitiéme inclusivement, sont d'un cendré-brun, & bordées de blanc ; ces dix-huit plumes ont la tige blanche : les quatre plus proches du corps sont noirâtres, & bordées de roussâtre. Ces quatre dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un gris-brun brillant, marquées vers leur extrémité d'une bande noirâtre parallele à sa circonférence, & bordées de roussâtre par le bout : les huit du milieu sont de plus tachées d'un peu de roussâtre sur leur côté extérieur vers le bout. Le bec

tenent, pauco cinereo-fusco variegatis. Superiores alarum tectrices minores sunt in medio nigricantes, ad margines griseo-fuscæ : majores corpori finitimæ nigricantes, rufo fimbriatæ : majores à corpore remotiores similiter nigricant, sed in apice tantùm albido marginantur. Alam componunt viginti duo remiges, quarum novem primores sunt fusco-nigricantes, attamen in latere interiore nonnihil dilutiores, & in apice tantùm albido marginatæ : novem proximè sequentes, à decima scilicet ad decimam octavam usque inclusivè, cinereo-fuscæ, albo fimbriatæ ; quæ octodecim remiges scapis albis præditæ sunt : quatuor corpori finitimæ nigricantes, rufescente marginatæ. Quatuor nuper descriptæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices splendidè griseo-fuscæ, versùs apicem tæniâ nigricante ipsius circumferentiæ parallelâ notatæ, rufescente in apice marginatæ : octo intermediæ pauco insuper rufescente in

latere exteriore versùs apicem maculantur. Rostrum, unguesque plumbeo-nigricante colore imbuti. Pars crurum plumis denudata & pedes saturatè cinerei. Circa maris littora versatur. *Ex museo D. de Bandeville.*

& les ongles sont de couleur de plomb noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un cendré foncé. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

8. LE CHEVALIER BLANC.

Tringa candida, maculis transversis griseo-rufescentibus superne variegata; remigibus majoribus griseis; rectricibus candidis, griseo-rufescente transversim striatis; pedibus aurantiis . . . . TOTANUS CANDIDUS.

Beccassine blanche. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXIX; avec une figure exacte Pl. 139. (fig. antérieure).*

Les Anglois l'appellent WHITE RED-SHANK, *ou* POOL-SNIPE. *Edwards.*

Crassitie præcedentem paululùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim circiter pollices æquat, & ad extremos ungues tredecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos ferè pollices longum est; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices cum linea unica; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus undecim lineas, intimus decem lineas; posticus autem

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a près de deux pouces de long; sa queue deux pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes; son pied deux pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur onze lignes, l'intérieur dix lignes; & celui de derriere trois lignes & de-

mie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un blanc varié de petites taches transversales d'un gris-roussâtre. La partie antérieure de la tête, la gorge, le dessous du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, les côtés & le croupion sont blancs & sans taches. Les couvertures du dessous des aîles sont pareillement blanches, mais variées de quelques petites taches grises peu apparentes. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les scapulaires : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un blanc sale. Les grandes plumes de l'aîle sont grises : les moyennes sont blanches, & variées de taches transversales

tres tantùm cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & digito intimo rudimento membranæ coadunatur. Alæ complicatæ ad tres usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsumque vestiunt pennæ candidæ, minutis maculis transversis griseo-rufescentibus variegatæ. Scapulares & superiores caudæ tectrices concolores. Caput anterius, guttur, colli inferior pars, pectus, venter, crurum pars suprema, inferiores caudæ tectrices, latera & uropygium albicant, maculisque destituuntur. Pennæ alas subtus obtegentes sunt similiter candidæ, quibusdam tamen minutis maculis griseis non multùm conspicuis variegatæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur colore ac scapulares ipsæ tinguntur : majores à corpore remotiores sordidè albæ. Remiges alarum majores griseæ : minores candidæ, maculis transversis griseo-rufescentibus variæ. Ex minoribus

minoribus corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, caudam ferè extremam attingunt. Cauda duodecim constat rectricibus candidis, griseo-rufescente transversim striatis. Rostrum aurantium, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque aurantii; ungues verò nigricantes. Habitat in *Freto Hudsonis*.

d'un gris-roussâtre. De ces dernieres les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque jusqu'au bout de la queue. La queue est composée de douze plumes blanches, rayées transversalement de gris-roussâtre. Le bec est orangé, excepté son extrémité, qui est noire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes & les pieds sont orangés; & les ongles noirâtres. On le trouve à la *Baye de Hudson*.

9. LE CHEVALIER DE BENGALE.

Tringa superne viridis, infernè alba; capite ad latera, gutture & collo saturatè fuscis; vertice, oculorum ambitu & uropygio candidis; rectricibus purpureis, maculis aurantiis variegatis; pedibus luteo-viridescentibus . . . . . TOTANUS BENGALENSIS.

Rallus corpore vertice oculisque albis, capite colloque nigris, alis dorsoque viridibus, remigibus primariis rubro maculatis. Rallus Benghalensis. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 83. *sp.* 4.

Rallus aquaticus Bengalensis. *Klein. Avi. pag.* 104. *N°.* 5.

Râle d'eau de Bengale. *Alb. Tom. III. pag.* 38; *avec une figure mal coloriée Pl.* 90.

Les Anglois l'appellent BENGALL WATER RAIL. *Alb.*

Tringam crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues decem

Il est à peu près de la grosseur du *Beccasseau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix

pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce huit lignes de long; sa queue un pouce six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes; son pied dix-huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur dix lignes, l'intérieur neuf lignes & demie; & celui de derriere environ cinq lignes Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est blanc. Le tour des yeux est de la même couleur: cette blancheur forme de chaque côté de la tête une petite bande, qui s'étend jusque vers l'occiput, en se terminant en pointe. Les côtés de la tête, la gorge & le col sont d'un brun-foncé. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont vertes. La partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les côtés sont blancs. Les grandes plumes de l'aîle sont pourpres, & variées chacune de cinq grandes taches orangées, placées sur leur côté extérieur: les

pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & octo lineas longum est; cauda unum pollicem cum sex lineis; pars crurum plumis denudata sex lineas; pes octodecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus decem lineas, intimus novem cum semi lineas; posticus autem quinque circiter lineas. Alæ complicatæ ad caudam ferè extremam pertingunt. Capitis vertex albicat. Oculorum ambitus similiter candidus: qui candor in utroque capitis latere exiguam efformat tæniam versùs occipitium usque productam, & in acumen desinentem. Caput ad latera, guttur & collum sunt saturatè fusca. Dorsi suprema pars, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices virides. Dorsum infimum, uropygium, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, tectricesque caudæ superiores & inferiores albi sunt coloris. Remiges alarum majores purpureæ; quælibet autem quinque variegatur majusculis maculis aurantiis, in latere exteriore positis: minores

sunt virides; corpori tamen finitima candida. Remiges corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices purpureæ, majusculis maculis aurantiis variegatæ. Oculorum irides luteæ. Rostrum quoque luteum. Pars crurum plumis denudata, pedesque luteo-viridescentes; ungues verò nigri. Habitat in *Bengalensi* Regno.

moyennes sont vertes; cependant la plus proche du corps est blanche. Les plumes de l'aile les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes. La queue est composée de douze plumes pourpres, & variées de grandes taches orangées. L'iris des yeux est jaune. Le bec est de la même couleur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune-verdâtre; & les ongles noirs. On le trouve dans le Royaume de *Bengale*.

** 10. L'ALOUETTE-DE-MER.

Voyez Pl. XIX. Fig. 1.

Tringa pennis in medio secundùm scapum fuscis, ad margines griseis superne vestita, infernè alba; tæniâ utrinque à rostro ad oculos candicante; gutture & collo inferiore albidis, maculis fuscis variegatis; rectricibus griseis, binis intermediis exteriùs saturatè fuscis . . . . CINCLUS.

Tringa pulla maculis minoribus rotundis albis variegata, ventre albicante. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag.* 477.

Trynga quarta. *Jonst. Avi. pag.* 112.

Cinclus. *Gesn. icon. Avi. pag.* 122, *in qua hujus icon minimè accurata. Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 490. *hujus icon minùs accurata pag.* 491. *Jonst. Avi. pag.* 112.

Cinclus, seu Motacilla maritima. *Gesn. Avi. pag.* 616. *hujus icon minimè accurata pag.* 617.

Cinclus Ornithologi & Turneri. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 490. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 493.

Cinclus prior Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 110. *N°. A.* 13.

Gallinago minima ex fusco & albo varia. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 320. *N°. XIV. hujus icon minimè accurata Tab.* 265. *fig.* 4.

Raj. Syn. Avi. pag. 190. *N* . 11.
Schœniclus. *Moehr. Avi. Gen.* 94.
Schœniclos, five Junco Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 487. *hujus duæ icones minùs accuratæ pag.* 489.
Junco. *Charlet. Exer. pag.* 113. *N°. X.*
Charlet. Onomazt. pag. 108. *N°. X.*
Junco Bellonii. *Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53.
Avis The Stint dicta. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag.* 19.
The Stint. *Willugh. Ornith. pag.* 226.
Alouette de mer. *Bel. Hist. nat. des Oif. pag.* 217; *dans laquelle il y a une figure très-peu exacte.*
Bel. Portr. d'Oif. pag. 50 *a, dans laquelle est la même figure.*
Bergeronette. *Kolbe. Defcrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag.* 160.
Sanderling d'Arbres. *Alb. Tom. III. pag.* 37; *avec une figure mal coloriée Pl.* 88.
Les Grecs l'appellent Κιγκλος. *Gesn. Aldrov. Jonst.* Σχοινικλος. *Bel. Aldrov.*
Les Boulonnois, GIAROLO; GIARONCELLO. *Aldrov.*
Les Allemands, STEIN-BICKER; STEIN-BEYSSER. *Gesn.*
Les Allemands aux environs de Strasbourg, LYSSKLICKER. *Gesn.*
Les Hollandois, STRAND-LOOPER. *Kolbe.*
Les Anglois, STINT. *Willugh. Raj. Charlet. Sibbald.* WATER-SWALLOW. *Gesn.* SPAR *ou* PERR. *Charlet.* TREE WIDDLE. *Alb.*
Les Anglois qui habitent la Province de Suffex, OX-EYE. *Raj.*
Les Anglois de la Jamaïque, LEAST-SNIPE. *Sloane. Raj.* SNIPE. *Browne.*

Elle eſt beaucoup plus groſſe que l'*Alouette hupée*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de ſept pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de ſept pouces ſix lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes & demie de long; ſa queue un pouce onze lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſix lignes, ſon pied dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes

Alaudam criſtatam nonnihil craſſitie ſuperat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam ſeptem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues ſeptem pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque quatuordecim cum ſemi lineas longum eſt; cauda unum pollicem cum undecim lineis; pars crurum plumis denudata ſex lineas; pes decem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue

novem cum semi lineas, extimus octo lineas, intimus septem cum semi lineas; posticus autem lineas tantummodo binas. Omnes digiti sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem fuscæ, ad margines griseæ. Scapulares eodem imbutæ colore. Superiores caudæ tectrices fusco-nigricantes. In utroque capitis latere exigua extat tænia candicans, ab exortu rostri ad oculos usque producta. Guttur & collum inferius candicant, minutisque variegantur maculis fuscis, cujuslibet pennæ medium secundùm ipsarum scapi longitudinem occupantibus. Pectus, venter, latera, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albicant. Crurum suprema pars exteriùs grisea, interiùs alba. Alarum margi-

& demie, l'extérieur huit lignes, l'intérieur sept lignes & demie; & celui de derriere deux lignes seulement. Tous ses doigts sont séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a treize pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à deux lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & grises sur leurs bords. Les scapulaires sont de la même couleur. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun-noirâtre. De chaque côté de la tête est une petite bande blanchâtre, qui s'étend depuis l'origine du bec jusqu'aux yeux. La gorge & la partie inférieure du col sont blanchâtres, & variées de petites taches brunes, qui occupent le milieu de chaque plume selon la longueur de sa tige. La poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Le haut des jambes est gris du côté extérieur, & blanc du côté intérieur. Le bord de l'aile, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est couvert de

petites plumes grises, bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun, bordées de gris clair, le milieu de chaque plume étant d'une couleur plus foncée : les grandes les plus proches du corps sont d'un gris-brun, & terminées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé, & terminées pareillement de blanc ; mais dans les trois premieres cette derniere couleur est peu apparente. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes : les neuf premieres sont d'un brun assez foncé du côté extérieur & plus clair du côté intérieur ; leur tige est blanchâtre vers leur extrémité seulement ; de plus cinq de celles-là, sçavoir depuis la cinquiéme jusqu'à la neuviéme inclusivement, sont bordées de blanc du côté extérieur, mais seulement vers le milieu de leur longueur : les onze suivantes, sçavoir depuis la dixiéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont d'un gris-brun, bordées de blanc ; elles ont aussi la plus grande partie de leur côté intérieur blanche, le blanc occupant cependant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps : ces vingt plumes sont d'un gris-blanc en-dessous : les

nes, infra articulum carpo humano respondentem, vestiunt plumulæ griseæ, albo fimbriatæ. Tectrices alarum superiores minores sunt griseo-fuscæ, griseo diluto marginatæ ; attamen in medio colore saturatiore tinctæ : majores corpori finitimæ griseo-fuscæ, apicibus albis præditæ : majores à corpore remotiores saturatè fuscæ, albo similiter terminatæ ; in tribus autem primoribus albedo non multùm est conspicua. Viginti quatuor remigibus ala conflatur : novem primores sunt in latere exteriore saturatè, in interiore dilutiùs fuscæ, scapo versùs ipsarum extremitatem tantùm albido præditæ ; ex istis quinque, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, in latere exteriore albo insuper marginantur, sed tantùm versùs ipsarum mediam longitudinem : undecim proximè sequentes, à decima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, griseo-fuscæ, albo fimbriatæ, attamen in latere interiore maximâ parte candidæ, candore scilicet eò majus spatium occupante, quò remix fit corpori vicinior : quæ viginti remiges sunt subtus cinereo-albæ :

quatuor corpori finitimæ griseo-fuscæ, fusco obscuriore in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem imbutæ. Quæ quatuor novissimè dictæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, caudam ferè extremam attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ sunt in latere exteriore saturatè fuscæ, in latere interiore griseæ: laterales omnes in utroque latere simili griseo imbutæ. Binæ intermediæ in acumen desinunt, & laterales trium ferè linearum longitudine antecellunt. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusco-nigricantes. Maris, fluviorumque littora frequentat. Gregatim volat hæc species. *Ex museo Realmuriano.*

quatre plus proches du corps sont d'un gris-brun, cette couleur étant plus obscure dans leur milieu selon la longueur de leur tige. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque jusqu'au bout de la queue. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un brun foncé du côté extérieur, & grises du côté intérieur : toutes les latérales sont des deux côtés de cette derniere couleur. Les deux du milieu se terminent en pointe, & sont plus longues que les latérales de près de trois lignes. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un brun-noirâtre. On la trouve sur le bords de la mer & des rivieres. Cette espece vole par troupe. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

A. *La petite Alouette-de-mer.*

Cinclus minor.

Cinclus minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 490. *hujus icon minùs accurata pag.* 492.
Cincli congener prior. *Jonst. Avi. pag.* 112.
Les Boulonnois l'appellent GIAROLO ; GIARONCELLO. *Aldrov.*

Coloribus & corporis figurâ præcedenti omnino

Elle ressemble tout-à-fait à la précédente soit pour la for-

me du corps, soit pour les couleurs; elle en différe seulement en ce qu'elle est un peu moins grande. On la trouve dans les mêmes endroits.

respondet; ab illo tantùm differt magnitudine, quâ ei cedit. Iisdem in locis habitat.

** 11. L'ALOUETTE-DE-MER A COLLIER.

Voyez Pl. XIX. Fig. 2.

Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines rufis superne vestita, infernè alba; uropygio griseo-fusco, pennis in medio obscurioribus; gutture & collo inferiore maculis fuscis variegatis; pectore fusco, marginibus pennarum candidis; rectricibus griseis, binis intermediis interiùs saturatè fuscis, lateralibus interiùs albo marginatis, scapo albo præditis . . . . CINCLUS TORQUATUS.

Elle n'est pas si grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue un pouce dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes; son pied neuf lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes; l'extérieur neuf lignes, l'intérieur huit lignes; & celui de derriere deux lignes seulement. Elle a douze pouces quatre lignes de vol; & ses aî-

Præcedenti crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda unum pollicem cum decem lineis; pars crurum plumis denudata sex lineas; pes novem cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas; posticus autem lineas tantummodo binas. Alis expansis, extremitates majorum remigum

gum duodecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudæ extremitatem pertingunt. Partem capitis superiorem, sicut & dorsi supremam, vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines rufæ. Scapulares concolores. Quæ partem colli superiorem obtegunt, sunt in medio fuscæ, ad margines albo-rufescentes. Quæ dorsum infimum & uropygium cooperiunt, griseo-fuscæ, attamen in medio colore nonnihil obscuriore imbutæ. Ex superioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum obtinent, fuscæ sunt, quibusdam ex istis rufo variegatis: quæ ad latera positæ sunt, partim fuscæ, partim candidæ. Guttur & collum inferius albicant, minutisque variegantur maculis fuscis, cujuslibet pennæ medium secundùm ipsarum scapi longitudinem occupantibus. Pectus, laterumque partem supremam vestiunt pennæ fuscæ, candido marginatæ. Venter, crurum suprema pars, laterum pars infima, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albent. Alarum margines, infra articu-

les, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête & celle du dos sont couvertes de plumes noirâtres dans leur milieu, & rousses sur leurs bords. Les scapulaires sont de la même couleur. Celles qui couvrent la partie supérieure du col, sont brunes dans leur milieu, & d'un blanc-roussâtre sur leurs bords. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes d'un gris-brun, le milieu de chacune étant d'une couleur un peu plus obscure. Parmi les couvertures du dessus de la queue, celles qui occupent le milieu, sont brunes, & quelques-unes d'entr'elles sont variées de roux : celles qui occupent les deux côtés, sont en partie brunes & en partie blanches. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc varié de petites taches brunes, qui occupent le milieu de chaque plume, selon la longueur de sa tige. La poitrine & le haut des côtés sont couverts de plumes brunes, bordées de blanc. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & le bas des côtés sont blancs. Le bord de l'aîle, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est

couvert de petites plumes grises, bordées de blanc. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun un peu plus foncé dans leur milieu, selon la longueur de leur tige, qu'ailleurs, & bordées de blanchâtre; les grandes les plus proches du corps sont d'un gris-brun, & terminées de blanc: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé; de ces dernieres les plus intérieures sont terminées de blanc. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes: les neuf premieres sont d'un brun assez foncé du côté extérieur & plus clair du côté intérieur; leur tige est blanchâtre vers leur extrémité seulement; de plus cinq de celles-là sçavoir depuis la cinquiéme jusqu'à la neuviéme inclusivement, sont bordées de blanc du côté extérieur, mais seulement vers le milieu de leur longueur: les onze suivantes, sçavoir depuis la dixiéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont d'un gris-brun, bordées de blanc; elles ont aussi la plus grande partie de leur côté intérieur blanche, le blanc occupant cependant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps: ces vingt plumes sont d'un

lum carpo humano respondentem, cooperiunt plumulæ griseæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices, minimæ scilicet & mediæ, griseo-fuscæ, in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem colore paulò saturatiore tinctæ, albido marginatæ: majores corpori viciniores griseo-fuscæ, ad apicem candidæ: majores à corpore remotiores saturatè fuscæ; ex istis autem novissimis, intimæ albo terminantur. Alam componunt viginti quatuor remiges, quarum novem primores sunt in latere exteriore saturatè, in interiore dilutiùs fuscæ, scapo versùs ipsarum extremitatem tantùm albo præditæ; ex istis quinque, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, in latere exteriore albo insuper marginantur, sed tantùm versùs ipsarum mediam longitudinem: undecim proximè sequentes, à decima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, griseo-fuscæ, albo fimbriatæ, attamen in latere interiore maximâ parte candidæ, candore scilicet eò majus spatium occupante, quò remix fit corpori vicinior: quæ viginti remiges sunt subtus

cinereo-albæ: quatuor corpori finitimæ griseo-fuscæ, fusco obscuriore in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem imbutæ. Quæ quatuor novissimè dictæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, caudam ferè extremam attingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur: binæ intermediæ in latere exteriore griseæ, in interiore saturatè fuscæ: laterales omnes in utroque latere griseæ, interiùs albo marginatæ, scapo albo præditæ. Binæ intermediæ duarum linearum longitudine laterales excedunt, & in acumen desinunt. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusci; ungues verò nigricantes. Juxta maris & fluviorum littora versatur. *Ex museo D. Aubry.*

gris-blanc en-dessous : les quatre plus proches du corps sont d'un gris-brun, cette couleur étant plus obscure dans leur milieu selon la longueur de leur tige. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque jusqu'au bout de la queue. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont grises du côté extérieur, & d'un brun foncé du côté intérieur : toutes les latérales sont grises des deux côtés, bordées intérieurement de blanc, & ont leur tige blanche. Les deux du milieu sont plus longues de deux lignes que les latérales, & se terminent en pointe. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont bruns; & les ongles noirâtres. On la trouve sur les bords de la mer & des rivieres. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

** 12. L'ALOUETTE-DE-MER DE S. DOMINGUE.

Voyez Pl. XXIV. Fig. 1.

Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines rufis superne vestita, infernè albo-rufescens; uropygio griseo-fusco, pennis in medio obscurioribus; genis, gutture & collo inferiore maculis fuscis variegatis; rectricibus binis intermediis nigricantibus, rufo fimbriatis, lateralibus griseis, albo-rufescente marginatis.... CINCLUS DOMINICENSIS.

Elle eſt un peu plus groſſe que la *nôtre*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de huit pouces, & juſqu'à celui des ongles de huit pouces neuf lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; ſa queue deux pouces une ligne; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, neuf lignes; ſon pied un pouce; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a auſſi un pouce de long, l'extérieur dix lignes & demie, l'intérieur dix lignes; & celui de derriere trois lignes ſeulement. Tous ſes doigts ſont ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. Elle a quinze pouces ſix lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à deux lignes au-delà du bout de la queue. Les parties ſupérieures de la tête & du col, & le dos ſont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & rouſſes ſur leurs bords. Les ſcapulaires ſont de la même couleur. Celles qui couvrent le croupion, ſont d'un gris-brun, le milieu de chaque plume étant d'une couleur un peu plus obſcure. Les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un brun-noirâtre. Les

Craſſitie *Cinclum noſtratem* paululùm antecellit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam octo pollices explet, & ad extremos ungues octo pollices & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tredecim lineas longum eſt; cauda duos pollices cum linea una; pars crurum plumis denudata novem lineas; pes unum pollicem; trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem longitudine pollet; extimus decem cum ſemi lineas longus eſt; intimus decem lineas; poſticus autem tres ſolummodo lineas. Omnes digiti ſunt ad exortum uſque à ſe invicem diſcreti. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt quindecim pollicum & ſex linearum; alæ verò complicatæ ad duas uſque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli ſuperiores, dorſumque veſtiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines rufæ. Scapulares eodem colore imbutæ. Quæ uropygium cooperiunt, ſunt griſeo-fuſcæ, unaquâque pennâ in medio colore nonnihil obſcuriore tinctâ. Su-

periores caudæ tectrices ex fusco nigricant. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genæ, guttur & collum inferius ex albo rufescunt, & minutis maculis fuscis variegantur. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices sunt quidem albo-rufescentes, sed maculis destituuntur. Tectrices alarum inferiores minores griseo-fuscæ, albo-rufescente fimbriatæ : majores corpori finitimæ albo-rufescentes : majores à corpore remotiores dilutè cinereæ, strictissimis marginibus albo-rufescentibus præditæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori viciniores, fuscæ, albo-rufescente marginatæ : majores à corpore remotiores penitùs fuscæ. Alam componunt viginti tres remiges subtus dilutè cinereæ, & scapo albo præditæ; superne verò novem primores fuscæ sunt, attamen in latere interiore maximâ parte griseo-fuscæ ; ex istis autem prior scapo donatur candido : decem proximè sequentes, à decima scilicet ad decimam nonam usque inclusivè, sunt griseo-fuscæ, in latere exteriore albo-

cotés de la tête au-dessous des yeux ou les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc-roussâtre, varié de petites taches brunes. La poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-roussâtre & sans taches. Les petites couvertures du dessous des aîles sont d'un gris-brun, & bordées de blanc-roussâtre : les grandes les plus proches du corps sont de cette derniere couleur : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré clair, fort étroitement bordées d'un blanc-roussâtre. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes, & bordées de blanc-roussâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont entiérement brunes. L'aîle est composée de vingt-trois plumes, qui sont en-dessous d'un cendré clair, & ont leur tige blanche; mais en-dessus les neuf premieres sont brunes, ayant une grande partie de leur côté intérieur d'un gris-brun ; la premiere de celles-ci a aussi sa tige blanche : les dix suivantes, sçavoir depuis la dixiéme jusqu'à la dix-neuviéme inclusivement, sont d'un gris-brun, & bor-

dées extérieurement de blanc-rousſâtre : les quatre plus proches du corps ſont noirâtres, & bordées de roux. Ces quatre dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſque juſqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La premiere des plumes de l'aîle eſt la plus longue de toutes. La queue eſt composée de douze plumes : les deux du milieu ſont noirâtres, & bordées de roux : toutes les latérales ſont griſes, & bordées de blanc-rousſâtre. Les deux du milieu ſont un peu plus longues que les latérales, & ſe terminent en pointe. Le bec eſt brun, excepté ſon extrémité, qui eſt noire. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont bruns ; & les ongles noirâtres. On la trouve à *S. Domingue*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

rufeſcente fimbriatæ : quatuor corpori finitimæ nigricantes, rufo marginatæ. Quæ quatuor noviſſimæ longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, ad duas ferè tertias longitudinis caudæ partes pertingunt. Remix prima reliquarum omnium longitudinem antecellit. Duodecim rectricibus cauda conſtat : binæ intermediæ nigricantes, rufo fimbriatæ : laterales omnes griſeæ, albo-rufeſcente marginatæ. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt, & in acumen deſinunt. Roſtrum fuſcum, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque fuſci ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Dominicenſi Inſula*, unde in *muſeum Realmurianum* miſſus à *D. Chervain*.

** 13. LA PETITE ALOUETTE-DE-MER DE S. DOMINGUE.

Voyez Pl. XXV. Fig. 2.

Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines rufeſcentibus ſuperne veſtita, infernè albo-rufeſcens ; uropygio griſeo-fuſco, pennis in medio obſcurioribus ; rectricibus binis intermediis exteriùs griſeo-fuſcis, interiùs nigricantibus, lateralibus griſeis, tribus utrinque extimis ſcapo albido præditis, binis proximis albo-rufeſcente in apice marginatis . . . . CINCLUS DOMINICENSIS MINOR.

Crassitie *Passerem domesticum* non excedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & octo lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum linea unica. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem & octo lineas; pars crurum plumis denudata sex cum semi lineas; pes novem cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas, extimus octo lineas, intimus septem cum semi lineas; posticus autem binas tantùm cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & digito intimo rudimento membranæ coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum decem pollicum & octo linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas usque lineas ultra caudæ extremitatem protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsumque vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines rufescentes. Scapulares

Elle n'est pas plus grosse qu'un *Moineau franc.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces une ligne. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes & demie de long; sa queue un pouce huit lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes & demie; son pied neuf lignes & demie; celui du milieu de trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes, l'extérieur huit lignes, l'intérieur sept lignes & demie; & celui de derriere deux lignes & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Elle a dix pouces huit lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à deux lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, & le dos sont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & roussâtres sur leurs bords. Les scapulaires sont de la même couleur. Celles qui couvrent

le croupion, font d'un gris-brun, le milieu de chaque plume étant d'une couleur un peu plus obfcure. Parmi les couvertures du deffus de la queue, celles qui occupent le milieu, font noirâtres; & celles qui occupent les deux côtés, font en partie noirâtres & en partie blanchâtres. Les côtés de la tête au-deffous des yeux ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deffous de la queue & les côtés font d'un blanc-rouffâtre. Les petites couvertures du deffous des aîles font d'un gris-brun, & bordées de blanc-rouffâtre : les grandes les plus proches du corps font de cette derniere couleur; les grandes les plus éloignées du corps font d'un cendré clair, fort étroitement bordées d'un blanc-rouffâtre. Les petites couvertures du deffus des aîles, ainfi que les grandes les plus proches du corps, font brunes, & bordées de blanc-rouffâtre : les grandes les plus éloignées du corps font noirâtres; & de ces dernieres, les plus intérieures font bordées de blanc-rouffâtre par le bout. L'aîle eft compofée de vingt-quatre plumes : les dix premieres font noirâtres, ayant cependant la

concolores. Quæ uropygium obtegunt, funt grifeo-fufcæ, attamen in medio colore nonnihil obfcuriore imbutæ. Ex fuperioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum tenent, nigricant; quæ verò ad latera collocantur, funt partim nigricantes, partim albidæ. Caput ad latera, idque infra oculos, five genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum fuprema pars, inferiorefque caudæ tectrices ex albo-rufefcunt. Tectrices alarum inferiores minores funt grifeo-fufcæ, albo-rufefcente fimbriatæ : majores corpori viciniores albo-rufefcentes : majores à corpore remotiores dilutè cinereæ, ftrictiffimis marginibus albo-rufefcentibus præditæ. Superiores alarum tectrices minores, ficut & majores corpori finitimæ, fufcæ, albo-rufefcente marginatæ : majores à corpore remotiores nigricantes; ex iftis autem noviffimis, intimæ albo-rufefcente in extremitate marginantur. Viginti quatuor remigibus ala conflatur : decem primores nigricant, funt tamen in latere interiore maximâ parte grifeæ : decem quæ proximè fequuntur, ab

undecima

undecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, sunt in exortu candicantes, versùs extremitatem fuscæ, interiùs & apice griseo marginatæ : quæ viginti remiges subtus sunt dilutè cinereæ, & scapo candicante donantur : quatuor corpori viciniores nigricantes, rufescente marginatæ. Quæ quatuor nuper descriptæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, caudam ferè extremam attingunt. Remix prima reliquas omnes longitudine superat. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ in latere exteriore griseo-fuscæ, in interiore nigricantes : laterales omnes griseæ ; ex istis autem binæ duabus intermediis utrinque finitimæ albo-rufescente in apice marginantur ; & tres utrinque extimæ scapo albido præditæ sunt. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt, & in acumen desinunt. Rostrum fuscum, exceptâ tamen extremitate nigrâ. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusci ; ungues verò nigri.

plus grande partie de leur côté intérieur grise : les dix suivantes, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont blanchâtres à leur origine, brunes vers leur extrémité, & bordées de gris intérieurement & par le bout ; le dessous de ces vingt plumes est d'un cendré clair, & leur tige est blanchâtre : les quatre plus proches du corps sont noirâtres, & bordées de roussâtre. Ces quatre dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque jusqu'au bout de la queue. La premiere des plumes de l'aîle est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un gris-brun du côté extérieur, & noirâtres du côté intérieur : toutes les latérales sont grises ; mais les deux plus proches de chaque côté de celles du milieu sont bordées par le bout de blanc-roussâtre ; & les trois plus extérieures de chaque côté ont leur tige blanchâtre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, & se terminent en pointe. Le bec est brun, excepté son extrémité, qui est noire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont bruns ; & les ongles noirs.

La *femelle* différe du *mâle* en ce que ses couleurs sont un peu plus claires.

On les trouve à *S. Domingue*, d'où elles ont été envoyées à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

Fœmina à *mare* discrepat coloribus nonnihil dilutioribus.

Habitat in *Dominicensi Insula*, unde in *museum Reaumurianum* missi sunt à *D. Chervain*.

** 14. LA MAUBÉCHE.

Voyez Pl. XX. Fig. 1.

Tringa superne fusco-nigricans, marginibus pennarum dilutè castaneis, infernè castanea; uropygio cinereo-fusco, nigricante transversim striato, marginibus pennarum albidis; lateribus in parte infima fusco-nigricante, albo & dilutè castaneo transversim striatis; rectricibus griseo-fuscis, lateralibus exteriùs albo marginatis . . . . CALIDRIS.

Rusticula sylvatica. *Gesn. Avi. pag.* 505. *hujus icon minùs accurata pag.* 504.
Gesn. icon. Avi. pag. 111, *in qua eadem icon.*
Aldrov. Avi Tom. III. pag. 476. *hujus icon minùs accurata pag.* 477.
Jonst. Avi. pag. 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31.
Les Allemands l'appellent WALD-SCHNEPFF; HOLTZ-SCHNEPFF. *Gesn. Aldrov.*

Elle est à peu près de la grosseur du *Chevalier*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue deux pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, sept lignes;

Cum *Totano* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata septem lineas; pes

unum pollicem ; trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem longitudine pollet; extimus decem lineas longus, intimus novem cum semi lineas; posticus autem tres solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis quinque pollicum & novem linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad tres usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsique partem supremam vestiunt pennæ fusco-nigricantes, castaneo diluto marginatæ. Scapulares concolores. Quæ dorsum infimum & uropygium obtegunt, sunt cinereo-fuscæ, albido marginatæ, & tæniâ transversâ nigricante terminatæ. Superiores caudæ tectrices sunt transversim striatæ, aliæ scilicet fusco-nigricante & castaneo diluto, aliæ albo & fusco-nigricante, aliæ tandem tribus simul suprà dictis coloribus. Basim mandibulæ superioris ambiunt plumulæ griseæ. Syn-

son pied un pouce; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a aussi un pouce de longueur, l'extérieur dix lignes, l'intérieur neuf lignes & demie; & celui de derriere trois lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a un pied cinq pouces neuf lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos sont couvertes de plumes d'un brun-noirâtre, bordées de marron clair. Les scapulaires sont de la même couleur. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, sont d'un cendré-brun, bordées de blanchâtre, & terminées par une bande transversale noirâtre. Les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement, les unes de brun-noirâtre & de marron clair, d'autres de brun-noirâtre & de blanc, & d'autres de ces trois couleurs. La bâse du demi-bec supérieur est entourée de petites plumes grises. Le synciput, les joues, la gorge, la partie inférieure du

col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & le haut des côtés sont d'un marron clair. Le bas des côtés est couvert de plumes rayées transversalement des mêmes couleurs que les couvertures du dessus de la queue. Les plus petites couvertures du dessous des aîles sont brunes, & bordées de blanc : toutes les autres sont blanches; cependant les grandes les plus proches du corps sont variées de taches transversales brunes. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun; les petites sont de plus bordées d'une couleur plus claire, & les moyennes sont variées de quelques taches, les unes d'un marron clair, & les autres d'un noirâtre-violet : les grandes les plus proches du corps sont pareillement d'un gris - brun, & terminées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé; & de ces dernieres les deux plus intérieures sont terminées de blanc. L'aîle est composée de vingt - cinq plumes : les vingt-une premieres sont blanchâtres en - dessous; mais en - dessus les neuf premieres sont d'un brun foncé, ayant cependant la plus grande

ciput, genas, guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, crurum partem supremam, tectrices caudæ inferiores & latera in suprema parte tingit dilutus castaneus color. Latera in parte infima cooperiunt pennæ iisdem coloribus transversim striatæ ac superiores caudæ tectrices ipsæ striantur. Inferiores alarum tectrices minimæ fuscæ sunt, alboque fimbriatæ : reliquæ omnes candidæ; majores tamen corpori viciniores maculis transversis fuscis variegantur. Tectrices alarum superiores minimæ & mediæ sunt griseo - fuscæ, minimis insuper colore dilutiore fimbriatis, dum mediæ quibusdam variegantur maculis, aliis dilutè castaneis, aliis nigricante - violaceis : majores corpori finitimæ simili griseo - fusco imbutæ, sed apicibus albis præditæ : majores à corpore remotiores saturatè fuscæ; ex istis autem novissimis, binæ intimæ albo terminatæ. Viginti quinque remigibus ala conflatur : viginti & una primores subtus candicant; superne verò novem primores sunt saturatè fuscæ, attamen in latere interiore maximâ parte griseæ;

ex istis insuper quinque, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, in latere exteriore mediam versùs longitudinem pauco marginantur candido: duodecim proximè sequentes, à decima scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, griseo-fuscæ, strictissimâ margine albâ donatæ: quatuor tandem corpori viciniores fuscæ. Quæ quatuor nuper descriptæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ griseo-fuscæ: laterales omnes concolores, exteriùs albo marginatæ. Rostrum, unguesque nigricant. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusci sunt. Digiti autem lati sunt & crassi. Juxta maris littora degit. *Ex museo Realmuriano.*

partie de leur côté intérieur grise; de plus cinq de celles-là, sçavoir depuis la cinquiéme jusqu'à la neuviéme inclusivement, sont bordées d'un peu de blanc du côté extérieur vers le milieu de leur longueur : les douze suivantes, sçavoir depuis la dixiéme jusqu'à la vingt-uniéme inclusivement, sont d'un gris-brun, & bordées fort étroitement de blanc: enfin les quatre plus proches du corps sont brunes. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un gris-brun : toutes les latérales sont de la même couleur, & bordées extérieurement de blanc. Le bec & les ongles sont noirâtres. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont bruns. Ses doigts sont larges & gros. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 15. LA MAUBÉCHE TACHETÉE.

Voyez Pl. XXI. Fig. 1.

Tringa superne cinereo-fusca, maculis nigricante-violaceis rufisque varia, infernè dilutè castanea; collo inferiore

albo-rufescente, maculis fuscis castaneisque variegato; uropygio cinereo-fusco, nigricante transversim striato, marginibus pennarum candidis; lateribus nigricante maculatis; rectricibus binis intermediis cinereis, albo marginatis, lateralibus cinereo-fuscis, scapo albo præditis; utrinque extima lineâ longitudinali candidâ exteriùs notata . . . . CALIDRIS NÆVIA.

An Glareola castanea? *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 5.

Elle est un peu moins grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces cinq lignes Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue deux pouces deux lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, huit lignes; son pied douze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur dix lignes, l'intérieur neuf lignes; & celui de derriere trois lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a un pied cinq pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues novem pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda duos pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes duodecim cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus decem lineas, intimus novem lineas; posticus autem tres tantùm lineas. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & quinque pollicum; alæ verò complicatæ ad extremitatem caudæ pertingunt. Partes ca-

pitis & colli superiores sunt cinereo-fuscæ, minutissimis maculis nigricantibus variæ. Dorsum & scapulares pennæ eodem imbuuntur cinereo-fusco, sed majusculis variegantur maculis, aliis rufis, aliis ex nigricante ad violaceum vergentibus. Uropygium vestiunt pennæ cinereo-fuscæ, albo marginatæ, & versùs ipsarum extremitatem tæniâ nigricante circumferentiæ parallelâ notatæ. Superiores caudæ tectrices sunt ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque cinereæ, in reliqua longitudine nigricante & cinereo-albo transversim striatæ. Synciput, caput ad latera, idque infra oculos, guttur & collum inferius sunt albo-rufescentia, minutis quibusdam maculis fuscis varia; pars colli inferior quibusdam insuper aliis majoribus maculis dilutè castaneis variegatur. Pectus, ventrem & latera tingit color castaneus dilutus; quædam tamen ex pennis latera cooperientibus versùs ipsarum apicem maculâ nigricante notantur. Crurum pars suprema griseo imbuitur colore. Inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus

cendré-brun varié de très-petites taches noirâtres. Le dos & les plumes scapulaires sont pareillement d'un cendré-brun, mais varié d'assez grandes taches, les unes rousses, & les autres d'un noirâtre tirant sur le violet. Le croupion est couvert de plumes d'un cendré-brun, bordées de blanc, & marquées vers leur bout d'une bande noirâtre parallele à sa circonférence. Les couvertures du dessus de la queue sont cendrées depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur; le reste est rayé transversalement de noirâtre & de gris-blanc. Le synciput, les côtés de la tête au-dessous des yeux, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc-roussâtre, varié de quelques petites taches brunes; la partie inférieure du col est de plus variée de quelques autres taches plus grandes & d'un marron clair. La poitrine, le ventre & les côtés sont de cette derniere couleur; mais quelques-unes des plumes des côtés sont marquées vers leur bout d'une tache noirâtre. Le haut des jambes est gris. Les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont blanches. Les petites du dessus des aîles sont d'un gris-brun : les gran-

des les plus proches du corps sont d'un cendré-brun, bordées de blanc, & variées de quelques taches, les unes d'un noirâtre tirant sur le violet, & les autres de couleur de marron : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont d'un gris-brun : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un brun-noirâtre, ayant la plus grande partie de leur côté intérieur cendrée : les moyennes sont d'un cendré-brun très-clair du côté intérieur, un peu plus foncé du côté extérieur, & bordées extérieurement de blanc; il faut cependant excepter les quatre plus proches du corps, qui sont du même cendré que celui du dos : toutes les autres plumes de l'aîle ont leur tige blanche. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont cendrées & bordées de blanc : toutes les latérales sont d'un cendré-brun assez clair du côté intérieur, un peu plus foncé du côté extérieur, & ont la tige blanche : la plus extérieure de chaque côté est

obtegentes albent. Tectrices alarum superiores minores sunt griseo-fuscæ : majores corpori viciniores cinereo-fuscæ, albo fimbriatæ, quibusdam variegatæ maculis, aliis ex nigricante ad violaceum inclinantibus, aliis castaneis : proximè sequentes, istæ scilicet quæ medium obtinent locum, griseo-fuscæ : majores à corpore remotiores nigricantes. Remiges majores ex fusco nigricant, sunt tamen in latere interiore maximâ parte cinereæ : minores cinereo-fuscæ, idque in latere interiore dilutissimè, in exteriore nonnihil saturatiùs, exteriùs insuper albo marginatæ; ex istis tamen excipiendæ sunt quatuor corpori finitimæ, quæ eodem imbuuntur cinereo ac dorsum ipsum tingitur : reliquæ omnes remiges scapo candido præditæ sunt. Quatuor nuper descriptæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates pertingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ cinereæ, albo marginatæ : laterales omnes cinereo-fuscæ, dilutè quidem in latere interiore, in exteriore verò nonnihil

nonnihil saturatiùs, scapo albo præditæ : utrinque extima lineâ insuper candidâ, per totam ipsius longitudinem ductâ, exteriùs notatur. Rostrum nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque viridescentes ; ungues verò nigri. Maris littora frequentat. *Ex museo D. de Bandeville.*

de plus marquée sur son côté extérieur d'une ligne blanche, qui s'étend dans toute sa longueur. Le bec est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verdâtres ; & les ongles noirs. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

** 16. La Maubéche grise.

Voyez Pl. XXI. Fig. 2.

Tringa superne grisea, infernè alba, pennis in collo inferiore, pectore & lateribus tæniâ fuscâ undatâ circumferentiæ parallelâ notatis, in ventre lineolâ longitudinali fuscâ versùs apicem insignitis ; uropygio dilutè griseo, pennis duplici tæniâ fuscâ circumferentiæ parallelâ notatis, albo marginatis ; rectricibus griseis, tæniâ saturatiùs griseâ margini parallelâ insignitis, margine candidâ . . . . Calidris grisea.

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim cum semi lineas longum est ; cauda duos pollices ; pars crurum plumis denudata sex lineas ; pes tredecim lineas ; trium digito-

Elle est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes & demie de long ; sa queue deux pouces ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes ; son pied treize lignes ; celui du milieu

des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur neuf lignes & demie, l'intérieur huit lignes & demie; & celui de derriere trois lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a un pied six pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes grises, bordées d'un gris-blanchâtre. Celles qui couvrent le dessus du col, sont grises dans leur milieu, & blanches sur leurs bords. Celles qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont entiérement grises. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes d'un gris clair, marquées de deux bandes brunes paralleles à leur circonférence, & bordées de blanc. Les couvertures du dessus de la queue sont blanches, & marquées de bandes brunes, les unes longitudinales, & les autres transversales. La gorge est entiérement blanche. La partie inférieure du col, la poitrine & les côtés sont blancs, chaque plume

rum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus novem cum semi lineas, intimus octo cum semi lineas; posticus autem tres tantummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis sex pollicum & quatuor linearum; alæ verò complicatæ ad tres usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partem capitis superiorem obtegunt pennæ griseæ, griseo-candicante fimbriatæ. Quæ collum superius cooperiunt, sunt in medio griseæ, ad margines candidæ. Quæ partem dorsi supremam vestiunt, sicut & scapulares, penitùs griseæ. Dorsum infimum & uropygium pennis obteguntur dilutè griseis, duplici tæniâ fuscâ circumferentiæ parallelâ notatis, albo marginatis. Superiores caudæ tectrices sunt candidæ, tæniis insignitæ fuscis, aliis longitudinalibus, alteris transversis. Guttur penitùs albicat. Pars colli inferior, pectus & latera albent; quælibet autem penna tæniâ fus-

câ undatâ, circumferentiæ parallelâ notatur. Ventrem cooperiunt pennæ pariter albæ, lineolâ fuscâ, versùs ipsarum apicem positâ, & secundùm scapi longitudinem ductâ, insignitæ. Crurum pars suprema & pennæ caudam subtus obtegentes eleganter albicant. Tectrices alarum inferiores minores sunt candicantes, maculis griseo-fuscis variæ : majores candicantes & immaculatæ. Alarum margines ab articulo carpo humano respondente ad alæ extremitatem usque vestiunt plumulæ griseo-fuscæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minores concolores : majores corpori viciniores dilutè griseæ, tæniâ fuscâ undatâ, circumferentiæ parallelâ notatæ, albo marginatæ : majores à corpore remotiores saturatè fuscæ, albo in apice fimbriatæ. Alam componunt viginti quatuor remiges : decem primores sunt in latere exteriore saturatè, in interiore dilutiùs fuscæ, & scapo donantur candido ; ex istis septem, à quarta scilicet ad decimam usque inclusivè, albo insuper exteriùs marginantur : novem proximè sequen-

étant marquée d'une bande brune en zigzags, parallele à sa circonférence. Le ventre est pareillement couvert de plumes blanches, marquées chacune d'une petite ligne brune, placée vers leur extrémité, & qui s'étend selon la longueur de leur tige. Le haut des jambes, & les couvertures du dessous de la queue sont d'un beau blanc. Les petites du dessous des aîles sont blanchâtres, & variées de taches de gris-brun : les grandes sont blanchâtres & sans taches. Le bord de l'aîle depuis le pli qui répond à celui du poignet, jusqu'à l'extrémité de l'aîle est couvert de petites plumes d'un gris-brun, & bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur : les grandes les plus proches du corps sont d'un gris clair, marquées chacune d'une bande brune en zigzags, parallele à leur circonférence, & bordées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé, & bordées de blanc par le bout. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes : les dix premieres sont d'un brun foncé du côté extérieur, d'un brun plus clair du côté intérieur, & ont leur tige blanche ; sept de celles-ci, sçavoir de-

puis la quatriéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont de plus bordées extérieurement de blanc : les neuf suivantes, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la dix-neuviéme inclusivement, sont grises, & bordées de blanc dans toute leur circonférence : les cinq plus proches du corps sont grises, marquées chacune vers leur extrémité d'une bande brune parallele à sa circonférence, & bordées de blanc vers le bout. Ces cinq dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, jusque vers la moitié de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes grises, bordées de blanc, & marquées chacune d'une bande d'un gris plus foncé parallele à la bordure. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

tes, ab undecima scilicet ad decimam nonam usque inclusivè, sunt griseæ, in tota circumferentia albo fimbriatæ : quinque corpori viciniores griseæ, versùs ipsarum extremitatem tæniâ fuscâ ipsius circumferentiæ parallelâ notatæ, & versùs apicem albo marginatæ. Quæ novissimæ quinque remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, mediam versùs caudæ longitudinem extenduntur. Cauda duodecim conflatur rectricibus griseis, margine candidâ præditis, & tæniâ saturatiùs griseâ margini parallelâ insignitis. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Juxta maris littora degit. *Ex museo Realmuriano.*

** 17. La petite Maubéche grise.

Voyez Pl. XX. Fig. 2.

Tringa superne grisea, scapis pennarum nigris, infernè nivea; capite anteriore albo; tæniâ utrinque à rostro ad oculos griseâ; uropygio dilutè griseo; tectricibus alarum superioribus minimis nigricantibus; rectricibus binis intermediis fuscis, lateralibus griseis, omnibus candicante marginatis . . . . Calidris grisea minor.

Arenaria, i. e. Sanderling aliàs etiam Curwilet Pensantiæ in Cornubia dicta. *Willugh. Ornith. pag.* 225.

Arenaria nostra, id est, Sanderling, aliis Curwillet. *Raj. Syn. Avi. pag.* 109. *N°. A.* 11.

Sanderling de Cornouaille. *Alb. Tom. II. pag.* 48 ; *avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl.* 74.

Les Habitans de la Province de Cornouaille l'appellent Sanderling ; Curwilet. *Willugh.*

Præcedenti multùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem septem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem longum est ; cauda unum pollicem & decem lineas ; pars crurum plumis denudata tres lineas ; pes undecim cum semi lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas, extimus octo lineas, & intimus septem cum semi lineas : digito postico caret ; quod maximè singulare. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & octo linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad tres usque lineas ultra caudam

Elle est beaucoup plus petite que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long ; sa queue un pouce dix lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes ; son pied onze lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes, l'extérieur huit lignes, & l'intérieur sept lignes & demie : elle n'a point de doigt derriere ; ce qui est très-singulier. Celui du milieu des trois doigt antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a treize pouces huit lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col

sont d'un gris varié de petites taches noires, qui occupent le milieu de chaque plume. Le dos est couvert de plumes grises, dont la tige est noire. Les scapulaires sont de la même couleur, & sont de plus bordées de blanc. Celles qui couvrent le croupion, sont d'un gris clair. Parmi les couvertures du dessus de la queue, celles qui occupent le milieu, sont grises; & celles des côtés sont blanches. La partie antérieure de la tête, ainsi que ses côtés au-dessous des yeux, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un blanc de neige. De chaque côté de la tête est une petite bande grise, qui s'étend depuis l'origine du bec jusqu'aux yeux. Le bord de l'aîle, un peu au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes noirâtres, bordées de blanc. Les plus petites couvertures du dessus des aîles, sçavoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, sont noirâtres : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur dans leur milieu, & blanches

extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores sunt griseæ, minutis variegatæ maculis nigris, uniuscujusque pennæ medium occupantibus. Dorsum obtegunt pennæ griseæ, scapo nigro præditæ. Scapulares concolores, sed albo insuper marginatæ. Quæ uropygium vestiunt, sunt dilutè griseæ. Ex superioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum obtinent, griseæ sunt; quæ ad latera sunt positæ, candidæ. Caput anteriùs, sicut & ad latera, idque infra oculos, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes niveo candore nitent. In utroque capitis latere exigua extat tænia grisea, ab exortu rostri orta, & ad oculos usque producta. Alarum margines, paulò infra articulum carpo humano respondentem, vestiunt plumulæ nigricantes, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minimæ, istæ scilicet quæ alæ articulum carpo humano respondentem obtegunt, nigricant: mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, sunt in

medio similiter nigricantes, ad margines verò candidæ: majores à corpore remotiores quoque nigricantes, albo marginatæ. Viginti tribus remigibus ala conflatur: quatuor primores nigricant, & scapo donantur candido: sexdecim proximè sequentes, à quinta scilicet ad vigesimam usque inclusivè, sunt in exortu candidæ, versùs extremitatem nigricantes, candore scilicet eò majus spatium occupante, quò remix sit corpori vicinior; ex istis autem quinque primores, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, sunt insuper albo in apice fimbriatæ; undecim reliquæ, à decima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, albo terminatæ: tres corpori finitimæ fuscæ, albo marginatæ. Tres istæ nuper descriptæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ fuscæ, candicante marginatæ: laterales omnes griseæ, candicante similiter fimbriatæ. Rostrum, pars crurum plumis denu-

sur leurs bords: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres & bordées de blanc. L'aîle est composée de vingt-trois plumes: les quatre premieres sont noirâtres, & ont leur tige blanche: les seize suivantes, sçavoir depuis la cinquiéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont blanches à leur origine, & noirâtres vers leur extrémité, le blanc occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps; les cinq premieres de celles-ci, sçavoir depuis la cinquiéme jusqu'à la neuviéme inclusivement, sont de plus bordées de blanc par le bout; & les onze autres, sçavoir depuis la dixiéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont terminées de blanc: les trois plus proches du corps sont brunes, & bordées de blanc. Ces trois dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont brunes, & bordées de blanchâtre: toutes les latérales sont grises, & bordées pareillement de blanchâtre. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles

font noirs.

La *femelle* différe du *mâle* en ce que les plus petites couvertures du dessus de ses aîles, & les grandes plumes de l'aîle sont brunes, tandis que dans le *mâle* elles sont noirâtres.

Elles se tiennent sur les sables des bords de la mer; & volent par troupe. *Du cabinet de M. Mauduyt.*

data, pedes, unguesque nigri.

Fœmina à *mare* discrepat superioribus alarum tectricibus minimis, & remigibus majoribus fuscis, dum istæ pennæ in *mare* nigricant.

In arenosis locis circa maris littora versantur; & gregatim volant. *Ex museo D. Mauduyt.*

** 18. Le Combattant ou Paon-de-mer.

Voyez Pl. XXII. le mâle Fig. 1, *& la femelle Fig.* 2.

Tringa versicolor; (capite anteriore papilloso; pennis in collo inferiore longissimis *mas*); rectricibus lateralibus griseofuscis . . . . Pugnax.

Tringa facie papillis granulatis minimis carneis; rostro pedibusque rubris. *Faun. Suec. Linn. N°.* 145.
Tringa pedibus rubris, rectricibus tribus lateralibus immaculatis, facie papillis granulatis carneis. Pugnax. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *sp.* 1.
Avis quædam, quam in Belgio Kemperken, id est, Pugnacem vocant. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 413. *icones satis accuratæ, maris pag.* 414, 415, 417, 418, 419 *&* 420; *& fæminæ pag.* 416.
Avis pugnax. *Jonst. Avi. pag.* 105, *maris & fæminæ icones Tab.* 51; *& insuper quatuor maris icones Tab.* 52, *omnes ab Aldrovando mutuatæ.*
Charlet. Exer. pag. 110. *N°. V.*
Charlet. Onomazt. pag. 104. *N°. V.*
Marsil. Danub. Tom. V. pag. 52. *maris icon satis accurata Tab.* 24.
Linn. Systh. Nat. ed. 6. *Gen.* 60. *sp.* 1.
Avis pugnax Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 224. *maris & fæminæ icones satis accuratæ Tab. LVI.*
Raj. Syn. Avi. pag. 107. *N°. A.* 3.
Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 367.
Glareola pugnax. *Klein. Avi. pag.* 102. *N°.* 10.

Philomachus

Philomachus. *Moehr. Avi. Gen.* 93.
An Ardea Americana, subcastanea, cucullata? *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 18.
Héron étoilé ou blanc. *Alb. Tom. I. pag.* 64; *avec des figures mal coloriées, du mâle Pl.* 72, *& de la femelle Pl.* 73.
Les Allemands l'appellent HAUS-TEUFFEL. *Rzac.*
Les Flamands, KEMPERKEN. *Aldrov. Jonst. Charlet.*
Les Polonois, PTAK BITNY. *Rzac.*
Les Suédois, BRUSHANE. *Linn.* BRAUSZ-HAHN. *Rzac.*
Les Anglois, le mâle, RUFFE. *Willugh. Raj.* RUFF. *Charlet. Alb. & la femelle*, REEVE. *Willugh. Raj. Charlet. Alb.*

Totanum crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem decem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & quinque lineas longum est; cauda duos pollices cum sex lineis; pars crurum plumis denudata tredecim lineas; pes unum pollicem & novem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum quinque lineis, extimus quatuordecim lineas, intimus tredecim lineas; posticus autem quatuor solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius

Il est à peu près de la grosseur du *Chevalier*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; sa queue deux pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, treize lignes; son pied un pouce neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes, l'extérieur quatorze lignes, l'intérieur treize lignes; & celui de derriere quatre lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied dix pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au

bout de la queue. La partie antérieure de la tête est couverte de petits mammelons charnus & de couleur de chair: la quantité de ces mammelons varie dans les différens individus; les uns en ont beaucoup, & d'autres en ont fort peu. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un violet foncé très-brillant. La partie supérieure du dos est couverte de plumes noirâtres, bordées de gris, & variées de grandes taches du même violet foncé que le dessus du col. Les plumes scapulaires sont de la même couleur que celles de la partie supérieure du dos. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun, chaque plume étant bordée d'une couleur plus claire : de plus les plus grandes des couvertures du dessus de la queue sont tachées de noirâtre vers leur extrémité. La bâse du bec est entourée de petites plumes d'un blanc sale & roussâtre. La partie inférieure du col est couverte de longues plumes d'un violet foncé & brillant, rayées transversalement de roux. La poitrine est variée de blanc & de noir mêlé de ce même violet. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de

pedis decem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput anterius exiguis obsitum est papillis carnosis, carneo colore imbutis: quæ papillæ in variis individuis multùm numero variant; alia enim magnâ istarum papillarum copiâ, alia parvâ donantur. Partes capitis & colli superiores sunt splendidissimè saturatè violaceæ. Partem dorsi supremam vestiunt pennæ nigricantes, griseo fimbriatæ, quasque variegant majusculæ maculæ eodem imbutæ violaceo saturato ac collum superius ipsum tingitur. Scapulares pennis dorsum supremum vestientibus concolores. Dorsum infimum, uropygium, superioresque caudæ tectrices griseo-fuscæ, marginibus pennarum dilutioribus : majores insuper caudæ tectrices superiores versùs ipsarum extremitatem nigricante maculantur. Basim rostri circumdant plumulæ sordidè albo-rufescentes. Partem colli inferiorem cooperiunt pennæ longæ, saturatè violaceæ, splendentes, rufo transversim striatæ. Pectus albo & nigro

variegatur, cum aliqua in nigro violacei suprà dicti mixtura. Venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albent. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt griseo-fusco imbutæ, colore nonnihil dilutiore fimbriatæ : majores à corpore remotiores fuscæ. Remiges majores similiter fuscescunt : minores, exceptis tamen quatuor corpori finitimis, sunt griseo-fusco colore tinctæ, qui color eò dilutior fit, quò remix fit corpori vicinior : quatuor tandem corpori finitimæ fuscæ, maculis transversis nigricantibus versùs apicem insignitæ. Quæ quatuor novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, nonnihil ultra majorum remigum extremitates protenduntur. Cauda duodecim conflatur rectricibus griseo-fuscis : binas intermedias variegant maculæ quædam nigricantes. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedesque grisei; ungues verò nigricantes. *Ex museo D. de Bandeville.*

la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un gris-brun, chaque plume étant bordée d'une couleur un peu plus claire : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur : les moyennes, excepté les quatre plus proche du corps, sont d'un gris-brun, qui s'éclaircit d'autant plus, que la plume est plus proche du corps : enfin les quatre plus proches du corps sont brunes, & marquées vers leur bout de taches transversales noirâtres. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, un peu au-delà de l'extrémité des plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un gris-brun : les deux du milieu sont variées de quelques taches noirâtres. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont gris; & les ongles noirâtres. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

La *femelle* différe du *mâle* en ce qu'elle n'a point de mamelons charnus à la partie antérieure de la tête, & que les plumes du dessous de son col ne sont pas plus longues que celles du dessus. Elle en différe encore par ses couleurs. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. La partie supérieure du dos est couverte de plumes dont les unes sont blanches & les autres brunes; quelques-unes de ces dernieres sont bordées de roussâtre. Les scapulaires sont de même les unes blanches & les autres brunes, dont quelques-unes sont bordées de roussâtre. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes brunes, bordées de roussâtre. Parmi les couvertures du dessus de la queue, celles qui occupent le milieu, sont brunes; & celles des côtés sont blanches. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont mêlées de plumes blanches & de plumes brunes : les grandes les plus éloignées du corps sont toutes brunes. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette

Fœmina à *mare* differt parte capitis anteriore papillis carnosis nequaquam obsitâ, & pennis collum inferius vestientibus pennarum collum superius obtegentium longitudinem non excedentibus. Ab illo quoque coloribus discrepat. Caput, guttur, collum, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albi sunt coloris. Partem dorsi supremam vestiunt pennæ, quarum aliæ sunt candidæ, aliæ fuscæ, quibusdam ex fuscis rufescente marginatis. Ex scapularibus quoque aliæ albicant, aliæ fuscescunt; & quædam ex fuscis rufescente fimbriantur. Dorsum infimum & uropygium obtegunt pennæ fuscæ, marginibus rufescentibus præditæ. Ex superioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum tenent, fuscæ sunt; quæ ad latera collocantur, candidæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, pennis constant aliis albis, aliis fuscis: majores à corpore remotiores omnes fuscescunt. Remiges alarum majores sunt eodem fusco imbutæ : mi-

nores griseo-fuscæ, albo fimbriatæ; ex istis tamen excipiendæ sunt binæ corpori viciniores penitùs candidæ, & duæ proximè sequentes fuscæ, oris exterioribus rufescentibus prædita. Caudæ rectrices rectricibus *maris* concolores. Rostrum rubrum, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque rubri; ungues verò nigri. *Ex museo Realmuriano.*

Aves istæ multùm colore variant: raró occurrunt binæ perfectè inter se similes. Plures in *museo Realmuriano* servabantur, mares scilicet & fœminæ, quarum descriptiones hîc subjacent.

Una, quæ *mas*, cujusque descriptionem & iconem dedit *Albinus*, sic coloribus imbuitur. Caput anterius & guttur albicant. Capitis posterior pars & colli superior rufi sunt coloris. Partem colli inferiorem vestiunt pennæ longæ, nigro-violaceæ. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ rufo & fusco variegantur, majusculis maculis nigro-violaceis admix-

derniere couleur: les moyennes sont d'un gris-brun, & bordées de blanc; il faut cependant en excepter les deux plus proches du corps, qui sont entiérement blanches, & les deux qui les suivent immédiatement, qui sont brunes & bordées extérieurement de roussâtre. Les plumes de la queue sont de la même couleur que celles de la queue du *mâle*. Le bec est rouge, excepté son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges; & les ongles noirs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Ces Oiseaux varient beaucoup en couleur: il est difficile d'en trouver deux qui se ressemblent parfaitement. *M. de Reaumur* en conservoit dans son *cabinet* plusieurs mâles & femelles, dont voici les descriptions.

Un *mâle*, qui est celui qu'*Albin* a décrit & figuré, est ainsi coloré. La partie antérieure de la tête & la gorge sont blanchâtres. Le derriere de la tête & le dessus du col sont roux. La partie inférieure du col est couverte de longues plumes d'un noir violet. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont variées de roux & de brun, avec d'assez grandes taches d'un noir-violet. La par-

tie inférieure du dos & le croupion sont bruns. Les petites couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur : les grandes sont variées de brun & de roux, terminées par une grande tache de noir-violet, & bordées de roux par le bout ; cependant parmi ces couvertures, les latérales sont blanches & variées de noir. La poitrine, le haut du ventre & les côtés sont couverts de plumes noirâtres, bordées de noir-violet. Le bas-ventre est blanc, ainsi que les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles. Les couvertures du dessus des aîles sont brunes, excepté quelques-unes des plus grandes proche le corps, qui sont rousses, variées de petits points bruns, & terminées par une tache d'un noir-violet. Quelques-unes des plumes de l'aîle, sçavoir les plus proches du corps, sont colorées comme ces dernieres couvertures : toutes les autres, ainsi que les plumes de la queue, sont de la même couleur que dans le *mâle* que j'ai décrit ci-dessus. Le bec est rouge, excepté son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges ; & les ongles noirs.

tis. Dorsum infimum & uropygium fusca sunt. Superiores caudæ tectrices minores concolores : majores fusco & rufo variæ, majusculâ maculâ nigro-violaceâ terminatæ, & rufo in apice fimbriatæ ; ex istis tamen tectricibus, quæ ad latera positæ sunt, albent, nigroque variegantur. Pectus, ventrem supremum & latera obtegunt pennæ nigricantes, marginibus nigro-violaceis præditæ. Venter imus, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus cooperientes albicant. Tectrices alarum superiores sunt fuscæ ; ex illis tamen majores quædam corpori finitimæ rufæ, punctulis fuscis variegatæ, & maculâ nigro-violaceâ terminatæ. Ex remigibus quædam, corpori scilicet viciniores, novissimis istis tectricibus concolores : reliquæ omnes, sicut & caudæ rectrices, eodem imbuuntur colore ac in *mare* à me suprà descripto. Rostrum rubrum, excepto apice nigricante. Pars crurum plumis denudata, pedesque rubri ; ungues verò nigri.

Alia, quæ *mas*, quæque ab Aldrovando quarto loco delineatur, cum priori, cujus descriptionem dedi, convenit, cum sequentibus tamen differentiis. Pennæ longæ collum inferius obtegentes rufescunt. Dorsum multò magis variegat color niger, qui color nonnihil ad violaceum inclinat. In superioribus alarum tectricibus quædam extant maculæ nigricantes. Quatuor remiges corpori viciniores, sicut & binæ rectrices intermediæ, maculis transversis griseo-rufescentibus insigniuntur. Rostrum rubrum, attamen in extremitate nigricans. Pars crurum plumis denudatâ, pedesque rubri; ungues verò nigri.

Altera, quæ *mas*, priori à me descripto adhuc respondet, sequentibus differentiis exceptis. Partes capitis & colli superiores sunt rufæ. Pennæ longæ collum inferius vestientes candidæ. Pars dorsi suprema & scapulares pennæ multo variegantur rufo. Remiges quatuor corpori finitimæ & binæ rectrices intermediæ maculis transversis rufis notantur. Rostrum rubrum, exceptâ extremitate nigricante. Pars

Autre *mâle*, qui est le quatriéme d'*Aldrovande*. Il ressemble au premier que j'ai décrit, cependant avec ces différences. Les longues plumes de la partie inférieure du col sont roussâtres. Le dos est varié de beaucoup plus de noir, cette couleur tirant un peu sur le violet. Sur les couvertures du dessus des aîles sont quelques taches noirâtres. Les quatre plumes de l'aîle les plus proches du corps, ainsi que les deux plumes du milieu de la queue, sont marquées de taches transversales d'un gris-roussâtre. Le bec est rouge, excepté son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges; & les ongles noirs.

Autre *mâle*, qui ressemble encore au premier que j'ai décrit, avec ces différences. Les parties supérieures de la tête & du col sont rousses. Les longues plumes de la partie inférieure du col sont blanches. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont variées de beaucoup de roux. Les quatre plumes de l'aîle les plus proches du corps, & les deux plumes du milieu de la queue sont marquées de taches transversales rousses. Le bec est rouge, ex-

cepté son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges; & les ongles noirs.

Autre *femelle*. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous des aîles & les côtés sont blancs: le dessus de la tête est cependant varié d'un peu de brun; de plus le ventre, les côtés & le haut des jambes sont variés d'un fauve sur lequel sont de petites taches noirâtres. La partie supérieure du dos est couverte de plumes, les unes brunes, & les autres fauves, ces dernieres étant variées de taches noirâtres, dont les unes sont transversales & les autres irrégulieres. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes fauves, rayées transversalement de noir. Parmi les couvertures du dessus de la queue, celles qui occupent le milieu, sont variées de brun, de gris & de fauve, cette derniere couleur étant elle-même variée de taches noires; celles des côtés de la queue sont d'un blanc mêlé d'un peu de fauve: celles du dessous sont d'un fauve clair, & marquées chacune vers leur extrémité d'une petite ligne longitudinale bru-

crurum plumis denudata, pedesque rubri coloris; ungues verò nigri.

Altera, quæ *fœmina*. Caput, guttur, collum, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, alarumque tectrices inferiores candore nitent: caput tamen superius pauco variegatur fusco; venter insuper, latera & crurum pars suprema fulvo variegantur; qui color fulvus minutis maculis nigricantibus aspergitur. Dorsum supremum vestiunt pennæ aliæ fuscæ, alteræ fulvæ; quæ novissimæ maculis variegantur nigricantibus, aliis scilicet transversis, aliis irregularibus. Pennæ dorsum infimum & uropygium obtegentes sunt fulvæ, nigro transversim striatæ. Ex superioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum obtinent, sunt fusco, griseo & fulvo variegatæ, fulvo ipso colore maculis nigris vario: quæ ad caudæ latera positæ sunt, albicant, cum aliqua fulvi mixtura. Pennæ caudam subtus obtegentes dilutè fulvæ, lineolâ longitudinali fuscâ versùs ipsarum extremitatem insignitæ. Tec-

trices alarum superiores minores, sicut & majores corpori viciniores, pennis scapularibus concolores : majores à corpore remotiores penitùs fuscæ. Remiges majores pariter fuscescunt : minores sunt griseæ, fusco in latere interiore, fulvo & nigricante in exteriore variæ, & exteriùs insuper fulvo fimbriatæ : ex remigibus autem corpori vicinioribus, quæ majorem obtinet longitudinem, ab exortu ad apicem fulva est & nigricante maculata. Caudæ rectrices eodem imbuuntur colore ac rectrices prioris *maris* à me descripti ipsæ tinguntur, cum aliqua tamen differentia; tres enim utrinque extimæ nigricante in latere exteriore maculantur. Rostrum rubrum, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque similis rubri sunt coloris ; ungues verò nigri.

Præter suprà dictas, *Aldrovandus* sex alias descripsit & delineavit, *mares* scilicet quinque & *fæminam* unam.

Prioris, quæ *mas*, caput, pars colli superior, dorsum, venter supremus & crurum pars suprema ex rufescente

ne. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les plumes scapulaires : les grandes les plus éloignées du corps sont entiérement brunes. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur : les moyennes sont grises, variées intérieurement de brun, extérieurement de fauve & de noirâtre, & bordées aussi extérieurement de fauve : de plus parmi les plus proches du corps la plus longue est entiérement fauve & tachetée de noirâtre. Les plumes de la queue sont de la même couleur que celles de la queue du premier *mâle* que j'ai décrit, avec cette différence cependant que les trois plus extérieures de chaque côté sont tachées de noirâtre sur leur côté extérieur. Le bec est rouge, excepté son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont pareillement rouges; & les ongles noirs.

Outre ceux-ci, *Aldrovande* en a encore décrit & figuré six autres, sçavoir cinq *mâles* & une *femelle*.

Le premier qui est un *mâle*, a la tête, la partie supérieure du col, le dos, le haut du ventre & le haut des jambes d'un

roussâtre tirant sur le marron, & varié de taches transversales noires. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le bas-ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanchâtre tirant sur le cendré, & varié de taches noires oblongues, & tendant vers le bas. Les couvertures du dessus des aîles & les plumes de l'aîle sont d'un roussâtre tirant sur le marron, & varié de même de taches noires, qui sont rondes sur les couvertures, & transversales sur les plumes de l'aîle. La tête est ornée d'une espece de hupe. Le bec est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont jaunes; & les ongles noirs.

Le second, qui est encore un *mâle*, est hupé, comme le précédent. Le synciput & l'occiput sont blancs, ainsi que les longues plumes de la partie inférieure du col. Sous la gorge est une tache noirâtre. Le ventre est de cette derniere couleur. Tout le reste de son corps est d'un blanc sale ou rembruni. Le bec est noir, excepté à son origine, où il est blanc. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns.

Le troisiéme, qui est une *femelle*, est presque par tout le

ad castaneum vergunt; & maculis transversis nigris variegantur. Guttur, collum inferius, pectus, venter imus & inferiores caudæ tectrices ex candicante ad cinereum inclinant, & maculis variegantur nigris, oblongis, deorsum tendentibus. Superiores alarum tectrices, sicut & remiges, sunt ex rufescente ad castaneum vergentes, maculis pariter variegatæ nigris, supra tectrices rotundis, supra remiges verò transversis. Caput quodammodo cristâ ornatur. Rostrum nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedesque lutei; ungues verò nigri.

Secunda, quæ quidem *mas*, cristam gestat, ut præcedens. Synciput & occiput, longæque pennæ collum inferius obtegentes albicant. Sub gutture macula extat nigricans. Venter similiter nigricat. Totum reliquum corpus sordidè albet aut ex albo fuscescit. Rostrum nigrum, attamen in exortu candidum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusci.

Tertio loco depicta, quæ *fœmina*, in universo ferè

corpore est rufa, maculis nigris lunulatis aspersa, attamen in capitis vertice immaculata. Crurum suprema pars & venter imus ad castaneum inclinant. Remiges alarum majores sunt nigræ, colore croceo fimbriatæ & terminatæ. Oculorum irides simili croceo imbutæ; ipsorum verò pupilla nigra.

Quinta, quæ *mas*, coloribus multùm convenit cum *mari* tertio à me descripto, quique quarto loco ab *Aldrovando* delineatur; ab illo tamen discrepat in eo quod longæ pennæ collum inferius vestientes sint candidæ, nigro terminatæ.

Sexta, quæ pariter *mas* est, præcedentis instar, in collo inferiore longis donatur pennis candidis, nigrò terminatis; sed ab illo discrepat coloribus quibus reliquum corpus imbuitur. Caput ex cinereo-flavicat; attamen in vertice pennis vestitur nigris. Guttur candidum. Totum reliquum corpus fuscum, exceptis tamen crurum parte supremâ, caudâque ex rufo ad castaneum vergentibus. Oculorum irides croceo colore imbutæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata,

corps d'un roux parsemé de taches noires, en forme de croissant; excepté sur le sommet de la tête, qui est sans taches. Le haut des jambes & le bas-ventre tirent sur le marron. Les grandes plumes de l'aîle sont noires, bordées & terminées de couleur de safran. L'iris des yeux est de cette derniere couleur; leur prunelle est noire.

Le cinquiéme qui est un *mâle*, ressemble beaucoup par ses couleurs au troisiéme *mâle* que j'ai décrit, & qui est le quatriéme d'*Aldrovande*; il en différe cependant en ce que les longues plumes du dessous de son col sont blanches & terminées de noir.

Le sixiéme qui est pareillement un *mâle*, a comme le précédent, les longues plumes du dessous du col blanches & terminées de noir; mais il en différe par les couleurs du reste de son corps. Sa tête est d'un cendré-jaunâtre, excepté son sommet, qui est couvert de plumes noires. Sa gorge est blanche. Tout le reste de son corps est brun, si l'on en excepte le haut des jambes & la queue, qui sont d'un roux tirant sur le marron. L'iris des yeux est de couleur de safran. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les

pieds & les ongles ſont bruns.

Le ſeptiéme enfin qui eſt encore un *mâle*, a la tête jaune. Tout le reſte de ſon corps eſt couvert de plumes dont les unes ſont vertes, d'autres ſont blanches, d'autres rouges, d'autres d'un violet d'Amethyſte, & d'autres jaunes : & ce qu'il y a de ſingulier, c'eſt qu'aucune de ces plumes n'eſt mêlée de deux couleurs. La partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont jaunes.

On les trouve aux bords de la mer.

pedes, unguesque fuſci.

Septima tandem, quæ ſimiliter *mas*, caput habet luteum. In toto reliquo corpore pennis veſtitur aliis viridibus, aliis candidis, aliis rubris, aliis violaceo-Amethyſtinis, aliis luteis : quodque maximè ſingulare, nulla penna binis coloribus immiſcetur. Pars crurum plumis denudata, pedeſque lutei ſunt.

Juxta maris littora verſantur.

** 19. LE MERLE-D'EAU.

Tringa ſuperne fuſco-nigricans ; genis, gutture, collo inferiore & pectore niveis ; ventre ſupremo fuſco-rufeſcente ; imo ventre, rectricibuſque nigricantibus . . . . MERULA AQUATICA.

Trynga. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°. IX.*
Charlet. Onomazt. pag. 108. *N°. IX.*
Merula aquatica. *Geſn. Avi. pag.* 608. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 609.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 302.
Jonſt. Avi. pag. 112. *hujus icon à Geſnero mutuata Tab.* 53.
Willugh. Ornith. pag. 104. *hujus icon minùs accurata Tab. XXIV.*
Raj. Syn. Avi. pag. 66. *N°. A.* 7.
Charlet. Exer. pag. 113. *N°. XII.*
Charlet. Onomazt. pag. 108 *N°. XII.*
Linn. Syſth. Nat. ed. 6. Gen 82. *ſp.* 3.
Merula aquatica, vel rivalis. *Geſn. icon. Avi. pag.* 123, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Merula aquatica Ornithologi. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 485. *hujus icon minùs accurata pag.* 486.
Turdus aquaticus. *Geſn. Avi. pag.* 501.
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 487.

Klein. Avi. pag. 68. *N°.* 18.

An Gallinulæ aquaticæ ſpecies ? *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 559, *in qua hujus icon minùs accurata.*

Cornix aquatica. *Geſn. Avi. pag.* 333.

Sturnus niger, pectore albo. Cinclus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 94. *ſp.* 4.

Motacilla pectore albo, corpore nigro. *Faun. Suec. Linn. N°.* 216.

Merle d'eau. *Alb. Tom. II. pag.* 26 ; *avec une figure mal coloriée Pl.* 39.

Les Grecs l'appellent Κόσσυφος ἔνυδρος. *Schwenck.*

Les Italiens aux environs de Belinzone, LERLICHIROLLO. *Geſn. Aldrov.*

Les Italiens aux environs du Lac Majeur, FOLOT *ou* FALUNT D'ACQUA. *Geſn. Aldrov.*

Les Allemands WASSER-AMSEL. *Geſn. Aldrov. Schwenck. Willugh.* BACH-AMSEL. *Geſn. Aldrov. Schwenck. Jonſt.* SEE-AMSEL. *Schwenck.*

Les Suiſſes, WASSER-TROSTLE. *Geſn.*

Les Suédois, WATN-STARE. *Linn.*

Les Anglois, WATER-OUZEL. *Willugh. Raj.* WATER-CRAKE. *Raj.*

Merulæ vulgari paululùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam ſeptem pollices & ſex lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque decem lineas longum eſt; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata quatuor lineas; pes unum pollicem & ſeptem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas, extimus octo cum ſemi lineas, intimus ſeptem lineas ; & poſticus quatuor lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ferè ad primum uſque articulum ex-

Il n'eſt pas tout-à-fait ſi gros qu'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de ſept pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long ; ſa queue deux pouces trois lignes ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quatre lignes ; ſon pied un pouce ſept lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes, l'extérieur huit lignes & demie, l'intérieur ſept lignes ; & celui de derriere quatre lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend preſque

jusqu'à la premiere articulation. Il a onze pouces neuf lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un brun foncé. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun-noirâtre. Les côtés de la tête au-dessous des yeux ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un blanc de neige. Le haut du ventre est d'un brun tirant sur le roux. Le bas-ventre, les couvertures du dessous de la queue, le haut des jambes & les côtés sont noirâtres. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un brun foncé. L'aîle est composée de dix-huit plumes d'un brun-noirâtre. Les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noirâtres, à peu près d'égale longueur. Les paupieres sont blanches. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les on-

tensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est undecim pollicum & novem linearum ; alæ verò complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem pertingunt. Partes capitis & colli superiores tingit color fuscus saturatus. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, & superiores caudæ tectrices ex fusco nigricant. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genæ, guttur, pars colli inferior & pectus niveo candore nitent. Venter supremus ex fusco ad rufum inclinat. Venter imus, inferiores caudæ tectrices, crurum suprema pars & latera nigricant. Pennæ alas subtus obtegentes sunt saturatè fuscæ. Alam componunt octodecim remiges fusco-nigricantes. Corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim constat rectricibus, nigricantibus, æqualem circiter longitudinem obtinentibus. Palpebræ sunt candidæ. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri.

Juxta fluviorum ripas versatur, ibique *Pisciculis* & *Insectis aquaticis* victitat. Sub aquis quandoque mergit. Solitaria est, & pariendi tantùm tempore cum fœmina volat. *Ex muséo Realmuriano.*

gles sont noirs. On le trouve sur le bord des rivieres, où il se nourrit de petits *Poissons* & d'*Insectes aquatiques.* Il plonge quelquefois sous l'eau. Il est solitaire, & ne s'associe qu'avec sa femelle, & cela dans le temps de l'amour. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

20. La Grive-d'eau.

Tringa superne rufescente-olivacea, infernè alba, superne & infernè maculis nigricantibus varia; tæniâ supra oculos candidâ; fasciâ duplici in alis transversâ albâ; rectricibus binis intermediis rufescente-olivaceis, tæniâ transversâ fuscâ in apice notatis, lateralibus albis, nigricante transversim striatis . . . . Turdus aquaticus.

Tringa tacheté. *Edwards. Glanur. Part. II. pag.* 139. *Chap. LXVII*; *avec une figure exacte Pl.* 277. (*fig. inférieure*).
Les Anglois l'appellent Spotted Tringa. *Edwards.*

Cum *Turdo minori* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem septem pollices & novem circiter lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem & decem lineas; pars crurum plumis denudata quatuor lineas; pes undecim cum semi lineas; trium

Elle est à peu près de la grosseur de la *petite Grive.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ sept pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long; sa queue un pouce dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre lignes; son pied onze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts anté-

rieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes & demie, l'extérieur huit lignes, l'intérieur sept lignes; & celui de derriere trois lignes & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, le dessus du col & le dos sont couverts de plumes d'un roussâtre tirant sur l'olivâtre, marquées chacune dans leur milieu d'une tache noirâtre : ces taches sont fort petites sur la tête, & vont ensuite en augmentant de grandeur jusque sur le dos, où sont les plus grandes. Les plumes scapulaires sont aussi d'un roussâtre tirant sur l'olivâtre, & variées de taches transversales noirâtres. Celles qui couvrent le croupion, ainsi que les couvertures du dessus de la queue, sont du même roussâtre & sans taches. De chaque côté de la tête est une petite bande blanche, qui s'étend au-dessus des yeux. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont

digitorum anticorum medius cum ungue novem cum semi lineas, extimus octo lineas, intimus septem lineas; posticus autem tres tantùm cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput, partem colli superiorem, dorsumque vestiunt pennæ ex rufescente ad olivaceum inclinantes, maculâ nigricante in medio insignitæ : quæ maculæ in capite valdè sunt exiguæ, deinde versùs dorsum procedendo, sensim atque sensim majorem obtinent magnitudinem, & in dorso majores fiunt. Scapulares pennæ ex rufescente quoque ad olivaceum vergunt, maculisque transversis nigricantibus variegantur. Quæ uropygium obtegunt, sicut & superiores caudæ tectrices, sunt eodem rufescente tinctæ & immaculatæ. In utroque capitis latere exigua extat tænia candida, supra oculos protensa. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars,

pars, inferiorefque caudæ tectrices albent, & maculis nigricantibus variegantur : quæ maculæ in pectore majores funt quàm in aliis prædictis partibus, & paululùm cordatim emarginatæ. Pennæ alas fubtus cooperientes albæ, tæniâ transversâ nigricante notatæ. Alarum margines albicant. Superiores alarum tectrices minores funt ex rufefcente ad olivaceum vergentes, maculis tranfverfis nigricantibus variæ : majores corpori finitimæ concolores, fed albo terminatæ : majores à corpore remotiores nigricantes, albo in apice fimbriatæ. Remiges majores nigricant; ex iftis autem intimæ albo in apice marginantur : mediæ funt nigricantes, albo terminatæ; quæ albedo cum tectricum albore in utraque ala duplicem tæniam tranfverfam concolorem efficit : attamen excipiendæ funt tres quatuorve remiges corpori viciniores ex rufefcente ad olivaceum inclinantes, in utroque latere tæniis obliquis nigricantibus infignitæ. Quæ noviffimè dictæ remiges longæ funt & in acumen definentes, & dum ala complicatur, majorum re-

blancs, & variées de taches noirâtres : ces taches font plus grandes fur la poitrine que partout ailleurs, & font un peu taillées en cœur. Les couvertures du deffous des aîles font blanches, & marquées d'une bande tranfverfale noirâtre. Le bord de l'aîle eft blanc. Les petites couvertures du deffus des aîles font d'un rouffâtre tirant fur l'olivâtre, & variées de taches tranfverfales noirâtres : les grandes les plus proches du corps font de la même couleur, mais elles font terminées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps font noirâtres, & bordées de blanc par le bout. Les grandes plumes de l'aîle font noirâtres, & de celles-là les plus intérieures font bordées de blanc par le bout : les moyennes font noirâtres & terminées de blanc; ce qui avec le blanc des couvertures forme fur chaque aîle deux bandes tranfverfales de cette couleur : il faut cependant excepter les trois ou quatre plumes de l'aîle les plus proches du corps, qui font d'un rouffâtre tirant fur l'olivâtre, & marquées des deux côtés de rayes obliques noirâtres. Ces dernieres plumes font longues & pointues, & s'étendent, lorfque l'aîle eft

pliée, auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont d'un rouſſâtre tirant ſur l'olivâtre, & marquées vers leur extrémité d'une bande tranſverſale brune : les latérales ſont blanches, & rayées tranſverſalement de noirâtre. Les deux plumes du milieu de la queue ſont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés juſqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui eſt la plus courte. Le bec eſt de couleur de chair depuis ſon origine juſque vers les deux tiers de ſa longueur, & de là juſqu'à ſon extrémité il eſt brun. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un couleur de chair obſcur ; & les ongles noirs. On la trouve dans la partie Septentrionale de l'*Europe* & de l'*Amérique*.

migum extremitates pertingunt. Duodecim rectricibus cauda conſtat : binæ intermediæ rufeſcente-olivaceæ, tæniâ tranſversâ fuſcâ versùs apicem notatæ : laterales albæ, nigricante tranſverſim ſtriatæ. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam uſque breviorem. Roſtrum ab ipſius exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes uſque carneo colore imbutum, inde ad extremitatem fuſcum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque obſcurè carneo colore tincti ; ungues verò nigri. Habitat in *Europæ* & *Americæ* Septentrionali regione.

21. Le Canut.

Tringa ſuperne cinereo-fuſca, marginibus pennarum dilutioribus, infernè alba, maculis nigricantibus varia ; tæniâ ſupra oculos candidâ ; faſciâ in alis tranſversâ albâ ; uropygio albo & cinereo-fuſco lunulatim variegato ; rectricibus decem intermediis cinereo-fuſcis, utrinque extimâ candidâ . . . . Canutus.

Tringa cinerea, remigibus ſecundariis baſi totaliter albis, rectricibus quatuor mediis immaculatis. *Faun. Suec. Linn. N°.* 150.

Tringa roſtro lævi, pedibus cineraſcentibus, remigibus primoribus ſerratis. Canutus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *ſp.* 10.

Chalidris cinerea. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°.* 1.
Calidris cinerea. *Charlet. Onomazt. pag.* 107. *N°.* 1.
Canuti Avis. *Linn. Systh. Nat. ed.* 6. *Gen.* 60. *sp.* 6.
Canuti Avis, id est, Knot Lincolniensibus. *Raj. Syn. Avi. pag.* 108. *N°. A.* 5.
Knot agri Lincolniensis. *Willugh. Ornith. pag.* 224. *hujus icon minimè accurata Tab. LVI, sub titulo*, Callydris nigra.
Canut. *Edwards. Glanur. Part. II. pag.* 137. *Chap. LXVI; avec une figure exacte Pl.* 276.
Les Anglois, & sur-tout ceux qui habitent la Province de Lincoln, l'appellent Knot. *Willugh. Raj. Charlet.*

Calidrim cineream crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues decem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata sex cum semi lineas; pes duodecim cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas; posticus autem binas tantùm cum semi lineas. Digiti omnes sunt ad exortum usque à se invicem discreti. Alæ complicatæ ad extremitatem caudæ ferè pertingunt. Partes capitis & colli superiores, sicut & dorsi supremam, vestiunt pennæ cinereo-fuscæ, colore nonnihil dilu-

Il est à peu près de la grosseur de la *Maubéche grise.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long; sa queue deux pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes & demie; son pied douze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur neuf lignes, l'intérieur huit lignes; & celui de derriere deux lignes & demie seulement. Tous les doigts sont séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos sont couvertes de plumes d'un cendré-brun, bordées

d'une couleur un peu plus claire. Les plumes ſcapulaires ſont de la même couleur. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, ainſi que les couvertures du deſſus de la queue, ſont variées de blanc & de cendré-brun par taches tranſverſales, & qui ont la forme d'un croiſſant. De chaque côté de la tête eſt une bande blanche, qui part d'auprès de l'origine du bec, & s'étend par-deſſus les yeux : au-deſſous de celle-là en eſt une autre d'un brun foncé, qui part de même d'auprès de l'origine du bec, & s'étend juſqu'à l'œil. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine ſont blanches, & variées de petites taches brunes. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont du même blanc, & marqués de taches tranſverſales noirâtres. Les couvertures du deſſous des aîles ſont blanches & ſans taches. Les petites du deſſus, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont de la même couleur que les plumes du dos ; mais les grandes ſont terminées de blanc ; ce qui forme ſur chaque aile une bande tranſverſale de cette couleur : les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres, & bordées

tiore marginatæ. Scapulares concolores. Quæ dorſi partem infimam & uropygium obtegunt, ſuperioreſque caudæ tectrices albo & cinereo-fuſco variegatæ, duobus iſtis coloribus maculas tranſverſas lunulatas efficientibus. In utroque capitis latere tænia extat candida, prope roſtri exortum orta, & ſupra oculos protenſa : infra quam tæniam altera adeſt faſcia ſaturatè fuſca, prope roſtri exortum pariter orta, & ad oculum uſque producta. Guttur, collum inferius & pectus albicant, eaque variegant minutæ maculæ fuſcæ. Venter, latera, crurum ſuprema pars & tectrices caudæ inferiores eodem albore nitent, & maculis tranſverſis nigricantibus variegantur. Pennæ alas ſubtus obtegentes albæ ſunt & immaculatæ. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, pennis dorſum veſtientibus concolores ; majores verò albo terminantur ; quæ albedo in utraque ala tæniam tranſverſam concolorem efficit : majores à corpore remotiores nigricantes, albo in apice fimbriatæ. Remiges quatuor pri-



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Beccaßeau ou Cul-blanc.   2. Guignette.



Dessiné et Gravé par Martinet

1. Chevalier. 2. Chevalier cendré.



1. Chevalier rayé.

2. Chevalier tacheté.

Dessiné et Gravé par Martinet

1. Alouette-de-mer.

2. Alouette-de-mer à collier.

Dessinée et Gravée par Martinet.

1. Maubêche. 2. Petite Maubêche grise.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Maubêche tachetée. 2. Maubêche grise.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Combattant ou Paon-de-m



Dessiné et Gravé par Martinet

1 Barge grise. 2. Barge brune.

mores nigricant, & scapo donantur candido : quinque proximè sequentes, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, sunt nigricantes, exteriùs albo marginatæ : quatuor quæ sequuntur, à decima scilicet ad decimam tertiam usque inclusivè, cinereo-fuscæ, albo in apice tantùm marginatæ : reliquæ omnes similiter cinereo-fuscæ, sed griseo fimbriatæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus, quarum decem intermediæ sunt cinereo-fuscæ : utrinque extima candida. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum saturatissimo fusco imbutum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusco-viridescentes. Facilè pinguescit hæc Avis, & in cibis est delicatissima. Habitat in *Angliæ* Septentrionalibus Provinciis.

de blanc par le bout. Les quatre premieres plumes de l'aîle sont noirâtres, & ont leur tige blanche : les cinq suivantes, sçavoir depuis la cinquiéme jusqu'à la neuviéme inclusivement, sont noirâtres, & bordées extérieurement de blanc : les quatre qui suivent, sçavoir depuis la dixiéme jusqu'à la treiziéme inclusivement, sont d'un cendré-brun, & bordées de blanc seulement par le bout : toutes les autres sont pareillement d'un cendré-brun, mais elles sont bordées de gris. La queue est composée de douze plumes : les dix du milieu sont d'un cendré-brun : & la plus extérieure de chaque côté est blanche. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est d'un cendré très-foncé. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un brun-verdâtre. Cet Oiseau s'engraisse aisément, & est très-bon à manger. On le trouve dans les Provinces Septentrionales d'*Angleterre*.

LXXVI.

Genus Limosæ.

Hujus character est

Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus :

LXXVI.

Le genre de la Barge.

Son caractere est d'avoir

Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere :

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:

Le bec menu, très-long, plutôt recourbé en en-haut que droit, & dont le bout est obtus & lisse.

Crura in parte inferiore plumis denudata:

Rostrum gracile, longissimum, subrectum, sursum modicè tendens; ipsius apice obtuso & levi.

** 1. La Barge.

Limosa superne griseo-fusca, pennis nigricantibus, ad margines maculis rufis variegatis, interfertis, infernè alba; gutture albo-rufescente; collo griseo & rufescente vario, lineolis longitudinalibus fuscis in ima parte notato; pectore griseo-candicante, tæniis transversis fuscis variegato; uropygio fusco; rectricibus in exortu albis, in extremitate nigris, octo intermediis apice griseis, tribus utrinque lateralibus albo in apice marginatis . . . . Limosa.

Numenius uropygio albo; rectricibus nigris basi albis; remigibus transversâ albâ maculâ, exceptis quatuor primis. *Faun. Suec. Linn. N°.* 144.

Numenius medius. *Linn. Systh. Nat. ed.* 6. *Gen.* 59. *sp.* 3.

Scolopax rostro recto lævi, pedibus fuscis, remigibus maculâ albâ: quatuor primis immaculatis. Limosa. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 10.

Scolopax, Rusticola Aldrovandi. *Klein. Avi. pag.* 100. *N°.* 5.

An Elaphis? *Gesn. Avi. pag.* 383.

Totanus cinereus, rostro prælongo. *Barr Ornith. Class. IV. Gen. IV. sp.* 1.

Totanus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 431. *hujus icon non satis accurata pag.* 430.

Jonst. Avi. pag. 108. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 52.

Moehr. Avi. Gen. 88.

Fedoa secunda, quæ eadem esse videtur cum Totano Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 216. *hujus icon non satis accurata Tab. LIII, sub titulo,* Fedoa altera; *& insuper altera icon ab Aldrovando mutuata eâdem Tab. sub titulo,* Totanus.

Fedoa nostra secunda, seu Totanus Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 105. *N°. A.* 5.

Gallinago cinerea major. *Marsil. Danub. Tom. V. Mas pag.* 30; *cum hujus icone non satis accurata Tab.* 13, *& fœmina pag.* 32; *cum hujus icone non satis accurata Tab.* 14.

Barge Gallorum. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 434. *hujus icon pessima pag.* 436.

Barge Gallorum, quam Ægocephalum facit Bellonius. *Jonst. Avi. pag.* 106.

Charlet. Exer. pag. 111. *N°. X.*

Charlet. Onomazt. pag. 104. *N°. X.*

Barge. *Bel. Hist. nat. des Oiſ. pag.* 205 ; *avec une mauvaiſe figure pag.* 206.

. *Bel. Portr. d'Oiſ. pag.* 48 *a*, *dans laquelle eſt la même figure.*

Les Grecs l'appellent Αἰγοκέφαλος. *Bel. Aldrov.*

Les Catalans, BEC-LLÂRG. *Barr.*

Les Italiens, CHARLOT. *Geſn. Aldrov.*

Les Vénitiens, VETOLA. *Willugh.*

Les Payſans Boulonnois, PIZZACCARA. *Aldrov.*

Les Anglois, GOAT-HEAD. *Charlet.* GODWIT *ou* STONE-PLOVER. *Raj.*

Craſſitie *Totanum* multùm antecellit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam quindecim pollices & ſex lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem & ſeptem pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tres pollices & ſex lineas longum eſt ; cauda duos pollices & quinque lineas ; pars crurum plumis denudata unum pollicem & novem lineas ; pes duos pollices cum quinque lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas, extimus ſexdecim lineas, intimus quindecim lineas ; poſticus autem quinque tantummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranulâ ad pri-

Elle eſt beaucoup plus groſſe que le *Chevalier*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de quinze pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles d'un pied ſept pouces. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces ſix lignes de long ; ſa queue deux pouces cinq lignes ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, un pouce neuf lignes ; ſon pied deux pouces cinq lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur ſeize lignes, l'intérieur quinze lignes ; & celui de derriere cinq lignes ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Elle a deux pieds de

vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La bâse du bec est entourée de petites plumes d'un blanc sale & roussâtre. La partie supérieure de la tête est couverte de petites plumes qui sont d'un brun foncé dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & rousses sur leurs bords. Les côtés de la tête, au-dessous des yeux, ou les joues sont roussâtres. La gorge est d'un blanc mêlé d'une très-légere teinte de roussâtre. Le col est varié de gris & de roussâtre, & marqué vers le bas de sa partie inférieure de petites lignes longitudinales brunes. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un gris-brun, le tout étant mêlé de quelques plumes noirâtres, variées sur leurs bords de grandes taches rousses. La partie inférieure du dos & le croupion sont bruns. Les couvertures du dessus de la queue sont blanches; les plus grandes cependant sont terminées de noirâtre. La poitrine est d'un gris-blanchâtre, varié de bandes transversales brunes. Le haut des côtés est d'un gris clair. Le bas des côtés, le ventre & le haut des jambes sont blancs. Les couvertures du des-

mum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad sex usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Basim rostri ambiunt plumulæ sordidè albo-rufescentes. Capitis superior pars plumulis vestitur in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem saturatè fuscis, ad margines rufis. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genæ rufescunt. Guttur abicat, & aliquid rufescentis admixtum habet. Collum griseo & rufescente varium, lineolis longitudinalibus fuscis versùs colli inferioris imam partem insignitum. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ sunt griseo-fuscæ, pennis quibusdam nigricantibus, ad margines majusculis maculis rufis variegatis, interfertis. Dorsum infimum & uropygium fusca sunt. Superiores caudæ tectrices candidæ; ex istis tamen majores nigricante terminantur. Pectus est griseo-candicans, tæniis transversis fuscis varium. Laterum suprema pars dilutè grisea. Laterum pars infima, venter & crurum pars suprema

ſuprema albicant. Tectrices caudæ inferiores concolores, maculis quibuſdam nigricantibus variæ. Pennæ alas ſubtus obtegentes pariter candidæ, exceptis tamen minimis, illis ſcilicet quæ ſecundùm alarum marginum longitudinem poſitæ ſunt, fuſcis, albo fimbriatis. Superiores alarum tectrices minimæ, illæ ſcilicet quæ alæ articulum carpo humano reſpondentem obtegunt, fuſcæ: mediæ, ſicut & majores corpori viciniores, griſeo-fuſcæ, majoribus inter noviſſimas iſtas albido marginatis: majores à corpore remotiores nigricantes, apicibus albis præditæ. Alam componunt viginti ſeptem remiges, quarum primores quatuor nigricantes, attamen ab ipſarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes uſque in latere interiore maximâ parte candidæ, & ſcapo versùs ipſarum extremitatem uſque albo præditæ: novem proximè ſequentes, à quinta ſcilicet ad decimam tertiam uſque incluſivè, ab ipſarum exortu mediam versùs longitudinem uſque albæ, à medietate ad apicem nigricantes: tres quæ proximè ſequun-

ſous de la queue ſont de la même couleur, & variées de quelques taches noirâtres. Celles du deſſous des aîles ſont pareillement blanches, ſi l'on en excepte les plus petites; ſçavoir celles qui ſont tout le long du bord de l'aîle, qui ſont brunes & bordées de blanc. Les plus petites couvertures du deſſus des aîles, ſçavoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, ſont brunes: les moyennes, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont d'un gris-brun, les plus grandes de ces dernieres étant bordées de blanchâtre: les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres, & terminées de blanc. L'aîle eſt composée de vingt-ſept plumes: les quatre premieres ſont noirâtres, & ont la plus grande partie de leur côté intérieur blanche, & cela depuis leur origine juſque vers les deux tiers de leur longueur; elles ont auſſi leur tige blanche juſque vers leur extrémité: les neuf ſuivantes, ſçavoir depuis la cinquiéme juſqu'à la treiziéme incluſivement, ſont blanches depuis leur origine juſque vers la moitié de leur longueur, & de-là juſqu'à leur extrémité elles ſont noirâtres: les trois qui ſuivent immédiatement ces dernieres,

sçavoir depuis la quatorziéme jusqu'à la seiziéme inclusivement, sont blanches depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur, le reste est d'un brun-noirâtre & bordé de blanc : la dix-septiéme & la dix-huitiéme sont blanches, excepté leur bout, qui est d'un brun-noirâtre, bordé & terminé de blanc : les trois suivantes, sçavoir depuis la dix-neuviéme jusqu'à la vingt-uniéme inclusivement, sont blanches, & marquées chacune d'une grande tache brune, placée à leur extrémité sur le côté intérieur : enfin les six plus proches du corps sont d'un gris brun. Ces six dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La premiere des plumes de l'aîle est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes blanches à leur origine, & noires vers leur extrémité : le blanc occupe d'autant plus d'espace, que la plume est plus extérieure ; de sorte que les deux du milieu n'ont que fort peu de blanc ; dans les autres plumes cette couleur s'étend de plus en plus loin, de façon que la plus extérieure de chaque côté est blanche jusque vers les trois

tur, à decima quarta scilicet ad decimam sextam usque inclusivè, ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque candidæ, in reliqua longitudine fusco-nigricantes, albo fimbriatæ : decima septima & decima octava albæ, excepto apice fusco-nigricante, albo marginato & terminato : tres sequentes, à decima nona scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, candidæ, majusculâ maculâ fuscâ, ad extremitatem in latere interiore positâ, notatæ : sex tandem corpori viciniores griseo-fuscæ. Sex istæ novissimæ longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Remix prima reliquarum omnium longitudinem superat. Cauda duodecim constat rectricibus in exortu albis, in extremitate nigris : albus autem color eò majus spatium occupat, quò rectrix exterior fit ; ita ut in binis intermediis non multùm fit alboris ; in aliis verò rectricibus albor magìs magìsque protenditur, ita ut utrinque extima versùs tres quartas longitudinis partes

usque sit candida : binæ intermediæ sunt insuper griseo terminatæ ; tres utrinque proximè sequentes apice dilutiùs griseo, albo marginato, præditæ. Binæ rectrices intermediæ lateralibus paululùm longitudine cedunt ; unde fit cauda nonnihil bifurca. Oculorum pupilla nigra : ipsorum irides candicantes. Rostrum ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque rubro-flavicans, in reliqua longitudine nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Juxta maris littora degit. *Ex museo Realmuriano.*

quarts de sa longueur : de plus les deux du milieu sont terminées de gris ; & les trois suivantes de chaque côté sont terminées d'un gris plus clair, lequel est bordé de blanc. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus courtes que les latérales, ce qui rend la queue un peu fourchue. La prunelle des yeux est noire : leur iris est blanchâtre. Le bec est d'un rouge-jaunâtre depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur, le reste est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. LA BARGE GRISE.

Voyez Pl. XXIII. Fig. 1.

Limosa superne griseo-fusca, maculis nigricantibus varia, infernè alba ; capite & collo superioribus fusco-nigricantibus, marginibus pennarum albidis ; collo inferiore & pectore lineis longitudinalibus fusco-nigricantibus variegatis ; tæniâ supra oculos & uropygio candidis ; rectricibus albis, fusco transversim striatis, lateralibus interiùs versùs exortum penitùs candidis . . . . LIMOSA GRISEA.

Totanus. *Gesn. Avi. pag.* 518, *in qua hujus icon non satis accurata.*

Totanus Ornithologi. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 429. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 557.

Gallinulæ maritimæ genus aliud, Venetis Totanus. *Gesn. icon. Avi. pag.* 115, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Glareola, Barker, Albini. *Klein. Avi. pag.* 102. *N°.* 12.
Crex. *Bell. Obs. pag.* 103.
Jonst. Avi. pag. 108.
Crex Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 428.
Willugh. Ornith. pag. 220.
Raj. Syn. Avi. pag. 106. *N°.* 10.
Charlet. Exer. pag. 111. *N°. III.*
Charlet. Onomazt. pag. 106. *N°. III.*
Oiseau nommé Crex. *Bel Hist. Nat. des Ois. pag.* 207.
Petit Corlieu ou Aboyeur des Anglois. *Alb. Tom. II. pag.* 45; *avec une figure mal coloriée Pl.* 71.
Les Vénitiens l'appellent TOTANO. *Gesn. Aldrov.*
Les Allemands, MEER-HOUN. *Gesn.*
Les Allemands qui habitent les côtes de la mer, POL-SCHNEP *ou* PFUL-SCHNEPFF. *Gesn.*
Les Anglois, BARKER. *Alb.*

Elle est à peu près de la grosseur du *Chevalier*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces trois lignes de long; sa queue deux pouces huit lignes; la partie de ses jambes, qui est dégarnie de plumes, un pouce cinq lignes; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce quatre lignes, l'extérieur quatorze lignes, l'intérieur douze lignes & demie; & celui de derriere trois lignes & demie

Cum *Totano* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices & decem lineas explet, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & tres lineas longum est; cauda duos pollices & octo lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum quinque lineis; pes duos pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quatuor lineas, extimus quatuordecim lineas, intimus duodecim cum

ſemi lineas ; poſticus autem tres tantùm cum ſemi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ, & ad digitum intimum rudimento membranæ adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt unius pedis octo pollicum & ſex linearum ; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Partes capitis & colli ſuperiores veſtiunt pennæ fuſco-nigricantes, in utroque latere albido marginatæ. Dorſi ſuprema pars eſt griſeo-fuſca, majuſculis maculis nigricantibus notata. Pennæ ſcapulares concolores, ſed in utroque latere albido marginatæ ; qui albidus color griſeo-fuſco quaſi dentatim admiſcetur. Guttur albicat. In utroque capitis latere tænia extat ſimiliter candida, prope roſtri exortum orta, & ſupra oculos producta. Partem colli inferiorem & pectus obtegunt pennæ albæ, lineâ fuſco-nigricante, ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem ductâ, notatæ. Venter, latera, crurum ſuprema pars, inferiores caudæ tectrices,

ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Elle a un pied huit pouces ſix lignes de vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Les parties ſupérieures de la tête & du col ſont couvertes de plumes d'un brun-noirâtre, bordées des deux côtés de blanchâtre. La partie ſupérieure du dos eſt d'un gris-brun, marqué d'aſſez grandes taches noirâtres. Les plumes ſcapulaires ſont de la même couleur, mais elles ſont bordées des deux côtés de blanchâtre, qui eſt comme dentelé & engrené dans le gris-brun. La gorge eſt blanche. De chaque côté de la tête eſt une bande de la même couleur, qui part d'auprès de l'origine du bec, & s'étend juſqu'au-deſſus des yeux. La partie inférieure du col & la poitrine ſont couvertes de plumes blanches, marquées chacune d'une ligne d'un brun-noirâtre, qui s'étend ſelon la longueur de leur tige. Le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue, la partie inférieure

du dos & le croupion sont blancs. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur, & rayées transversalement de brun. Celles du dessous des aîles sont pareillement blanches, & rayées de bandes brunes, placées obliquement sur chacun des côtés, & formant ensemble des angles, dont les sommets sont sur la tige de la plume. Le bord de l'aîle, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes brunes, bordées de blanc. Les plus petites couvertures du dessus des aîles sont brunes; & de celles-ci, celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, sont bordées de blanchâtre : les moyennes sont d'un gris-brun : les grandes les plus proches du corps sont de cette derniere couleur, bordées extérieurement de gris clair, & intérieurement de blanc, ces deux couleurs étant comme dentelées & engrenées dans le gris-brun : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres; & de celles-là, les plus intérieures sont bordées de blanc par le bout. L'aîle est composée de vingt-six plumes : les sept premieres sont d'un gris-blanc en-dessous, mais en-dessus elles sont noirâtres, ayant une grande

dorsum infimum & uropygium albent. Superiores caudæ tectrices concolores, sed fusco transversim striatæ. Pennæ alas subtus coope-rientes pariter candidæ, tæniis striatæ fuscis, in utroque latere obliquè positis, & simul efficientibus angulos, quorum apices scapis pennarum incumbunt. Margines alarum, infra articulum carpo humano respondentem, obtegunt plumulæ fuscæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minimæ fuscæ sunt; ex istis autem, quæ alæ articulum carpo humano respondentem cooperiunt, albido marginantur : mediæ sunt griseo-fuscæ : majores corpori finitimæ concolores, exteriùs griseo dilutiore, interiùs albo fimbriatæ, duobus istis coloribus griseo-fusco quasi dentatim immixtis : majores tandem à corpore remotiores nigricantes; ex istis verò intimæ albo in apice marginatæ. Alam componunt viginti sex remiges : septem primores sunt subtus cinereo-albæ, superne verò nigricantes, attamen in latere interiore maximâ parte griseæ, fusco nonnihil maculatæ; prioris insuper scapus

albicat: quatuordecim proximè sequentes, ab octava scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, griseo-fuscæ, albo exteriùs marginatæ, qui color albus griseo-fusco quasi dentatim immiscetur; quatuordecim istæ remiges sunt insuper in latere interiore maximâ parte candidæ, tæniis transversis & undatis griseo-fuscis striatæ: quinque corpori viciniores similiter griseo-fuscæ, griseo diluto fimbriatæ, qui novissimus color griseo-fusco quasi dentatim immiscetur; vigesima quarta & vigesima quinta sunt insuper in utroque latere versùs ipsarum margines tæniis transversis fusco-nigricantibus striatæ. Quinque remiges corpori finitimæ longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates pertingunt. Duodecim rectricibus albis cauda conflatur: binæ intermediæ sunt in utroque latere fusco transversim striatæ: laterales omnes similiter striatæ, sed tantùm in latere exteriore & paululùm insuper in latere interiore solummodo versùs extremitatem. Rostrum fuscum. Pars crurum

partie de leur côté intérieur grise & un peu tachetée de brun; de plus la tige de la premiere est blanche: les quatorze suivantes, sçavoir depuis la huitiéme jusqu'à la vingt-uniéme inclusivement, sont d'un gris-brun, bordées extérieurement d'un blanc qui est comme dentelé & engrené dans le gris-brun, & ayant de plus une grande partie de leur côté intérieur blanche, & rayée de bandes transversales & en zigzags d'un gris-brun; les cinq plus proches du corps sont de cette derniere couleur, & bordées de gris clair, lequel est comme dentelé & engrené dans le gris-brun; la vingt-quatriéme & la vingt-cinquiéme sont de plus rayées des deux côtés vers leurs bords de bandes transversales d'un brun-noirâtre. Les cinq plumes de l'aîle les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches: les deux du milieu sont des deux côtés rayées transversalement de brun: toutes les latérales sont rayées de même, mais seulement du côté extérieur & un peu vers le bout du côté intérieur. Le bec est brun. La

partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont gris; & les ongles noirâtres. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

plumis denudata, pedesque grisei; ungues verò nigricantes. Circa maris littora versatur. *Ex museo D. Aubry.*

** 3. La grande Barge grise.

Voyez Pl. XXIV. Fig. 2.

Limosa superne saturatè fusca, marginibus pennarum albidis, infernè alba; gutture albo-rufescente; collo albido, maculis longitudinalibus fuscis vario; uropygio fusco, marginibus pennarum candidis; rectricibus albis, nigricante transversim striatis . . . . Limosa grisea major.

Gallinulæ maritimæ genus, quod Venetis vulgò Limosam vocant. *Gesn. icon. Avi. pag.* 114, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Limosa. *Gesn. Avi. pag.* 519, *in qua eadem icon.*
Limosa Venetorum. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 434. *hujus icon pessima pag.* 435.
Jonst. Avi. pag. 106.
Charlet. Exer. pag. 110. *N°. IX.*
Charlet. Onomazt. pag. 104. *N°. IX.*
Glottis. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen.* 59. *sp.* 5.
Glottis; Lingulaca Gazæ. *Gesn. Avi. pag.* 520.
Glottis, seu Pluvialis major Aldrovandi. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 317. *N°. IX. hujus icon minimè accurata Tab.* 268.
Pluvialis major. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 535, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Pluvialis major Aldrovando. *Jonst. Avi. pag.* 114. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53.
Willugh. Ornith. pag. 220. *hujus icon minimè accurata Tab. LV, sub titulo*, Glottis, seu Pluvialis major Ald.
Raj. Syn. Avi. pag. 106. *N°. A.* 8.
Raj. Syn. Avi. pag. 190. *N°. 6.*
Charlet. Exer. pag. 114. *N°.* 3.
Charlet. Onomazt. pag. 109. *N°.* 3.
Pluvialis major Aldrovandi; Limosa Venetorum; Glottis Gesneri. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 415.

Pluvialis

Pluvialis major Aldrovando; Glottis Baltnero, Venetis Totano. *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 48. *hujus icon non satis accurata Tab.* 22.

Scolopax rostro recto basi inferiori rubro, pedibus virescentibus. Glottis. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 9.

Numenius pedibus virescentibus, urrhopygio albo, remigibus lineis albis fuscisque undulatis. *Faun. Suec. Linn. N°.* 142.

Femelle du Chevalier aux pieds rouges. *Alb. Tom. II. pag.* 43; *avec une figure peu exacte Pl.* 69.

Les Grecs l'appellent Γλωττὶς. *Gesn.*

Les Italiens aux environs du Lac Majeur, GIRARDEL. *Gesn. Aldrov. Jonst. Charlet.*

Les Vénitiens, LIMOSA. *Gesn. Aldrov. Willugh. Rzac.* TOTANO. *Willugh. Marsil.*

Les Boulonnois, PLUIERO. *Aldrov.*

Les Napolitains, LEVERSINA. *Gesn. Aldrov. Jonst. Charlet.*

Les Allemands, MEER-HOUN. *Gesn. Aldrov. Jonst.*

Les Suédois, GLUTT. *Linn.*

Les Anglois, GREEN LEGGED HORSEMAN. *Alb.*

Les Anglois de la Jamaïque, CURLEW. *Sloane. Raj.*

Limosæ vulgari nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues quindecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & lineas binas longum est; cauda duos pollices & quatuor lineas; pars crurum plumis denudata tredecim lineas; pes unum pollicem cum decem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim cum semi lineas, extimus tredecim lineas, intimus duodecim cum semi lineas; posticus autem quinque lineas. Trium

Elle n'est pas tout-à-fait si grosse que la *Barge ordinaire.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces deux lignes de long; sa queue deux pouces quatre lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, treize lignes; son pied un pouce dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes & demie; l'extérieur treize lignes, l'intérieur douze lignes & demie; & celui de derriere cinq lignes. Celui du milieu des trois doigts anté-

rieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Elle a deux pieds un pouce de vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à ſix lignes au-delà du bout de la queue. Les parties ſupérieures de la tête & du col ſont couvertes de plumes brunes dans leur milieu ſelon la longueur de leur tige, & blanchâtres ſur les côtés. Celles qui couvrent la partie ſupérieure du dos, ſont d'un brun foncé, bordées de blanchâtre. Les ſcapulaires ſont de la même couleur ; mais le blanchâtre eſt comme dentelé & engrené dans le brun. La partie inférieure du dos & le croupion ſont couverts de plumes brunes, marquées d'une large bordure blanche. Les couvertures du deſſus de la queue ſont de cette derniere couleur, & variées de grandes taches tranſverſales brunes. La gorge eſt d'un blanc très-légerement nuancé de rouſſâtre. Les côtés de la tête ou les joues ſont de la même couleur, mais chaque plume eſt marquée dans ſon milieu d'une petite tache longitudinale brune. Celles qui couvrent la partie inférieure du col, ſont blanchâtres, & marquées de même dans leur

digitorum anticorum medius digito intimo coadunatur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum duorum pedum & pollicis unius intervallo diſtant ; alæ verò complicatæ ad ſex uſque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli ſuperiores pennis veſtiuntur in medio ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem fuſcis, ad latera albidis. Quæ partem dorſi ſupremam obtegunt, ſunt ſaturatè fuſcæ, marginibus albidis præditæ. Scapulares concolores ; in illis tamen color albidus in fuſco quaſi dentatim includitur. Dorſum infimum & uropygium cooperiunt pennæ fuſcæ, latiuſculâ margine candidâ donatæ. Superiores caudæ tectrices candido quoque colore imbutæ, & majuſculis variegatæ maculis tranſverſis fuſcis. Guttur albicat, & rufeſcente paululùm adumbratur. Caput ad latera ſive genæ eodem imbuuntur colore ; quælibet tamen penna minutâ maculâ longitudinali fuſcâ in medio inſignitur. Quæ partem colli inferiorem veſtiunt, ſunt albi-

dæ, minutâ maculâ fuscâ, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, in medio similiter notatæ. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes penitùs albent; pennæ tamen laterum partem supremam cooperientes scapo fusco donantur. Alarum margines, infra articulum carpo humano respondentem, cooperiunt plumulæ fuscæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minores sunt fuscæ, cinereo-albo marginatæ: majores corpori viciniores fuscæ, latâ margine candidâ præditæ: majores à corpore remotiores nigricantes, pauco albido in apice fimbriatæ. Remiges majores in latere exteriore & extremitate nigricantes, in latere interiore versùs scapum cinereo-fuscæ, maculis candidis aspersæ, & versùs margines penitùs candidæ; scapo similiter candido præditæ sunt; omnes istæ remiges, quinque primoribus exceptis, sunt insuper albo marginatæ: minores sunt dilutè cinereo-fuscæ, maculis quibusdam albis variæ, albo insuper in

milieu d'une petite tache brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont entiérement blancs; cependant les plumes qui couvrent le haut des côtés, ont leur tige brune. Le bord de l'aîle, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes brunes, bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles sont brunes, & bordées de gris-blanc: les grandes les plus proches du corps sont brunes, & marquées d'une large bordure blanche: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées d'un peu de blanchâtre par le bout. Les grandes plumes de l'aîle sont noirâtres du côté extérieur & à leur bout; leur côté intérieur est, vers la tige, d'un cendré-brun parsemé de taches blanches, & vers les bords il est entiérement blanc; leur tige est de cette derniere couleur; toutes ces plumes, excepté les cinq premieres, sont de plus bordées de blanc: les moyennes sont d'un cendré-brun assez clair, variées de quelques taches blanches, & bordées de la même couleur dans

toute leur circonférence : il faut cependant en excepter les quatre plus proches du corps, qui depuis la moitié de leur longueur jusqu'à leur extrémité sont marquées de bandes transversales, les unes noirâtres, & les autres grises, & de quelques autres bandes blanchâtres, placées vers leur bout. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches, rayées transversalement de noirâtre. Le bec est brun à son origine; cette couleur devient de plus en plus foncée en approchant de son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un noir-verdâtre; & les ongles noirs. On la trouve sur les bords de la mer & des rivieres. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

tota circumferentia fimbriatæ : ex istis tamen excipiendæ sunt quatuor corpori viciniores ab ipsarum media longitudine ad extremitatem usque tæniis insignitæ transversis, aliis nigricantibus, aliis griseis, & quibusdam insuper alteris tæniis albidis, versùs ipsarum apicem positis. Quæ quatuor novissimè dictæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices albæ, nigricante transversim striatæ. Rostrum in exortu fusco imbuitur; qui color, versus apicem procedendo, sensim atque sensim fit saturatior; apex autem nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedesque nigro-viridescentes; ungues verò nigri. Juxta maris & fluviorum littora versatur. *Ex musæo D. de Bandeville.*

** 4. La Barge brune.

Voyez Pl. XXIII. Fig. 2.

Limosa superne fusco-nigricans, marginibus pennarum albidis, infernè saturatè cinerea, albo variegata; vertice cinereo-nigricante; uropygio candido; rectricibus binis intermediis

fusco-nigricantibus, candicante transversim striatis, lateralibus fuscis, albo transversim striatis..... LIMOSA FUSCA.

Crassitie *Limosam griseam* paululùm antecellit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudam extremam undecim pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & quatuor lineas longum est; cauda duos pollices & octo lineas; pars crurum plumis denudata octodecim cum semi lineas; pes duos pollices cum linea unica; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum quinque lineis, extimus quindecim lineas, intimus quatuordecim lineas; posticus autem tres solummodo cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum entensâ, & ad digitum intimum rudimento membranæ adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis septem pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ caudæ extremitatem attingunt. Ca-

Elle est un peu plus grosse que la *Barge grise*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces quatre lignes de long; sa queue deux pouces huit lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix-huit lignes & demie; son pied deux pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes, l'extérieur quinze lignes, l'intérieur quatorze lignes; & celui de derriere trois lignes & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Elle a un pied sept pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le dessus de la tête est d'un cendré-noirâtre. La partie supérieure du col est couverte de plumes

d'un brun foncé, bordées d'un peu de blanchâtre par le bout. Celles qui couvrent la partie ſupérieure du dos, ſont d'un brun-noirâtre, & bordées de blanchâtre. Les ſcapulaires ſupérieures ſont auſſi d'un brun-noirâtre, marquées ſur les deux bords de taches blanchâtres, & bordées de la même couleur par le bout: les inférieures ſont d'un gris-brun, marquées de même ſur les deux bords de taches blanchâtres. La partie inférieure du dos & le croupion ſont blancs. Les côtés de la tête au-deſſous des yeux ou les joues, la gorge & la partie inférieure du col ſont d'un cendré foncé. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés ſont du même cendré, lequel s'éclaircit de plus en plus en approchant du bas-ventre; le tout eſt mêlé çà & là de quelques plumes blanches; & celles du bas-ventre ſont bordées de blanc. Les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un brun foncé, rayées tranſverſalement de blanc. Celles du deſſous ſont blanches, & rayées tranſverſalement de brun. Le bord de l'aîle, au-deſſous du pli qui répond à celui du poignet, eſt couvert de petites plumes brunes, bordées de blanc. Les couvertures du deſſous des aîles

put ſuperius ex cinereo nigricat. Partem colli ſuperiorem veſtiunt pennæ ſaturatè fuſcæ, pauco albido in apice marginatæ. Quæ dorſi ſupremam partem obtegunt, ex fuſco nigricant, & albido marginantur. Scapulares ſuperiores ſunt quoque fuſco-nigricantes, maculis albidis in utraque margine inſignitæ, eodemque albido in apice fimbriatæ: inferiores griſeo-fuſcæ, maculis albidis in utraque margine ſimiliter notatæ. Dorſum infimum & uropygium albicant. Caput ad latera, idque infra oculos, ſive genæ, guttur & pars colli inferior ſaturatè cineraſcunt. Pectus, venter, latera, crurumque ſuprema pars eodem tinguntur cinereo; qui color, versùs imum ventrem procedendo, ſenſim atque ſenſim fit dilutior; omnes autem partes iſtas variegant albæ quædam pennæ; quæ verò infimum ventrem cooperiunt, albo fimbriantur. Tectrices caudæ ſuperiores ſunt ſaturatè fuſcæ, albo tranſverſim ſtriatæ. Pennæ caudam ſubtus obtegentes candidæ, tæniis tranſverſis fuſcis variæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano reſpondentem, coo-

periunt plumulæ fuscæ, albo fimbriatæ. Tectrices alarum inferiores candidæ. Superiores minimæ fuscæ : mediæ concolores, ad margines albo maculatæ : majores corpori finitimæ eodem fusco imbutæ, tæniis transversis saturatiùs fuscis in utroque latere notatæ, ad margines maculis albidis variegatæ, & albo in extremitate fimbriatæ : majores à corpore remotiores saturatè fuscæ ; ex istis autem binæ intimæ albo in apice marginantur. Alam componunt viginti quinque remiges, quarum decem primores sunt subtus cinereo-albæ ; superne verò sex primores saturatè fuscæ, attamen in latere interiore maximâ parte candicantes, griseo-fusco maculatæ ; prioris insuper scapus albicat : quatuor reliquæ, à septima scilicet ad decimam usque inclusivè, fusco dilutiore tinctæ, & in latere interiore maximâ parte similiter candicantes, griseo-fusco maculatæ ; ad exteriorem marginem maculis insuper albis notantur, & albo in apice marginantur : quatuor proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè, quatuor nu-

sont blanches. Les plus petites du dessus sont brunes : les moyennes sont de la même couleur, & tachetées de blanc sur les bords : les grandes les plus proches du corps sont pareillement brunes, marquées des deux côtés de bandes transversales d'un brun plus foncé, tachetées de blanchâtre sur les bords, & bordées de blanc par le bout : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé ; & de celles-là les deux plus intérieures sont bordées de blanc par le bout. L'aîle est composée de vingt-cinq plumes : les dix premieres sont d'un gris-blanc en-dessous ; mais en-dessus les six premieres sont d'un brun foncé, ayant une grande partie de leur côté intérieur blanchâtre, & tachetée de gris-brun ; de plus la tige de la premiere est blanche : les quatre autres, sçavoir depuis la septiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont d'un brun plus clair, & ont de même une grande partie de leur côté intérieur blanchâtre, & tachetée de gris-brun ; elles sont de plus tachetées de blanc sur le bord extérieur, & bordées de blanc par le bout : les quatre suivantes, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la quatorziéme inclusivement, sont de la même cou-

leur que les quatre dernieres, avec cette différence cependant que leur côté intérieur est rayé transversalement de brun & de blanc : les sept qui suivent immédiatement ces dernieres, sçavoir depuis la quinziéme jusqu'à la vingt-uniéme inclusivement, sont des deux côtés rayées transversalement de brun & de blanc : la vingt-deuxiéme est d'un gris-brun, & tachetée de blanchâtre sur ses bords : les trois plus proches du corps sont d'un brun-noirâtre, & tachetées de même de blanchâtre sur leurs bords. Les quatre plumes de l'aîle les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un brun-noirâtre, rayé transversalement de blanchâtre : les latérales sont brunes, & rayées transversalement de blanc. Le bec est noir, excepté l'origine du demi-bec inférieur, qui est blanchâtre. Le bout du bec est un peu courbé en en-bas. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

per descriptis concolores; ab illis tamen discrepantes in eo quod ad latus interius fusco & albo sint transversim striatæ : septem quæ novissimas istas proximè sequuntur, à decima quinta scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, sunt in utroque latere fusco & albo transversim striatæ : vigesima secunda griseo-fusca, maculis albidis ad margines variegata : tres corpori viciniores fusco-nigricantes, ad margines albido similiter maculatæ. Remiges quatuor corpori finitimæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates fermè pertingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ sunt fusco-nigricantes, candicante transversim striatæ : laterales fuscæ, albo transversim striatæ. Rostrum nigrum, excepto tamen mandibulæ inferioris exortu albido. Rostri autem extremitas paululùm deorsum incurvatur. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusci. Juxta maris littora degit. *Ex musæo D. Aubry.*

** 5. La

*** 5. La Barge rousse.

Voyez Pl. XXV. Fig. 1.

Limosa superne nigricans, marginibus pennarum rufescentibus, infernè ferruginea; tæniâ supra oculos rufescente; uropygio albo-rufescente, maculis longitudinalibus nigricantibus vario; rectricibus fuscis albo transversim striatis.... Limosa rufa.

Scolopax rostro subrecurvato, pedibusque nigris, pectore ferrugineo. Scolopax Lapponica. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 12.
Scolopax rostro recto flavescente, pedibus fuscis, corpore subtus fulvo fusco-undato. Hæmastica. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 14.
Totanus fulvus, maculis fuscis. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. IV. sp.* 2.
Recurvirostra pectore croceo. *Faun. Suec. Linn.* N°. 138.
Francolin à poitrine rouge. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXVIII; avec une figure assez exacte Pl.* 138.
Les Anglois l'appellent Red-breasted Godwit. *Edwards.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem tredecim pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues quatuordecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices cum linea una longum est; cauda tres pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes unum pollicem & decem cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas, extimus duodecim cum semi lineas, intimus unum pollicem; posti-

Elle est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces une ligne de long; sa queue trois pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes; son pied un pouce dix lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur douze lignes & demie, l'intérieur un pouce; & celui de derriere quatre lignes seulement. Celui du

milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a un pied onze pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos sont couvertes de plumes noirâtres, bordées de roussâtre. Les scapulaires sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une bande roussâtre, qui s'étend depuis l'origine du bec jusque vers l'occiput, en passant par-dessus les yeux. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes d'un blanc mêlé d'une légere teinte de roussâtre, & marquées chacune d'une tache noirâtre, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement de blanc-roussâtre & de brun. La gorge, la partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un beau ferrugineux. Le haut des jambes est de la même couleur, mais beaucoup plus claire. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches, & variées de taches brunes,

cus autem quatuor tantummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis undecim pollicum & quatuor linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Partes capitis & colli superiores, sicut & dorsi supremam, vestiunt pennæ nigricantes, marginibus rufescentibus præditæ. Scapulares concolores. In utroque capitis latere tænia extat rufescens, ab exortu rostri orta, supra oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Dorsum infimum & uropygium pennis vestiuntur albo-rufescentibus, maculâ nigricante, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatis. Superiores caudæ tectrices variegant tæniæ transversæ alternatim albo-rufescentes & fuscæ. Guttur, collum inferiùs & ad latera, pectus, venter, latera, inferiorésque caudæ tectrices eleganti ferrugineo colore imbuuntur. Crurum partem supremam tingit idem color, sed multò dilutior. Pennæ alas subtus

obtegentes sunt candidæ, easque variegant maculæ fuscæ, cujuslibet pennæ medium occupantes. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, fuscæ, albo fimbriatæ : majores à corpore remotiores, fusco-nigricantes ; ex istis autem intimæ sunt in apice albo marginatæ. Alam componunt viginti septem remiges : sex primores ex fusco nigricant, attamen ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque sunt in latere interiore maximâ parte dilutè griseæ, albido maculatæ ; scapo insuper albo-rufescente donantur : septima & octava remigibus nuper descriptis concolores, sed albo insuper in tota ipsarum circumferentia marginantur : quindecim proximè sequentes, à nona scilicet ad vigesimam tertiam usque inclusivè, sunt in latere exteriore griseo-fuscæ, in interiore griseæ, inque tota circumferentia albo fimbriatæ : quatuor corpori viciniores fusco-nigricantes, maculis rufescentibus ad margines variegatæ. Quæ quatuor novissimæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala com-

placées au milieu de chaque plume. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes & bordées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre ; & de celles-ci les plus intérieures sont bordées de blanc par le bout. L'aîle est composée de vingt-sept plumes : les six premieres sont d'un brun-noirâtre, ayant cependant depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur la plus grande partie de leur côté intérieur d'un gris clair, tacheté de blanchâtre, elles ont aussi leur tige d'un blanc-roussâtre : la septiéme & la huitiéme sont colorées comme ces dernieres, mais elles sont de plus bordées de blanc dans toute leur circonférence : les quinze suivantes, sçavoir depuis la neuviéme jusqu'à la vingt-troisiéme inclusivement, sont d'un gris-brun du côté extérieur, grises du côté intérieur, & bordées de blanc dans toute leur circonférence : les quatre plus proches du corps sont d'un brun-noirâtre, & variées sur leurs bords de taches roussâtres. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée,

un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes brunes, rayées transversalement d'un blanc qui en quelques endroits tire un peu sur le roussâtre. Le bec est d'un jaune-rougeâtre depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur, & de là jusqu'à son extrémité il est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont de cette derniere couleur; & les ongles noirs. On la trouve sur les bords de la mer *Du cabinet de M. Mauduyt.*

plicatur, nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Cauda duodecim constat rectricibus fuscis, albo transversim striatis; quæ albedo quibusdam in locis paululùm ad rufescentem inclinat colorem. Rostrum ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque ex luteo rubescit, à medietate ad apicem nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedesque similiter nigricantes, ungues verò nigri. Circa maris littora versatur. *Ex museo D. Mauduyt.*

6. La grande Barge rousse.

Limosa superne nigricans, marginibus pennarum rufescentibus, infernè sordidè alba, maculis transversis nigricantibus varia; tæniâ supra oculos albo-rufescente; collo rufo, infernè nigricante transversim striato; uropygio candido, maculis nigricantibus vario; rectricibus nigricantibus, albo transversim striatis . . . . Limosa rufa major.

Scolopax rostro recto, pedibus virescentibus, capite colloque rufescentibus, remigibus tribus nigris basi albis. Ægocephala. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 13.

Barge seu Ægocephalus Bellonii. *Willugh. Ornith. pag.* 215.
Raj. Syn. Avi. pag. 105. *N°. A.* 4.
Marsil. Danub. Tom. V. pag. 36. *hujus icon non satis accurata Tab.* 16.

Glareola Ægocephalus. *Klein. Avi. pag.* 102. *N°.* 11.

Francolin. *Alb. Tom. II. pag.* 44; *avec une figûre mal coloriée Pl.* 70.

Les Anglois l'appellent Godwit. *Willugh. Alb. & en quelques endroits*, Stone-Plover. *Willugh.*

Les Anglois qui habitent l'Isle d'Ely & Cambridge, Yarwhelp ou Yarwip. *Willugh. Raj.*

Præcedentem multùm crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim circiter pollices explet, & ad extremos ungues unum pedem quatuor pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & quatuor lineas longum est; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata tredecim lineas; pes duos pollices cum totidem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas, extimus duodecim cum semi lineas, intimus unum pollicem; posticus autem quatuor lineas tantùm. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & trium pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam ferè pertingunt. Pennæ partem capitis superiorem, sicut & dorsi supremam, obtegentes nigricant, & marginibus donantur rufescentibus. Scapulares concolores. In utroque capitis latere tænia extat albo-rufescens, pro-

Elle est beaucoup plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quinze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied quatre pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces quatre lignes de long; sa queue trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, treize lignes; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur douze lignes & demie, l'intérieur un pouce; & celui de derriere quatre lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a deux pieds trois pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du dos sont couvertes de plumes noirâtres, bordées de roussâtre. Les scapulaires sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une bande d'un blanc-roussâtre, qui part d'auprès de l'origine du bec, & s'étend jusqu'au-dessus des

yeux. La gorge & le col sont roux; mais la partie inférieure du col est variée de taches transversales noirâtres. La partie inférieure du dos & le croupion sont d'un blanc varié de taches noirâtres. Les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement de blanc & de noirâtre. La poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un blanc sale, varié de taches transversales noirâtres. Le haut des jambes est d'un blanc sale & sans taches. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont noirâtres, & bordées de roussâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont noires, & bordées de blanc seulement par le bout. Les grandes plumes de l'aîle sont noires, & ont leur tige blanche; les trois premieres sont de plus marquées vers le tiers de leur longueur d'une grande tache transversale blanche : toutes les moyennes sont noirâtres, bordées & terminées de roussâtre. De celles-ci les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes

pe rostri exortùm orta, & supra oculos usque producta. Guttur & collum sunt rufa; colli tamen inferiorem partem variegant maculæ transversæ nigricantes. Dorsum infimum & uropygium albicant, & maculis nigricantibus variegantur. Superiores caudæ tectrices sunt albo & nigricante transversim striatæ. Pectus, venter, latera & tectrices caudæ inferiores sordidè albent, maculisque variegantur transversis nigricantibus. Crurum suprema pars est pariter sordidè alba, sed immaculata. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, nigricant, & rufescente marginantur: majores à corpore remotiores sunt nigræ, albo in apice tantùm fimbriatæ. Remiges majores nigro quoque imbutæ, scapo candido præditæ, tribus primoribus majusculâ insuper maculâ transversâ candidâ versùs ipsarum tertiam longitudinis partem insignitis : minores omnes nigricantes, rufescente fimbriatæ & terminatæ. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum

extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes, albo transversim striatæ. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales autem nonnihil gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. Rostrum in exortu ex albo rubescens, versùs extremitatem nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusco-viridescentes; ungues verò nigri. Maris arenosa littora frequentat.

noirâtres, rayées transversalement de blanc. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant un peu de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un blanc-rougeâtre à son origine, & noir vers son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un brun-verdâtre; & les ongles noirs. Elle se tient sur les sables des bords de la mer.

** 7. La Barge rousse d'Amérique.

Limosa superne fusco-rufescens, nigro transversim striata, infernè albo-rufescens; tæniâ supra oculos, genis & gutture candidis; uropygio ruso, nigricante transversim striato; collo inferiore & pectore rufescentibus, collo inferiore maculis longitudinalibus nigris, pectore maculis transversis fuscis vario; rectricibus rufis, nigro transversim striatis .... Limosa Americana rufa.

Scolopax rostro recto longo, pedibus fuscis, remigibus secundariis rufis nigro punctulatis. Fedoa. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 8.
Grand Francolin de l'Amérique. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXVII;* *avec une figure exacte Pl.* 137.
Les Anglois l'appellent Greater American Godwit. *Edwards.*
Les Anglois de la Baye de Hudson, Curlew. *Edwards.*

Crassitie præcedentem nonnihil excedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem sexdecim pol-

Elle est un peu plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de seize

pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces neuf lignes de long; sa queue deux pouces huit lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce cinq lignes; son pied deux pouces huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes, l'extérieur seize lignes, l'intérieur quatorze lignes; & celui de derriere six lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a deux pieds trois pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos, & les plumes scapulaires sont d'un brun-roussâtre, rayé transversalement de noir. La partie inférieure du dos & le croupion sont roux, & rayés transversalement de noirâtre. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une bande blanche, qui part d'auprès de l'origine du bec,

lices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem septem pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & novem lineas longum est; cauda duos pollices & octo lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem & quinque lineas; pes duos pollices cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas, extimus sexdecim lineas, intimus quatuordecim lineas; posticus autem sex lineas. Trium digitorum anticorum medius digito extimo coadunatur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & trium pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad sex usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores, sicut & dorsi suprema, scapularesque pennæ sunt fusco-rufescentes, nigro transversim striatæ. Dorsum infimum & uropygium rufa, tæniis transversis nigricantibus varia. Superiores caudæ tectrices concolores. In utroque capitis

pitis latere tænia extat candida, prope roſtri exortum orta, ſupra oculos ducta, & versùs occipitium uſque protenſa. Caput ad latera, idque infra oculos, ſive genas, gutturque tingit idem candidus color. Collum inferius rufeſcit, maculiſque variegatur longitudinalibus nigris. Pectus pariter rufeſcit, ſed maculis tranſverſis fuſcis variegatur. Venter & crurum ſuprema pars ex albo rufeſcunt, & maculis deſtituuntur. Latera, inferioreſque caudæ tectrices ex albo quoque rufeſcentes, maculis tranſverſis fuſcis variæ. Pennæ alas ſubtus obtegentes ſpadiceæ. Superiores alarum tectrices minimæ fuſcæ, rufeſcente fimbriatæ: mediæ fuſco-rufeſcentes, nigro tranſverſim ſtriatæ: majores corpori finitimæ concolores: ſequentes, illæ ſcilicet quæ medium locum occupant, ſpadiceæ, punctulis nigris aſperſæ: majores tandem à corpore remotiores nigricantes, albo in apice fimbriatæ. Remiges majores nigricant: proximè ſequentes ſunt ſpadiceæ, punctulis nigris aſperſæ: corpori viciniores fuſco-rufeſcentes, nigro tranſverſim

& s'étend juſque vers l'occiput, en paſſant par-deſſus les yeux. Les côtés de la tête au-deſſous des yeux ou les joues, & la gorge ſont du même blanc. La partie inférieure du col eſt rouſſâtre, & variée de taches longitudinales noires. La poitrine eſt pareillement rouſſâtre, mais elle eſt variée de taches tranſverſales brunes. Le ventre & le haut des jambes ſont d'un blanc-rouſſâtre & ſans taches. Les côtés, ainſi que les couvertures du deſſous de la queue, ſont de la même couleur, & variés de taches tranſverſales brunes. Les couvertures du deſſous des aîles ſont d'un rouge-bai. Les petites du deſſus ſont brunes, & bordées de rouſſâtre: les moyennes ſont d'un brun-rouſſâtre, rayé tranſverſalement de noir: les grandes les plus proches du corps ſont de la même couleur: les ſuivantes, ſçavoir celles qui occupent le milieu, ſont d'un rouge-bai tout parſemé de petits points noirs: enfin les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres, & bordées de blanc par le bout. Les grandes plumes de l'aîle ſont noirâtres: les ſuivantes ſont d'un rouge-bai tout parſemé de petits points noirs: & les plus proches du corps ſont d'un brun-rouſſâtre,

rayé tranſverſalement de noir. Ces dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſque juſqu'au bout de la queue. La queue eſt composée de douze plumes rouſſes, rayées tranſverſalement de noir. Les deux du milieu ſont un peu plus longues que les latérales. Le bec eſt d'un beau jaune depuis ſon origine juſque vers la moitié de ſa longueur, enſuite il eſt d'un brun qui devient de plus en plus foncé, en approchant vers ſon bout, qui eſt noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont noirâtres. On la trouve en différens endroits de l'*Amérique*. Elle a été envoyée de *Canada* à *M. de Reaumur* par *M. Gautier*.

ſtriatæ. Quæ noviſſimè dictæ remiges longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, caudam ferè extremam attingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus rufis, nigro tranverſim ſtriatis. Binæ intermediæ lateralium longitudinem nonnihil antecellunt. Roſtrum ab ipſius exortu mediam versùs longitudinem uſque eleganter luteum, deinde fuſcum; qui color, versùs apicem procedendo, ſenſim atque ſenſim fit ſaturatior; in extremitate autem nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigricant. Habitat in variis *Americæ* regionibus. A *Canada* in *muſeum Realmurianum* miſſa à *D. Gautier*.

8. LA BARGE BLANCHE.

Limoſa candida; marginibus alarum, remigibus majoribus, rectricibuſque albo-flavicantibus . . . . LIMOSA CANDIDA.

Francolin blanc de la Baye de Hudſon. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXIX; avec une figure exacte Pl.* 139. (*fig. poſtérieure*).
Les Anglois l'appellent WHITE-GODWIT FROM HUDSON'S-BAY. *Edwards.*

Elle eſt à peu près de la groſſeur de la *Barge rouſſe*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ quatorze pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles

Cum *Limoſa rufa* craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam quatuordecim pollices & tres circiter lineas explet, & ad extre-

mos ungues sexdecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & lineas binas longum est; cauda duos pollices & quatuor lineas; pars crurum plumis denudata sexdecim lineas; pes duos pollices cum totidem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quatuor lineas, extimus tredecim lineas, intimus unum pollicem; posticus autem tres tantummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & digito intimo rudimento membranæ coadunatur. Alæ complicatæ ad sex usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, crurum partem supremam & latera vestiunt pennæ candidæ. Scapulares, quæ alas superne cooperiunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Inferiores alarum tectrices sunt dilutè fuscæ. Alarum margines per totam longitudinem obtegunt plumulæ albo-flavicantes. Remiges

de seize pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces deux lignes de long; sa queue deux pouces quatre lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, seize lignes; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce quatre lignes, l'extérieur treize lignes, l'intérieur un pouce; & celui de derriere trois lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont couverts de plumes blanches. Les scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un brun clair. Le bord de l'aîle est couvert dans toute sa longueur de petites plumes d'un blanc-jau-

nâtre. Les grandes plumes de l'aîle sont de la même couleur : les moyennes sont blanches. De ces dernieres, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque jusqu'au bout de la queue. La queue est composée de douze plumes d'un blanc-jaunâtre. Le bec est orangé, excepté son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un brun foncé. On la trouve à la *Baye de Hudson*.

majores ex albo quoque flavicant : minores sunt candidæ. Ex minoribus autem, corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad caudam ferè extremam pertingunt. Cauda duodecim constat rectricibus albo-flavicantibus. Rostrum aurantium, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque saturatè fusci. Habitat in *Freto Hudsonis*.

LXXVII.

Le genre de la Beccasse.

Son caractere est d'avoir

Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere :

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :

Le bec menu, très-long, droit, & dont le bout est obtus & raboteux.

LXXVII.

Genus Scolopacis.

Hujus character est

Digiti quatuor, membranis destituti ; tres scilicet antici, posticus unus :

Crura in parte inferiore plumis denudata :

Rostrum gracile, longissimum, rectum; ~~ipsius apice~~ obtuso & rugoso.

** 1. La Beccasse.

Scolopax superne castaneo, nigro & griseo variegata, infernè griseo-rufescens, nigricante transversim striata ; tæniâ utrinque rostrum inter & oculum nigrâ ; gutture candicante ; collo superiore tæniis quatuor transversis nigris insignito ; uropygio castaneo, nigricante transversim striato ; rectricibus nigris, apice griseis, maculis triangularibus castaneis in margine exteriore notatis . . . . Scolopax.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Alouette-de-mer de S. Domingue. 2. Grande Barge grise.



Dessiné et Gravé par Martinet

1. Barge rousse. 2. Petite Alouette-de-mer de S. Domingue.

Scolopax rostro recto lævi, pedibus cinereis, femoribus tectis, fasciâ frontis nigrâ. Rusticola. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 7.

Scolopax subtus fulva, superne cinerea. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XII. sp.* 1.

Scolopax. *Jonst. Avi. pag.* 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31, *sub titulo*, Scolopax sive Gallinago : *& insuper altera icon non satis accurata Tab.* 53, *sub titulo*, Rusticola.

Willugh. Ornith. pag. 213. *hujus icon non satis accurata Tab. LIII.*

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 18.

Scolopax simpliciter Aristotelis, Aldrovandi. *Klein. Avi. pag.* 99. *N°.* 1.

Scolopax, Gallinago maxima. *Raj. Syn. Avi. pag.* 104. *N°. A.* 1.

Scolopax, sive Perdix rustica. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 471. *hujus icon non satis accurata pag.* 473.

Scolopax, Rusticula major. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°. VII.*

Charlet. Onomazt. pag. 108. *N°. VII.*

Ascolopax. *Bell. Obs. pag.* 18.

Rusticula. *Moehr. Avi. Gen.* 97.

Rusticula, vel Perdix rustica major. *Gesn. Avi. pag.* 501. *hujus icon non satis accurata pag.* 502.

Gesn. icon. Avi. pag. 110, *in qua eadem icon.*

Perdix rustica major. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 329.

Perdix rustica major; Ascolopax; Scolopax; Gallinago Gazæ. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 292.

Perdix rustica major, seu Scolopax Aldrovandi; Gallina rustica; Rusticula major. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 409.

Gallina rustica. *Gesn. Avi. pag.* 477.

Rukicola. *Linn. Systh. Nat. ed.* 6. *Gen.* 59. *sp.* 4.

Numenius rostri apice lævi; capite lineâ utrinque nigrâ; rectricibus nigris apice albis. *Faun. Suec. Linn. N°.* 141.

Wood Cock. *Borl. Nat. Hist. of Cornwall. pag.* 245. *hujus icon pessima Tab. XXIV. fig. XII.*

Beccasse. *Bel. Hist. nat. des Oís. pag.* 272; *avec une figure peu exacte pag.* 273.

Bécasse, Bécasse grande, Béquasse, Videcocq. *Bel. Portr. d'Oís. pag.* 52 *b, dans laquelle est la même figure.*

Bécasse. *Alb. Tom. I. pag.* 62; *avec une figure peu exacte Pl.* 70.

Les Grecs l'appellent Σκολόπαξ. *Bel. Gesn. Schwenck.* Ἀσκολόπαξ. *Bel. Aldrov.* Ἀσκαλώπαξ. *Schwenck. & vulgairement* Ξυλόρνις. *Jonst.*

Les Grecs modernes, Χιλορνίθα. *Bell.*

Les Turcs dans l'Asie mineure, Tcheluk. *Gesn. Aldrov.*

Les Normands, Videcoq. *Gesn. Aldrov.*

Les Catalans, Becada. *Barr.*

Les Italiens, Beccassa; Gallinella; Gallina arciera. *Bel. Gesn.*

Aldrov. GALLINA RUSTICELLA ; GALLINA SALVATICA. *Aldrov.*
Les Italiens aux environs du Lac Majeur, GALLINAZA ; POLLA. *Bel. Gesn. Aldrov.*
Les Italiens aux environs de Bresse, ARCIA. *Bel. Gesn. Aldrov.*
Les Boulonnois, PIZZACCARA. *Aldrov.*
Les Habitans de Parmes, PIZZACCARA ; BECCASSA. *Aldrov.*
Les Toscans, ACCEGGIA. *Gesn. Aldrov.*
Les Génois, RONZESA : *& quelques-uns*, ROPEZORA. *Aldrov.*
Les Allemands, SCHNEPFF. *Gesn. Aldrov.* GROSSER SCHNEPF. *Gesn.* RIET-SCHNEPFF ; SCHNEPFF-HUN. *Gesn. Aldrov.* SCHNEPFFE ; SCHNEP-HUN ; PUSCH-SCHNEPPE, WALD-SCHNEPPE ; HOLTZ-SCHNEPPE ; BERG-SCHNEPPE. *Schwenck.* WALD-SCHNEPFE ; HOLTZ-SCHNEPFE ; BERG-SCHNEPFE. *Rzac.*
Les Flamands, SNEPPE. *Gesn. Aldrov.*
Les Brabançons, NEPPE. *Gesn.*
Les Polonois, SLOMKA. *Rzac.*
Les Suédois, MORKULLA. *Linn.*
Les Anglois, WOOD-COCK. *Gesn. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Linn. Alb. Borl.*

Elle est à peu près de la grosseur de la *Perdrix grise*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces sept lignes de long; sa queue trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux lignes; son pied dix-huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes, l'extérieur treize lignes, l'intérieur un pouce; & celui de derriere cinq lignes & demie. Les trois doigts antérieurs sont réunis à leur origine par un

Perdicem cineream crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices explet, & ad extremos ungues tredecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & septem lineas longum est ; cauda tres pollices ; pars crurum plumis denudata lineas binas ; pes octodecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum septem lineis, extimus tredecim lineas, intimus unum pollicem ; posticus autem quinque cum semi lineas. Digiti tres antici in ipsarum exortu

rudimento membranæ valdè exiguo inter se connectuntur. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & decem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremâm ferè pertingunt. Partes capitis & colli superiores, sicut & dorsi suprema, scapularesque pennæ castaneo, nigro, paucoque griseo eleganter variegantur. Collum superius latis quatuor tæniis transversis nigris insignitur. In utroque capitis latere exigua extat tænia concolor, ab oris angulis orta, & ad oculos usque producta. Dorsum infimum, uropygium, superioresque caudæ tectrices tingit color castaneus, nigricante transversim striatus. Guttur candicat. Pars colli inferior rufescit, tæniisque transversis nigricantibus insignitur. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & inferiores alarum tectrices sunt griseo-rufescentes, pariter nigricante transversim striatæ. Pennæ caudam subtus obtegentes dilutè rufæ, nigricantibus variegatæ maculis, aliis transversis, alteris longitudinalibus. Superiores alarum tectrices minores castaneæ,

très-petit commencement de membrane. Elle a un pied dix pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos, & les plumes scapulaires sont joliment variées de marron, de noir & d'un peu de gris. Sur la partie supérieure du col sont quatre larges bandes transversales noires. De chaque côté de la tête est une petite bande de la même couleur, qui part des coins de la bouche, & s'étend jusqu'aux yeux. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un marron rayé transversalement de noirâtre. La gorge est blanchâtre. La partie inférieure du col est d'un roussâtre rayé transversalement de noirâtre. La poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous des aîles sont d'un gris-roussâtre, rayé de même transversalement de noirâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un roux clair, varié de taches noirâtres, les unes transversales, d'autres longitudinales. Les petites du dessus des aîles sont d'un marron rayé transversalement de brun: les grandes les plus pro-

ches du corps ſont variées & rayées tranſverſalement de gris, de brun & de marron clair : les grandes les plus éloignées du corps ſont brunes, & marquées de taches triangulaires d'un beau marron, placées ſur leur côté extérieur, & de taches de marron clair, placées obliquement ſur leur bord intérieur; elles ſont auſſi bordées de marron clair par le bout. L'aîle eſt compoſée de vingt-trois plumes : la premiere eſt brune, & variée ſur le côté extérieur de taches blanchâtres, & ſur le bord intérieur de taches de marron clair : les ſeize ſuivantes, ſçavoir depuis la ſeconde juſqu'à la dix-ſeptiéme incluſivement, ſont brunes, & marquées de taches triangulaires d'un beau marron, placées ſur leur côté extérieur, & de taches de marron clair, placées obliquement ſur leur bord intérieur; elles ſont auſſi bordées de marron clair par le bout : les ſix plus proches du corps ſont variées & rayées tranſverſalement de gris, de brun & de marron clair. Ces ſix dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aile eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue eſt compoſée de douze plumes noires, terminées de

fuſco tranſverſim ſtriatæ : majores corpori viciniores griſeo, fuſco & caſtaneo diluto variæ & tranſverſim ſtriatæ : majores à corpore, remotiores fuſcæ, triangularibus notatæ maculis eleganter caſtaneis, in latere exteriore poſitis, maculiſque dilutè caſtaneis, ad marginem interiorem obliquè collocatis, inſignitæ; ſunt quoque caſtaneo diluto in apice fimbriatæ. Alam componunt viginti tres remiges, quarum prior fuſca eſt, maculis candicantibus in latere exteriore varia, maculis verò dilutè caſtaneis ad marginem interiorem notata : ſexdecim proximè ſequentes, à ſecunda ſcilicet ad decimam ſeptimam uſque incluſivè, fuſcæ, triangularibus notatæ maculis eleganter caſtaneis, in latere exteriore collocatis, maculiſque dilutè caſtaneis, ad interiorem marginem obliquè poſitis, inſignitæ; caſtaneo diluto in extremitate inſuper marginantur : ſex corpori viciniores griſeo, fuſco & caſtaneo diluto variegantur & tranſverſim ſtriantur. Quæ ſex noviſſimæ remiges longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur,

complicatur; ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigræ, griseo terminatæ, maculisque triangularibus eleganter castaneis in margine exteriore notatæ. Rostrum in exortu ex griseo ad carneum colorem vergit, in extremitate nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque griseo-fusci. Sylvas humidas & rivulos juxta sepes frequentat. *Ex muséo Realmuriano.*

gris, & marquées sur leur bord extérieur de taches triangulaires d'un beau marron. Le bec est à son origine d'un gris tirant sur le couleur de chair, & noirâtre à son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. Elle fréquente les bois humides & les ruisseaux bordés de hayes. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** A. *La Beccasse blanche.*

Scolopax candida.

Scolopax alba. *Klein. Avi. pag.* 100. *N°. 6.*
Beccasse blanche. *Alb. Tom. III. pag.* 36; *avec une figure passable Pl.* 85.
Les Anglois l'appellent White Wood-Cock. *Alb.*

A præcedente differt colore in universo corpore candido. (Illa cujus descriptionem dedit *Albinus*, pauco variegatur castaneo). Rostrum ex albo flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedesque sunt pallidè lutei; ungues verò candidi. *Ex muséo Realmuriano.*

Elle diffère de la précédente par sa couleur, qui est blanche par tout le corps. (Celle qu'*Albin* a décrite, est variée d'un peu de marron.) Son bec est d'un blanc-jaunâtre. La partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune pâle; & les ongles blancs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. La Beccassine.

Voyez Pl. XXVI. Fig. 1.

Scolopax supernè nigricante & fulvo diluto variegata, infernè alba; gutture fulvo; capite superiore triplici tæniâ longitudinali dilutè fulvâ notato; dorso fasciis quatuor longitudinalibus dilutè fulvis insignito; uropygio fusco nigricante, albo-fulvescente transversim striato; rectricibus in exortu nigricantibus, in extremitate fulvis, nigricante transversim striatis . . . . Gallinago.

Scolopax rostro recto apice tuberculato, pedibus fuscis, lineis frontis fuscis quaternis. Gallinago. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 11.
Scolopax cinerea minor, rostro nigro. *Barr. Ornith. Class. III. Gen XII. sp.* 2.
Scolopax media. *Klein. Avi. pag.* 99. *N°.* 2.
Scolopax, quæ Capella cœlestis authorum. *Klein. Avi. pag.* 100. *N°.* 3.
Scolopax, seu Gallinago minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 476. *hujus icon non satis accurata pag.* 479.
Scolopax, seu Gallinago minor, & Scolopax minor. *Jonst. Avi. pag.* 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31; *& insuper altera icon à Gesnero mutuata Tab. XXVII, sub titulo,* Rusticula minor.
Gallinago. *Linn. Syst. Nat. ed.* 6. *Gen.* 56. *sp.* 6.
Gallinago, sive Rusticula minor. *Gesn. Avi. pag.* 505, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Gallinago, vel Scolopax minor, sive Rusticula minor. *Gesn. icon. Avi. pag.* 112, *in qua eadem icon.*
Gallinago, Scolopax minor. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°. VIII. Charlet. Onomazt. pag.* 108. *N°. VIII.*
Gallinago minor. *Raj. Syn. Avi. pag.* 105. *N°. A.* 2. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag.* 18.
Gallinago minor Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 484, *in qua hujus icon pessima.*
Gallinago minor Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 214. *hujus icon minus accurata Tab. LIII.*
Gallinago minor Willughby. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 381.
Gallinago vulgaris minor. *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 34. *hujus icon non satis accurata Tab.* 15.
Rusticula; Gallinago Gazæ; Scolopax minor aliis. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 295.
Perdix rustica minor. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 330.

Perdix rustica minor ; Scolopax minor ; Rusticula minor ; Gallinago minor ; Capella cœlestis. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag* 410.

Numenius capite lineis quatuor fuscis longitudinalibus, rostri apice tuberculoso, femoribus seminudis. *Faun. Suec. Linn. N°.* 143.

Molliceps Aristotelis. *Jonst. Charlet.*

Bécassine. *Alb. Tom. I. pag.* 63 ; *avec une figure mal coloriée Pl.* 71.

Bécassine ou Bécasseau. *Bel. Hist. nat. des Oif. pag.* 215, *dans laquelle il y a une mauvaise figure.*

Bécassine, Bécasseau, Bécasson, Bécasse petite. *Bel. Portr. d'Oif. pag.* 54 *a, dans laquelle est une figure passable.*

Les Turcs l'appellent JELVÉ. *Gesn. Aldrov.*

Les Italiens, PIZZARDELLA. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, SCHNEPFFE ; HEER-SCHNEPFE ; WASSER-SCHNEPFE. *Rzac.* HEER-SCHNEPFF. *Gesn. Aldrov. Schwenck.* HAR-SCHNEPF ; HAER-SNEFF ; GRASS-SCHNEPFF ; SCHNEPFFLIN. *Gesn. Aldrov.* GRASE-SCHNEPFF ; BRUCH-SCHNEPFLE ; WASSER-SCHNEPFFE ; WASSER-HEUNLIN. *Schwenck.*

Les Siléfiens, HIMELS GEISZ ; HIMELS ZIEGE. *Schwenck.* HIMMELS-ZIEGE. *Rzac.*

Les Polonois, BEKAS ; BARANEK ; KOZIELEK. *Rzac.*

Les Suédois, WALD-SNAEPPA ; MALL-SNAEPPA. *Linn.*

Les Anglois, SNIPE. *Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb.* SNITE. *Willugh. Raj. Sibbald.*

Crassitie *Coturnicem* paululùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem decem pollices explet, & ad extremos ungues decem pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & quinque cum semi lineas longum est ; cauda duos pollices cum sex lineis ; pars crurum plumis denudata quinque lineas ; pes quatuordecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & qua-

Elle est un peu plus grosse qu'une *Caille.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces cinq lignes & demie de long ; sa queue deux pouces six lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes ; son pied quatorze lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce quatre lignes, l'extérieur treize

lignes, l'intérieur douze lignes & demie ; & celui de derriere quatre lignes seulement. Tous ses doigts sont entiérement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a quinze pouces six lignes de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un noir varié de petites taches fauves, & marqué de trois bandes longitudinales d'un fauve clair, l'une placée dans le milieu, & qui s'étend depuis l'origine du bec jusqu'à l'occiput, & une autre de chaque côté, qui part aussi de l'origine du bec, & s'étend jusqu'à l'occiput, en passant immédiatement par-dessus les yeux. Sur les côtés de la tête l'espace contenu entre le bec & l'œil est fauve, & marqué d'une petite bande brune, qui part des coins de la bouche, & s'étend jusqu'à l'œil. La gorge est fauve. La partie inférieure du col est variée de fauve très-clair & de brun. La partie postérieure de la tête, les parties supérieures du col & du dos, & les plumes scapulaires sont variées de noirâtre & de fauve clair, cette derniere couleur formant sur le dos quatre bandes longitudinales,

tuor lineas, extimus tredecim lineas, intimus duodecim cum semi lineas; posticus autem quatuor tantummodo lineas. Omnes digiti sunt ad exortum usque à se invicem penitùs discreti. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quindecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput superius nigrum est, minutis maculis fulvis varium, & tribus notatum tæniis longitudinalibus dilutè fulvis, unâ scilicet in medio positâ, ab exortu rostri ad occipitium usque productâ, alterâ utrinque collocatâ, ab exortu rostri similiter ortâ, immediatè supra oculos ductâ, & ad occipitium usque protensâ. Caput ad latera, in spatio scilicet rostrum inter & oculum contento, fulvum est, exiguâque tæniâ fuscâ, ab oris angulis ortâ, & ad oculum usque productâ, insignitum. Guttur quoque fulvum. Pars colli inferior fulvo dilutissimo & fusco variegata. Caput posterius, pars colli superior, sicut & dorsi suprema, scapularesque pennæ

nigricante & fulvo diluto variegantur ; color autem dilutè fulvus quatuor efficit in dorso tænias longitudinales, utrinque binas, scilicet in dorso ipso unam, & in scapularium latere exteriore alteram. Dorsum infimum & uropygium obtegunt pennæ fusco-nigricantes, tæniis transversis ex albo ad fulvum vergentibus notatæ. Superiores caudæ tectrices sunt fulvæ, nigricante transversim striatæ. Pectus, venter, crurum suprema pars & latera in parte infima albicant. Latera in parte suprema albent quidem, sed aliquid fulvi admixtum habent, & fusco transversim striantur. Tectrices caudæ inferiores sunt dilutè fulvæ, nigricante maculatæ. Pennæ alas subtus cooperientes fuscæ, albo fimbriatæ. Quæ alarum margines infra articulum carpo humano respondentem obtegunt, concolores. Superiores alarum tectrices minimæ sunt saturatè fuscæ : mediæ, sicut & majores corpori viciniores, fusco saturato & fulvo diluto variegatæ : majores à corpore remotiores saturatè fuscæ, albo in apice marginatæ. Viginti quatuor remi-

deux de chaque côté, sçavoir une sur le dos même & une sur le côté extérieur des scapulaires. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes d'un brun-noirâtre, marquées de bandes transversales d'un blanc tirant sur le fauve. Les couvertures du dessus de la queue sont fauves, & rayées transversalement de noirâtre. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & le bas des côtés sont blancs. Le haut des côtés est d'un blanc mêlé d'une légere teinte de fauve, & rayé transversalement de brun. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un fauve clair, tacheté de noirâtre. Celles du dessous des aîles sont brunes, & bordées de blanc. Les plumes qui couvrent le bord de l'aîle au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, sont de la même couleur. Les plus petites couvertures du dessus des aîles sont d'un brun foncé : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont variées de brun foncé & de fauve clair : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé, & bordées de blanc par le bout. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes : les dix premieres sont brunes ; de celles-là,

la premiere a son côté extérieur blanc; la seconde est bordée extérieurement de blanc; les huit autres, sçavoir depuis la troisiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont bordées intérieurement d'un blanchâtre tacheté de brun; & dans cinq de ces dernieres, sçavoir depuis la sixiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, la bordure blanchâtre s'étend aussi sur le bout: les huit suivantes, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la dix-huitiéme inclusivement, sont brunes, terminées de blanc, & ont aussi une grande partie de leur côté intérieur rayée transversalement de blanc; de plus le blanc de leur extrémité borde leur côté extérieur d'autant plus haut vers leur origine, que la plume est plus proche du corps: la dix-neuviéme & la vingtiéme sont brunes, bordées & terminées de blanc, & sont de plus variées de gris du côté intérieur: enfin les cinq plus proches du corps sont rayées de bandes obliques, alternativement noirâtres & d'un fauve clair, ces dernieres bandes étant elles-mêmes tachetées de noirâtre. Ces cinq dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que

gibus ala conflatur: decem primores fuscæ; ex istis autem prior in latere exteriore albet; secunda margine exteriore donatur candidâ; octo reliquæ, à tertia scilicet ad decimam usque inclusivè, marginibus donantur interioribus albidis, fusco maculatis; & ex novissimis istis quinque, à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè, margine candicante etiam in apice prædita sunt: octo proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam octavam usque inclusivè, fuscæ, albo terminatæ, & in lateris interioris maxima parte albo quoque transversim striatæ; albedo autem quâ terminantur, marginem efficit in latere exteriore concolorem eò magis versùs ipsarum exortum appropinquantem, quò remix fit corpori vicinior: décima nona & vigesima fuscæ sunt, albo fimbriatæ & terminatæ, inque latere interiore griseo insuper variegatæ: quinque tandem corpori finitimæ tæniis striatæ obliquis, alternatim nigricantibus & dilutè fulvis; quæ ipsæ tæniæ dilutè fulvæ nigricante maculantur. Quinque istæ novissimè dictæ remiges longæ

ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices in exortu nigricantes, in reliqua longitudine fulvæ, nigricante transverſim ſtriatæ : in ſex intermediis rectricibus color nigricans, ipſarum exortum tingens versùs extremitatem magnopere protenditur; & utrinque extima dilutiſſimo fulvo imbuitur. Oculorum irides avellaneæ. Roſtrum ab ipſius exortu versùs duas tertias longitudinis partes uſque fuſcum, inde ad apicem nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedeſque fuſco - virideſcentes ; ungues verò nigricantes. Loca paludoſa frequentat, & juxta rivulorum ripas verſatur. *Ex muſeo Realmuriano.*

les plus grandes plumes de l'aile. La queue eſt composée de douze plumes noirâtres à leur origine; le reſte de leur longueur eſt fauve, & rayé tranſverſalement de noirâtre : ſur les ſix plumes du milieu le noirâtre de l'origine s'étend fort loin vers leur extrémité; & le fauve de la plus extérieure de chaque côté eſt très-clair. L'iris des yeux eſt de couleur de noiſette. Le bec eſt brun depuis ſon origine juſque vers les deux tiers de ſa longueur; le reſte eſt noirâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſon d'un brun - verdâtre; & les ongles noirâtres. Elle ſe tient dans des endroits marécageux, & le long des petits ruiſſeaux. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 3. LA PETITE BECCASSINE.

Voyez Pl. XXVI. Fig. 2.

Scolopax ſuperne nigro & fulvo variegata, nigro-violaceo & viridi-aureo colore variante, infernè fuſco, fulvo obſcuro & albido varia ; ventre albo ; gutture albo-fulveſcente ; capite ſuperiore duplici tæniâ longitudinali dilutè fulvâ notato ; dorſo faſciis quatuor longitudinalibus dilutè fulvis inſignito ; uropygio ſplendidè violaceo, pennis albido in apice marginatis ; rectricibus binis intermediis nigricanti-

bus, fulvo marginatis, lateralibus fuſcis, fulvo variegatis . . . . GALLINAGO MINOR.

Scolopax minima, ex fulvo & caſtaneo colore maculata. *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen. XII. ſp.* 3.
Scolopax minima. *Klein. Avi. pag.* 100. *N°.* 4.
Gallinago minima, ſeu tertia Bellonii. *Willugh. Ornith. pag.* 214. *Raj. Syn. Avi. pag.* 105. *N°. A.* 3.
Cinclus. *Charlet. Exer. pag.* 113. *N°. XI. Charlet. Onomazt. pag.* 108. *N°. XI.*
Cinclus quartus, Gallinago minima Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 493, *in qua hujus icon peſſima.*
Cinclus, Gallinago minima Bellonii. *Jonſt. Avi. pag.* 112. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53.
Plus petite eſpece de Bécaſſine. *Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag.* 217.
Mâle de la Beccaſſine. *Alb. Tom. III. pag.* 36; *avec une figure mal coloriée Pl.* 86.
Les François l'appellent DEUX-POUR-UN. *Bel. Willugh.*
Les François qui habitent les bords de l'Océan, FOUTON. *Bel. Aldrov.*
Les Catalans, BECADELL. *Barr.*
Les Flamands, HALF-SCHNEPF. *Charlet.*
Les Anglois, JUD-COCK; JACK-SNIPE. *Willugh. Raj. Alb.* GID-SNIPE. *Willugh. Raj.* HALF-SNIPE. *Charlet.*

Elle eſt de moitié plus petite que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de huit pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de huit pouces neuf lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a un pouce ſept lignes de long; ſa queue un pouce neuf lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quatre lignes; ſon pied dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur onze lignes,

Craſſitie præcedenti mediâ parte cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam octo pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque unum pollicem & ſeptem lineas longum eſt; cauda unum pollicem & novem lineas; pars crurum plumis denudata quatuor lineas; pes decem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus

mus undecim lineas, intimus decem lineas; posticus autem tres tantummodo lineas. Digiti omnes sunt ad exortum usque à se invicem penitùs discreti. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput superius eleganti imbuitur nigro minutis maculis fulvis vario, & binis notato tæniis longitudinalibus dilutè fulvis, prope rostri exortum ortis, & ad occipitium usque productis. Partem colli superiorem vestiunt pennæ ex fulvo ad fuscum vergentes, maculis fuscis variæ, albido fimbriatæ. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ sunt nigro & fulvo variegatæ, nigro tamen violaceo lucido & viridi-aureo splendenti colore variante: dorsum insuper quatuor insignitur tæniis longitudinalibus dilutè fulvis, binis utrinque, scilicet in dorso unâ, & in scapularium latere exteriore alterâ: ex scapularibus autem quædam albo in apice fimbriantur. Dorsum infimum & uropygium

l'intérieur dix lignes; & celui de derriere trois lignes seulement. Tous ses doigts sont entiérement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a treize pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un beau noir varié de petites taches fauves, & marqué de deux bandes longitudinales d'un fauve clair, qui partent d'auprès de l'origine du bec, & s'étendent jusqu'à l'occiput. Le dessus du col est couvert de plumes d'un fauve rembruni, variées de taches brunes, & bordées de blanchâtre. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont variées de noir & de fauve, le noir changeant en violet brillant & en verd-doré éclatant. Le dos est de plus marqué de quatre bandes longitudinales d'un fauve clair, deux de chaque côté, sçavoir une sur le dos même, & une sur le côté extérieur des scapulaires: quelques-unes de ces dernieres plumes sont bordées de blanc par le bout. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, sont d'un violet brillant, & bordées de blanchâtre par le

bout. Les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres, tachetées & bordées de fauve. Les côtés de la tête sont d'un fauve clair, & marqués d'une bande longitudinale noirâtre, qui part d'auprès de l'origine du bec, & s'étend jusqu'à l'œil. La gorge est d'un blanc mêlé d'une légere teinte de fauve. La partie inférieure & les côtés du col, la poitrine & les côtés sont variés de brun, de fauve rembruni & de blanchâtre. Le ventre est blanc, ainsi que les couvertures du dessous de la queue. Le haut des jambes est couvert de plumes grises. Les petites couvertures du dessous des aîles sont d'un blanc varié de cendré : les grandes sont entiérement cendrées. Les plus petites du dessus sont brunes, & bordées de blanc : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont variées de brun, de fauve clair & d'un peu de blanchâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & bordées de blanchâtre par le bout. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes : les dix premieres sont brunes; six de celles-là, sçavoir depuis la cinquiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont bordées de blanchâtre par le bout : les dix suivantes,

pennis vestiuntur splendidè violaceis, albido in apice marginatis. Superiores caudæ tectrices sunt nigricantes, fulvo maculatæ & fimbriatæ. Caput ad latera est dilutè fulvum, tæniâ longitudinali nigricante, prope rostri exortum ortâ, & ad oculum usque productâ, insignitum. Guttur albet, sed aliquid fulvi admixtum habet. Collum inferiùs & ad latera, pectus & latera fusco, fulvo obscuro & albido variegantur. Venter, inferioresque caudæ tectrices albicant. Crurum supremam partem vestiunt pennæ griseæ. Tectrices alarum inferiores minores sunt candidæ, cinereo variæ : majores penitùs cinereæ. Superiores minimæ fuscæ, albo fimbriatæ : mediæ, sicut & majores corpori viciniores, fusco, fulvo diluto & pauco albido variegatæ; majores à corpore remotiores fuscæ, candicante in apice marginatæ. Viginti quatuor remigibus ala constat : decem primores fuscæ; ex istis autem sex, à quinta scilicet ad decimam usque inclusivè, albido in apice marginatæ : decem proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam

usque inclusivè, dilutè fuscæ, candicante obliquè terminatæ; quæ decem remiges in acumen desinunt : vigesima prima fusca, attamen in latere exteriore partim obscurè fulva, fusco maculata, & margine albâ prædita : tres tandem corpori viciniores in latere interiore fuscæ, in exteriore fulvæ, nigricante trànsversim striatæ & maculatæ. Quæ quatuor nuper descriptæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ nigricant, & marginibus fulvis præditæ sunt : laterales omnes fuscæ, in latere exteriore multò magìs quàm in interiore fulvo variegatæ. Binæ rectrices intermediæ in acumen desinunt, & trium linearum longitudine laterales excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. Rostrum ab ipsius exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque fuscum, in reliqua longitudine nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque

sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont d'un brun clair, & terminées obliquement de blanchâtre; ces dix plumes se terminent en pointe : la vingt-uniéme est brune, ayant une partie de son côté extérieur d'un fauve rembruni, tacheté de brun, & bordé de blanc : enfin les trois plus proches du corps sont brunes du côté intérieur, tandis que leur côté extérieur est d'un fauve rayé transversalement & tacheté de noirâtre. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont noirâtres, & bordées de fauve : toutes les latérales sont brunes, & variées de fauve, mais beaucoup plus du côté extérieur que du côté intérieur. Les deux plumes du milieu de la queue se terminent en pointe, & sont de trois lignes plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est brun depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur; le reste est

noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un brun-verdâtre ; & les ongles noirâtres. On la trouve dans les endroits marécageux & couverts de joncs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

fusco-viridescentes ; ungues verò nigricantes. In paludosis locis & juncetis habitat. *Ex museo Realmuriano.*

4. LA BECCASSINE DE MADRAST.

Scolopax superne nigricante & fulvo variegata, infernè alba ; gutture & collo inferiore fulvis, maculis nigricantibus variis ; capite superiore triplici tæniâ longitudinali fusco-nigricante notato ; dorso fasciis duabus longitudinalibus fusco-nigricantibus insignito ; tæniâ transversâ in pectore nigrâ ; rectricibus nigro, fulvo & griseo variegatis . . . . GALLINAGO MADERASPATANA.

Gallinago Maderaspatana, Perdicis colore. *Raj. Syn. Avi. pag.* 193. *N°.* 2. *hujus icon pessima Tab. I. fig.* 2.
Les Anglois l'appellent PARTRIDGE-SNIPE. *Raj.*

J'ignore quelle est sa grandeur. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont variés de noirâtre & de fauve. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. Le dessus de la tête est marqué de trois bandes longitudinales d'un brun-noirâtre, l'une placée dans le milieu, & qui s'étend depuis l'origine du bec jusqu'à l'occiput, & une autre de chaque côté placée derriere l'œil. Sur le dos sont aussi deux bandes

Quâ magnitudine polleat prorsus ignoro. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium nigricante & fulvo variegantur. Pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ tectrices concolores. Caput superius tribus notatur tæniis longitudinalibus fusco-nigricantibus, unâ scilicet in medio positâ, ab exortu rostri ad occipitium usque productâ, alterâ utrinque ponè oculum collocatâ. Dorsum binis quoque fasciis longitudinalibus fusco-nigri-

cantibus est insignitum. Guttur & partem colli inferiorem tingit color fulvus maculis nigricantibus varius. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & tectrices caudæ inferiores albent; attamen tænia extat transversa in pectore nigra. Remiges nigro, fulvo & griseo eleganter variegantur. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Rostrum rufescit. Hoc habet singulare hæc species, quod digitus posticus anticos digitos longitudine adæquet. Habitat circa *Maderaspatanum*.

longitudinales d'un brun-noirâtre. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un fauve varié de taches noirâtres. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs; mais la poitrine est marquée d'une bande transversale noire. Les plumes de l'aîle sont joliment variées de noir, de fauve & de gris. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles des aîles. Le bec est roussâtre. Ce qu'il y a de singulier dans cette espece, c'est que le doigt de derriere est aussi long que ceux de devant. On la trouve aux environs de *Madrast*.

5. LA BECCASSINE D'ANGLETERRE.

Scolopax superne rufa, maculis nigris & pauco albo variegata, infernè alba; gutture, collo inferiore & pectore maculis nigricantibus variis; medio ventre nigricante, albo undulato; rectricibus binis intermediis fuscis, rufo maculatis, lateralibus fusco-albicantibus . . . . . GALLINAGO ANGLICANA.

Dunlin Septentrionalium Anglorum D. Johnson. *Willugh. Ornith. pag.* 226.
Raj. Syn. Avi. pag. 109.
Les Anglois Septentrionnaux l'appellent DUNLIN. *Willugh. Raj.*

Cum *Gallinagine minori* crassitie & magnitudine convenit. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropy-

Elle est de la grosseur & de la grandeur de la *petite Beccassine*. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le crou-

pion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un roux tout parſemé d'aſſez grandes taches noires, & varié d'un peu de blanc. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine ſont blanches, & variées de taches noirâtres. Le milieu du ventre eſt noirâtre, & varié de blanc en zigzags. Le reſte du ventre, les couvertures du deſſous de la queue, le haut des jambes & les côtés ſont blancs. Les aîles ſont d'un bleu tirant ſur le brun. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont brunes, & variées de quelques taches rouſſes : toutes les latérales ſont d'un brun clair ou blanchâtre. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont noirs. Le doigt de derriere eſt extrêmement court. On la trouve dans la partie Septentrionale de l'*Angleterre*.

gium, pennæ ſcapulares & ſuperiores caudæ tectrices ſunt rufæ, majuſculis maculis nigris aſperſæ, & pauco albo variegatæ. Guttur, pars colli inferior & pectus albore nitent, quem variegant maculæ nigricantes. Medius venter nigricat, alboque eſt undulatus. Reliquus venter, latera, crurum ſuprema pars, inferioreſque caudæ tectrices albent. Alæ ex cæſio ad fuſcum vergunt. Duodecim rectricibus cauda conſtat : binæ intermediæ fuſcæ, maculis quibuſdam rufis variegatæ : laterales omnes dilutè fuſcæ, aut fuſco-albicantes. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Digitus poſticus valdè brevis. Habitat in *Angliæ* Septentrionali regione.

SECTION VI.

Ceux qui ont le bec courbé en arc en en-bas.

IL n'y a dans cette ſection qu'un ſeul genre, ſçavoir celui du *Courly*.

SECTIO VI.

Eæ quæ roſtrum habent deorſum arcuatum.

UNICO genere, *Numenii* ſcilicet, conſtituitur hæc ſectio.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Beccassine.

2. Petite Beccassine.

LXXVIII.

Genus Numenii.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Rostrum deorsum arcuatum.

Omnes hujus generis Alites rostro donantur apice obtuso.

LXXVIII.

Le genre du Courly.

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec courbé en arc en enbas.

Tous les Oiseaux de ce genre ont le bout du bec obtus.

** 1. Le Courly.

Numenius pennis in medio fusco-nigricantibus, in utraque margine fulvis superne vestitus, infernè albus; gutture albido, maculis griseis vario; pectore & lateribus ad fulvum vergentibus, maculis transversis fuscis insignitis; uropygio candido maculis longitudinalibus fuscis notato; rectricibus binis intermediis griseis, lateralibus albis, omnibus fusco transversim striatis . . . . Numenius.

Numenius rostro arcuato, alis nigris: maculis niveis, pedibus cœrulescentibus. *Faun. Suec. Linn.* N°. 139.
Numenius. *Moehr. Avi. Gen.* 87.
Numenius veterum, vel ei cognatus. Arquata major. *Gesn. icon. Avi. pag.* 113, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Numenius, Arquata, Gesneri, Aldrovandi. *Klein. Avi. pag.* 109. *N°.* 1.
Numenius, sive Arquata. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag.* 18. *hujus icon non satis accurata Tab.* 12. *fig.* 2.
Numenius Aldrovandi, sive Arquata. *Willugh. Ornith. pag.* 216. *maris icon ab Aldrovando mutuata Tab. LIV.*
Numenius Aldrovandi, sive Arcuata. *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 38. *hujus icon satis accurata Tab.* 17.
Numenius sive Arcuata major. *Raj. Syn. Avi. pag.* 103. *N°. A.* 1.

Arquâta albicans, maculis subcastaneis. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. IX. sp.* 1.

Arquata. *Jonst. Avi. pag.* 108. *maris icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 51. *Linn. Systh. Nat. ed.* 6. *Gen.* 59. *sp.* 1.

Arquata seu Numenius. *Gesn. Avi. pag.* 221. *hujus icon non satis accurata pag.* 222.

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 424. *maris icon non satis accurata pag.* 426.

Mus. Worm. pag. 307.

Arquata, Arcuata, Numenius veterum, Curlinus. *Charlet. Exer. pag.* 111. *N°. II.*

Charlet. Onomazt. pag. 106. *N°. II.*

Arquata Aldrovandi, Gesneri; Arcuata Cosmii: Numenius Jonstoni; Pardalus primus Schwenckfeldii. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 365.

Scolopax rostro arcuato, pedibus cœrulescentibus, alis nigris maculis niveis. Arquata. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 5.

Pardalus primus. *Schwenck. Avi. Sil pag.* 315.

Corlis & Corlieu. *Bel. Hist nat. des Ois. pag.* 204; *avec une figure peu exacte pag.* 205.

Corlis, Corlieu. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 47 *b*, *dans laquelle est la même figure.*

Corlieu. *Alb. Tom. I. pag.* 69; *avec une figure mal coloriée Pl.* 79.

Les Grecs l'appellent Ἐλώριος. *Bel.*

Les Catalans, POLIT. *Barr.*

Les Italiens, TORQUATO; ARCASE; CHARLOT. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Italiens qui habitent la Poüille, TARLINO *ou* TERLINO. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Italiens aux environs du Lac Majeur, SPINZAGO. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Vénitiens, ARCUATO. *Aldrov.*

Les Boulonnois, PIVIER. *Aldrov.*

Les Milanois, CAROLI. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, BRACH-VOGEL; WIND-VOGEL; WETTER-VOGEL. *Gesn. Aldrov.* JUT-VOGEL. *Rzac.* GROSSER BRACH-VOGEL; BRACH-HUN; GILOCH; HIMEL-GEISZ. *Schwenck.*

Les Allemands aux environs de Strasbourg, REGEN-VOGEL. *Gesn. Aldrov.*

Les Allemands aux environs du Lac de Constance, GRENY. *Gesn. Aldrov.*

Les Siléfiens, GEISZ-VOGEL. *Schwenck.*

Les Hollandois, HANIKENS. *Gesn. Aldrov.*

Les Frisons, SCHRYE. *Gesn. Aldrov.*

Les Frisons Orientaux, WALLOP. *Gesn.*

Les Anglois, CURLEW. *Gesn. Willugh. Raj. Charlet.* WATER-CURLEW. *Alb.* KURLU. *Gesn. Aldrov.* WHAUPE. *Gesn. Ils appellent le mâle*, JACK-CURLEW. *Willugh. Alb.*

Il est à peu près de la grof- Cum *Capone* crassitie cir-

citer convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & unum pollicem æquat, & ad extremos ungues duos pedes totidem pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices & octo lineas longum est; cauda quatuor pollices cum octo lineis; pars crurum plumis denudata octodecim lineas; pes tres pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & decem lineas, extimus unum pollicem cum septem lineis, intimus octodecim lineas; posticus autem septem lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum protensâ, coadunatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum & quatuor pollicum; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput, collumque vestiunt plumulæ in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem

seur d'un *Chapon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds un pouce, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds deux pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces huit lignes de long; sa queue quatre pouces huit lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix-huit lignes; son pied trois pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce dix lignes, l'extérieur un pouce sept lignes, l'intérieur dix-huit lignes; & celui de derriere sept lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la premiere articulation. Il a trois pieds quatre pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête & le col sont couverts de petites plumes brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & fauves sur les deux côtés. La gorge est blanchâtre, chaque plume étant marquée d'une pe-

tite tache grise. La partie supérieure du dos est couverte de plumes d'un brun-noirâtre dans leur milieu, & fauves sur les deux bords. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, sont blanches, & marquées chacune d'une bande brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur. Les couvertures du dessus de la queue sont blanchâtres, & marquées de bandes transversales brunes; les bords de ces bandes tirent un peu sur le fauve. La poitrine & les côtés sont d'un blanc tirant sur le fauve, chaque plume étant encore marquée de bandes transversales brunes, dont la plus proche du bout de la plume a la forme d'un fer de lance. Le ventre & le haut des jambes sont blancs. Les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur, mais chaque plume est marquée d'une bande transversale brune, placée vers les deux tiers de sa longueur, & d'une tache de même couleur, qui a la forme d'un fer de lance, & est placée vers le bout de la plume. Les petites couvertures du dessous des aîles sont blanches, & variées de brun : les gran-

fuscæ, in utroque latere fulvæ. Guttur candicat; quælibet autem penna minutâ insignitur maculâ griseâ. Dorsi supremam partem cooperiunt pennæ in medio fusco-nigricantes, in utraque margine fulvæ. Quæ dorsum infimum & uropygium obtegunt, candidæ, ab exortu versùs tres quartas longitudinis partes usque tæniâ fuscâ, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatæ. Superiores caudæ tectrices sunt candicantes, tæniis transversis fuscis insignitæ; quarum tæniarum margines ad fulvum colorem nonnihil inclinant. Pectus & latera ex albo ad fulvum vergunt; unaquæque autem penna tæniis pariter notatur transversis fuscis, quarum quæ versùs pennæ extremitatem collocatur, est lanceolata. Venter & crurum suprema pars albent. Pennæ caudam subtus obtegentes similiter candidæ, quælibet tamen insignitur tæniâ transversâ fuscâ, versùs duas tertias ipsius longitudinis partes positâ, & maculâ insuper concolore lanceolatâ, versùs pennæ extremitatem collocatâ. Inferiores alarum tectrices minores albæ, fusco

variegatæ : majores similiter candidæ, sed cinereo transversim striatæ. Scapulares pennæ minores pennis partem dorsi supremam vestientibus concolores : majores fusco-nigricantes, attamen ad latera griseo, in fusco-nigricante quasi dentatim incluso, variegatæ. Tectrices alarum superiores minimæ ex fusco nigricant, & candicante marginantur : mediæ sunt in medio fusco-nigricantes, ad margines fulvæ : majores corpori viciniores majoribus scapularibus concolores : majores à corpore remotiores fusco-nigricantes, candicante in apice tantùm fimbriatæ. Triginta remigibus ala conflatur : quinque primores nigricantes, tæniis transversis albis in latere interiore striatæ : quinque proximè sequentes, à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè, pariter nigricant, sed in margine exteriore maculis notantur candidis, griseo variegatis, & tæniis transversis albis interiùs striantur : quatuordecim quæ proximè sequuntur, ab undecima scilicet ad vigesimam quartam usque inclusivè, fuscæ sunt, & ad margines albo, in fusco quasi den-

des sont pareillement blanches, mais elles sont rayées transversalement de cendré. Les petites plumes scapulaires sont de la même couleur que celles qui couvrent la partie supérieure du dos : les grandes sont d'un brun-noirâtre, mais leurs côtés sont variés d'un gris comme dentelé & engrené dans le brun-noirâtre. Les plus petites couvertures du dessus des aîles sont d'un brun-noirâtre, & bordées de blanchâtre : les moyennes sont d'un brun-noirâtre dans leur milieu, & fauves sur leurs bords : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur que les grandes scapulaires : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre, & bordées de blanchâtre seulement par le bout. L'aîle est composée de trente plumes : les cinq premieres sont noirâtres, & rayées intérieurement de bandes transversales blanches : les cinq suivantes, sçavoir depuis la sixiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont pareillement noirâtres, marquées sur leur bord extérieur de taches blanches variées de gris, & rayées du côté intérieur de bandes transversales blanches : les quatorze qui suivent, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la vingt-quatriéme

inclusivement, sont brunes, & variées sur leurs bords d'un blanc comme dentelé & engrené dans le brun, cette derniere couleur étant d'autant plus claire, que la plume est plus proche du corps : enfin les six plus proches du corps sont brunes, & variées sur leurs bords d'un gris comme dentelé & engrené dans le brun. Ces six dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîlé est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont grises : les latérales sont blanches; & toutes sont rayées transversalement de brun. Le demi-bec supérieur est d'un brun qui se fonce de plus en plus en approchant de son extrémité, où il est noirâtre : le demi-bec inférieur est blanchâtre depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur; le reste est d'un brun qui devient noirâtre vers son bout. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve sur les bords de la mer, des rivieres & des étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

tatim incluso, variegatæ; color autem fuscus eò dilutior est, quò remix sit corpori vicinior : sex tandem corpori finitimæ fuscæ, ad margines griseo, in fusco quasi dentatim incluso, variegatæ. Sex istæ nuper descriptæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ griseæ : laterales albæ; omnes autem sunt fusco transversim striatæ. Mandibula superior fusco imbuitur, qui color, versùs ipsius extremitatem procedendo, sensim atque sensim fit saturatior ; extremitas autem nigricat : mandibula inferior ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque candicans, in reliqua longitudine fusca, qui color fuscus versùs apicem nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusci. Juxta maris, fluminum & stagnorum littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

** A. *Le Courly blanc.*

Numenius candidus.

A præcedente discrepat tantùm colore in universo corpore albo. Rostrum dilutè griseum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque ex albo flavicant. *Ex museo Realmuriano.*

Il ne différe du précédent que par sa couleur, qui est blanche par tout le corps. Son bec est d'un gris clair. La partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, ses pieds & ses ongles sont d'un blanc-jaunâtre. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

2. LE PETIT COURLY OU LE CORLIEU.

Voyez Pl. XXVII. Fig. 1.

Numenius pennis in medio saturatè fuscis, ad margines griseis superne vestitus, infernè albus; capite superiore fusco, tæniâ in medio longitudinali, maculis cinereo-albis variâ, insignito; maculâ rostrum inter & oculos candidâ; pectore & lateribus ad fulvum vergentibus, maculis in pectore longitudinalibus, in lateribus transversis fuscis; uropygio candido; rectricibus sex intermediis griseo-fuscis, tribus utrinque extimis albis, exteriùs ad fulvum vergentibus, omnibus fusco transversim striatis . . . . NUMENIUS MINOR.

Numenius rostro arcuato, dorso maculis fuscis rhomboidalibus; pedibus cœrulescentibus. *Faun. Suec. Linn. N°.* 140.

Numenius minor. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen.* 59. *sp.* 2.
Klein. Avi. pag. 109. *N°.* 2.

Arquata minor. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 366.

Arquata minor nostras. *Willugh. Ornith. pag.* 217.
Raj. Syn. Avi. pag. 103. *N°. A.* 2.

Scolopax rostro arcuato, pedibus cœrulescentibus, maculis dorsalibus fuscis rhomboidalibus. Phæopus. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 6.

Phæopus altera, vel Arquata minor. *Gesn. Avi. pag.* 499, *in qua hujus icon minimè accurata.*

Phæopus alter. Arquata minor. *Gesn. icon. Avi. pag.* 103, *in qua eadem icon.*

Phæopus altera, seu Arquata minor Gesneri. *Willugh. Ornith. pag.* 217.

Gallinula Phæopos altera, seu Arquata minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 458. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 460.

Wimbrel ou petit Corlieu. *Edwards. Glanur. Part. II. pag.* 204. *Chap.* *XCVII ; avec une figure assez exacte Pl.* 307.
Les Italiens l'appellent TARANGOLO. *Gesn. Aldrov. Willugh.*
Les Vénitiens, TARANIOLO. *Willugh. Raj.*
Les Allemands, REGEN-VOGEL. *Gesn. Aldrov. Willugh.*
Les Anglois, WHIMBRELL. *Raj.* WHIMBREL. *Willugh. Klein. Edwards.* LESSER CURLEW. *Edwards.*

Les citations qui suivent appartiennent à la même espece, ou du moins à une variété.

Sequentes citationes ad eamdem speciem, aut saltem ad ipsius varietatem attinent.

Phæopus. *Gesn. icon. Avi. pag.* 102, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Phæopus Gallinula Gesneri. *Willugh. Ornith. pag.* 217.
Gallinula quam nostri vocant Brach-hun ; vel Phæopus. *Gesn. Avi. pag.* 498, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Gallinula Phæopus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 458. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 459.
Les Milanois l'appellent GIRARDELLO. *Gesn. Aldrov.*
Les Suisses, BRACH-HUN. *Gesn.*
Les Allemands aux environs de Strasbourg, BRACH-VOGEL. *Gesn. Aldrov. Willugh.*

Il est beaucoup plus petit que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de seize pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces quatre lignes de long ; sa queue quatre pouces ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatorze lignes ; son pied deux pouces une ligne ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes, l'extérieur quatorze lignes, l'inté-

Præcedenti multùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues sexdecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & quatuor lineas longum est ; cauda quatuor pollices ; pars crurum plumis denudata quatuordecim lineas ; pes duos pollices cum linea una ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quinque lineas, extimus qua-

tuordecim lineas, intimus tredecim lineas; posticus autem sex lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum articulum usque productâ, coadunatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum quinque pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ferè ad extremitatem caudæ pertingunt. Caput superius fuscum est, tæniâ longitudinali, maculis cinereo-albis variâ, à rostro ad occipitium usque productâ, in medio insignitum. Guttur albicat. In utroque capitis latere macula extat pariter candida, rostrum inter & oculum posita. Caput ad latera, collum & pectus obtegunt pennæ ex cinereo-albo ad fulvum vergentes, tæniâ fuscâ, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatæ. Quæ partem dorsi supremam vestiunt, sicut & scapulares, sunt in medio saturatè fuscæ, ad margines griseæ. Dorsum infimum, uropygium, venter, latera, crurum suprema pars,

rieur treize lignes; & celui de derriere six lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds cinq pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est brune, & marquée dans son milieu d'une bande longitudinale variée de taches de gris-blanc, qui s'étend depuis le bec jusqu'à l'occiput. La gorge est blanche. De chaque coté de la tête est une tache de la même couleur, placée entre le bec & l'œil. Les côtés de la tête, le col & la poitrine sont couverts de plumes d'un gris-blanc tirant sur le fauve, & marquées chacune d'une bande brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Celles qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont d'un brun foncé dans leur milieu, & grises sur leurs bords. La partie inférieure du dos, le croupion, le ventre, le haut des

jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs ; quelques-unes des longues plumes des côtés tirent cependant un peu sur le fauve, & sont rayées transversalement de brun. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris blanc tirant sur le fauve, & rayées de même transversalement de brun. Les petites du dessous des aîles sont blanches : les grandes sont de la même couleur, & rayées transversalement de cendré-brun. Le bord de l'aîle est couvert de petites plumes brunes, bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un gris-brun, & marquées sur leurs bords de taches transversales d'un gris-blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur, & marquées vers les bords du côté intérieur de bandes transversales blanchâtres : les suivantes sont d'un gris-brun, & marquées sur leurs bords de taches transversales blanchâtres : les quatre ou cinq plus proches du corps sont colorées comme ces dernieres, avec cette différence, qu'elles n'ont pas de taches

inferioresque caudæ tectrices albent ; quædam tamen ex longiusculis pennis latera cooperientibus paululùm ad fulvum inclinant, & fusco transversim striantur. Pennæ caudam superne vestientes sunt cinereo-albæ ad fulvum vergentes, fusco similiter transversim striatæ. Inferiores alarum tectrices minores candidæ : majores concolores, cinereo-fusco transversim striatæ. Alarum margines cooperiunt plumulæ fuscæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt griseo-fuscæ, maculis transversis cinereo-albis ad margines insignitæ : majores à corpore remotiores nigricantes. Remiges majores quoque nigricant, & tæniis transversis candicantibus versùs ipsarum margines in latere interiore notantur : proximè sequentes sunt griseo-fuscæ, maculis transversis candicantibus ad margines insignitæ : quatuor aut quinque corpori viciniores novissimè dictis concolores, ab illis tamen discrepantes in eo quod maculis candicantibus in latere interiore destituantur. Remiges omnes sunt subtus cinereæ, albo

eodem

eodem modò variegatæ ac candicante ſuperne variegantur. Remiges corpori viciniores longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum ſex intermediæ ſunt ſubtus cinereæ, ſuperne verò griſeo-fuſcæ, fuſco tranſverſim ſtriatæ : tres utrinque extimæ albæ, paululùm in latere exteriore tantùm ad fulvum vergentes, & tæniis tranſverſis fuſcis in utroque latere notatæ. Roſtrum nigricans, exceptâ mandibulæ inferioris baſi candicante. Pars crurum plumis denudata, pedeſque griſeo-virideſcentes; ungues verò nigricantes. Præcedentis inſtar, juxta maris, fluminum & ſtagnorum littora verſatur. *Ex muſeo Realmuriano.*

blanchâtres ſur leur côté intérieur. Le deſſous de toutes les plumes de l'aîle eſt cendré, & varié de blanc de la même façon que ces plumes le ſont de blanchâtre en-deſſus. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes : les ſix du milieu ſont cendrées en-deſſous, & en-deſſus elles ſont d'un gris-brun rayé tranſverſalement de brun : les trois plus extérieures de chaque côté ſont blanches, cette couleur tirant un peu ſur le fauve du côté extérieur ſeulement, & marquées des deux côtés de bandes tranſverſales brunes. Le bec eſt noirâtre, excepté la bâſe du demi-bec inférieur, qui eſt blanchâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un gris-verdâtre ; & les ongles noirâtres. On le trouve comme le précédent, ſur les bords de la mer, des rivieres & des étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

3. LE COURLY DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XXVIII.

Numenius pennis in medio ſaturatè fuſcis, ad margines griſeis ſuperne veſtitus, infernè albus ; pectore & lateribus ad

fulvum vergentibus, maculis in pectore longitudinalibus, in lateribus transversis fuscis; rectricibus griseis, fusco transversim striatis . . . . NUMENIUS MADAGASCARIENSIS.

Il est de la grosseur du *nôtre*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds deux pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds cinq pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six pouces neuf lignes de long; sa queue quatre pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces; son pied trois pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces, l'extérieur un pouce neuf lignes, l'intérieur un pouce huit lignes; & celui de derriere huit lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la premiere articulation. Il a trois pieds trois pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête,

Cum *Numenio nostrate* crassitie convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem duos pedes & totidem pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes & quinque pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex pollices & novem lineas longum est; cauda quatuor pollices & tres lineas; pars crurum plumis denudata duos pollices; pes tres pollices cum totidem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices, extimus unum pollicem & novem lineas, intimus unum pollicem cum octo lineis; posticus autem octo cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum articulum usque protensâ, coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum totidem pollicum & quatuor linearum intervallo distant;

alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Partem capitis superiorem, collum superius & dorsum vestiunt pennæ in medio saturatè fuscæ, ad margines griseæ. Quæ uropygium obtegunt concolores; attamen in illis color fuscus minus spatium occupat; griseus verò paulò dilutior est. Scapulares sunt quoque in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem saturatè fuscæ, ad margines griseæ; fusco transversim striatæ. Superiores caudæ tectrices griseo-rufescentes, tæniis insignitæ fuscis, aliis transversis, alteris circumferentiæ pennæ parallelis. Guttur albicat. Pars colli inferior pennis vestitur cinereo-albis, lineâ fuscâ, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatis. Pectus & latera ex albo nonnihil ad rufescentem inclinant colorem; quem colorem variegant maculæ fuscæ in pectore longitudinales, in lateribus verò transversæ. Venter & crurum suprema pars albent, maculisque destituuntur. Pennæ caudam subtus obtegentes ex albo paululùm ad rufescentem colorem vergunt, & lineis fuscis, aliis longi-

le dessus du col & le dos sont couverts de plumes d'un brun foncé dans leur milieu, & grises sur leurs bords. Celles qui couvrent le croupion sont de la même couleur; mais le brun occupe moins d'espace, & le gris est un peu plus clair. Les scapulaires sont aussi d'un brun foncé dans leur milieu selon la longueur de leur tige; leurs bords sont gris, & rayés transversalement de brun. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-roussâtre, marqué de bandes brunes, dont les unes sont transversales, & d'autres sont paralleles à la circonférence de la plume. La gorge est blanche. La partie inférieure du col est couverte de plumes d'un gris-blanc, marquées chacune d'une ligne brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. La poitrine & les côtés sont d'un blanc tirant un peu sur le roussâtre; cette couleur est variée sur la poitrine de taches longitudinales brunes, & sur les côtés de taches transversales de la même couleur. Le ventre & le haut des jambes sont blancs & sans taches. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc tirant un peu sur le roussâtre, varié de lignes brunes, dont les unes sont lon-

gitudinales, & les autres transversales. Les petites couvertures du dessous des aîles sont blanches, & rayées transversalement de brun foncé : les grandes sont blanches, & rayées transversalement de cendré clair. Les plus petites du dessus des aîles, sçavoir celles qui couvrent le bord de l'aîle, sont d'un brun foncé, & bordées de blanchâtre : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur que les plumes scapulaires : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont grises, bordées de blanc, & marquées d'une ligne brune, qui s'étend tout le long de leur tige : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres ; & de celles-là les plus intérieures sont bordées de blanc par le bout. L'aîle est composée de trente plumes : les trois premieres sont d'un noirâtre plus foncé du côté extérieur que du côté intérieur, ayant de plus une grande partie de leur côté intérieur tachetée de blanchâtre, & leur tige blanche : la quatriéme est de la même couleur, mais son côté intérieur est marqué vers ses bords de taches transversales blanches : les cinq suivantes, sçavoir depuis la cinquié-

tudinalibus, alteris transversis variegantur. Inferiores alarum tectrices minores sunt candidæ, fusco saturato transversim striatæ : majores pariter albæ, tæniis transversis dilutè cinereis variæ. Tectrices alarum superiores minimæ, illæ scilicet quæ alarum margines obtegunt, sunt saturatè fuscæ, candicante fimbriatæ : majores corpori viciniores pennis scapularibus concolores : proximè sequentes, istæ scilicet quæ medium locum obtinent, griseæ, albo marginatæ, lineâque fuscâ, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatæ : majores tandem à corpore remotiores nigricant ; ex istis autem intimæ albo in apice marginantur. Alam componunt triginta remiges, quarum tres primores sunt nigricantes, in latere exteriore saturatiùs, in interiore dilutiùs, interiùs insuper maximâ parte candicante maculatæ, & scapo albo præditæ : quarta novissimè descriptis concolor, sed in latere interiore maculis transversis albis versùs margines insignita : quinque proximè sequentes, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè,

nigricantes, maculis transversis albis in utroque latere notatæ : septemdecim quæ sequuntur, à decima scilicet ad vigesimam sextam usque inclusivè, griseæ, maculis transversis candidis in utroque latere insignitæ : quatuor corpori finitimæ in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem saturatè fuscæ, ad margines griseæ, fuscoque transversim striatæ. Quæ quatuor nuper descriptæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Cauda duodecim constat rectricibus griseis, fusco rtansversim striatis. Mandibula superior ex fusco rubescit, versùs extremitatem tamen nigricat : mandibula inferior ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque candicans, in reliqua longitudine fusca, attamen versùs extremitatem nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusco-rubescentes; ungues verò nigricantes. Habitat in *Madagascaria*, unde in *museum Realmurianum* allatus est à *D. Poivre.*

me jusqu'à la neuviéme inclusivement, sont noirâtres, & marquées des deux côtés de taches transversales blanches : les dix-sept suivantes, sçavoir depuis la dixiéme jusqu'à la vingt-sixiéme inclusivement, sont grises, & marquées des deux côtés de taches transversales blanches : les quatre plus proches du corps sont d'un brun foncé dans leur milieu selon la longueur de leur tige; leurs bords sont gris, & rayés transversalement de brun. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes grises, rayées transversalement de brun. Le demi-bec supérieur est d'un brun-rougeâtre, qui devient noirâtre vers son bout : le demi-bec inférieur est blanchâtre depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur; ensuite il est d'un brun qui devient noirâtre vers son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un brun rougeâtre; & les ongles noirâtres. On le trouve à *Madagascar*; d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre.*

** 4. Le Courly verd.

Voyez Pl. XXVII. Fig. 2.

Numenius ſuperne obſcurè viridi-aureus, cupri puri colore varians, infernè cinereo-fuſcus; capite ſuperiore fuſco, lineis longitudinalibus albidis vario; gutture & collo fuſco-caſtaneis, gutture & colli inferioris parte ſupremâ lineis longitudinalibus albidis variegatis; rectricibus viridi-aureis, cupri puri colore variantibus; caudâ nonnihil bifurcâ..... Numenius viridis.

Numenius ſubaquilus *Klein. Avi. pag.* 110. *N°.* 8.
Numenius ſive Falconellus puniceo-viridis; Ardeæ ſpecies Marſilli. *Klein. Avi. pag.* 100. *N°.* 7.
Falcinellus puniceo-viridis; Ardeæ ſpecies. *Marſil. Danub. Tom. V. pag.* 44. *hujus icon non ſatis accurata Tab.* 20.
Falcinellus. *Geſn. Avi. pag.* 220, *in qua hujus icon minùs accurata.*
Falcinellus, ſive Avis falcata. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 422. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 423.
Falcinellus, ſive Falcata. *Jonſt. Avi. pag.* 105. *hujus duæ icones, una à Geſnero, altera ab Aldrovando mutuata Tab.* 51.
Charlet. Exer. pag. 110. *N°.* 7.
Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°.* 7.
Falcinellus Geſneri & Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 218. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LIV.*
Raj. Syn. Avi. pag. 103. *N°.* 3.
Falcinellus Geſneri & Aldrovandi, colore furvo. *Marſil. Danub. Tom. V. pag.* 42. *hujus icon ſatis accurata Tab.* 19.
Falcata. *Geſn. icon. Avi. pag.* 116, *in qua hujus icon minùs accurata.*
Les Italiens l'appellent Falcinello. *Geſn. Aldrov.* Ayron negro. *Geſn. Aldrov. Willugh. Marſil.*
Les Allemands, Weltscher-Vogel. Sichler; Sagiser. *Geſn. Aldrov.*
Les Anglois, Scythe-bill'd Heron. *Charlet.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du *Corlieu*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue eſt d'un pied ſept pouces, & juſqu'à celui

Numenium minorem craſſitie circiter æmulatur. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam unum pedem & ſeptem pol-

lices explet, & ad extremos ungues unum pedem & undecim pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tres pollices & decem lineas longum eſt; cauda eâdem longitudine pollet; pars crurum plumis denudata unum pollicem & undecim lineas longa; pes tres pollices cum linea una; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & decem lineas, extimus duos pollices cum quatuor lineis, intimus viginti quinque lineas; poſticus autem unum pollicem & quatuor lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & ad digitum intimum membranâ alterâ, ſolummodo ad primum articulum uſque productâ, adnectitur. Alis expanſis, extremitates majorum remigum duorum pedum & decem pollicum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam extremam pertingunt. Partem capitis ſuperiorem obtegunt pennæ fuſcæ, in utroque latere albido fimbriatæ; unde caput ſuperius lineolis longitudinalibus albidis varie-

des ongles d'un pied onze pouces. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces dix lignes de long; ſa queue a auſſi trois pouces dix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, un pouce onze lignes; ſon pied trois pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces dix lignes, l'extérieur deux pouces quatre lignes, l'intérieur deux pouces une ligne; & celui de derriere un pouce quatre lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds dix pouces de vol, & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt couverte de plumes brunes, bordées des deux côtés de blanchâtre; ce qui rend le deſſus de la tête varié de petites lignes longitudinales de cette couleur. La gorge & le haut de la partie inférieure du col ſont d'un brun tirant un peu ſur le marron, chaque plume étant de même bor-

dée des deux côtés de blanchâtre ; ce qui produit la même variété que dessus la tête. Le reste du col est d'un brun tirant un peu sur le marron & sans taches. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus de la queue sont d'un verd-doré obscur, & changeant, selon les différentes expositions aux rayons de lumiere, en une couleur de cuivre de rosette assez brillante. La poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un cendré-brun : on apperçoit cependant sur la poitrine & les couvertures du dessous de la queue un peu du même verd-doré que celui du dos. Les moyennes plumes de l'aîle sont d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de rosette : les grandes sont d'un verd-doré un peu plus foncé. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aîle. Les deux du milieu sont un peu plus courtes que les latérales, qui vont tou-

gatum apparet. Guttur & colli inferioris suprema pars ex fusco nonnihil ad castaneum colorem inclinant, & quælibet penna est pariter in utroque latere albido fimbriata; unde fit eadem ac in capite superiore varietas. Reliquum collum ex fusco paululùm ad castaneum colorem vergit, & maculis destituitur. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne & infernè cooperiunt, superioresque caudæ tectrices sunt obscurè viridi-aureæ, & pro vario quo lucis radii incidunt mòdo, cupri puri colore satis splendido variantes. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & inferiores caudæ tectrices ex cinereo fuscescunt : in pectore tamen & tectricibus caudæ inferioribus aliquid admiscetur ejusdem viridi-aurei quo dorsum perlustratur. Remiges minores sunt viridi-aureæ, cupri puri colore variantes : majores similiter imbutæ viridi-aureo, sed nonnihil saturatiore. Remiges corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim

cùm rectrices remigibus minoribus concolores. Binæ intermediæ lateralibus paululùm longitudine cedunt; laterales autem sensim atque sensim majorem obtinent longitudinem ad utrinque extimam usque binas intermedias trium linearum longitudine excedentem; unde cauda explicata nonnihil bifurca apparet. Rostrum fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigricantes. Juxta maris littora versatur. *Ex museo D. Mauduyt.*

tes en augmentant un peu de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté qui est plus longue de trois lignes que les deux du milieu; ce qui fait paroître la queue un peu fourchue, lorsqu'elle est étendue. Le bec est brun. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve aux bords de la mer. *Du cabinet de M. Mauduyt.*

5. LE COURLY MARRON.

Numenius splendidè castaneus; pectore viridi; rectricibus splendidè castaneis.... NUMENIUS CASTANEUS.

Arcuata minor, puniceo colore, pectore virescente. *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 40. *hujus icon satis accurata Tab.* 18.

Cum præcedente magnitudine & crassitie circiter convenit. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ scapulares, alas superne & infernè vestientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores splendido imbuuntur castaneo. Pectus eleganti tingitur viridi. Remiges eodem imbuuntur castaneo ac

Il est à peu près de la grosseur & de la grandeur du précédent. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont d'un marron brillant. La poitrine est d'un beau verd. Les plumes de l'aîle sont du même marron que celui du

reste du corps. Les plus proches du dos sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les plumes de l'aîle. J'ignore la couleur du bec & des pieds. On le trouve sur les bords du *Danube*.

reliquum corpus ipsum tingitur. Corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Cujus coloris sint rostrum & pedes, prorsus me latet. Juxta *Danubii* ripas versatur.

** 6. LE COURLY BRUN D'AMÉRIQUE.

Numenius castaneo-fuscus; capite, gutture & collo fuscis, lineolis longitudinalibus albidis variegatis; uropygio, pennis scapularibus & tectricibus alarum superioribus splendidè fuscis, viridi colore variantibus; rectricibus superne concoloribus, subtus penitùs fuscis . . . . . NUMENIUS AMERICANUS FUSCUS.

Rusticola maritima minor. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 147.
Guarauna. *Pison. Hist. Nat. pag.* 91, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*
Guarauna Brasiliensibus, Rusticola aquatica. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 204, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Jonst. Avi. pag. 139. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 59, *sub titulo*, Guara.
Guarauna Brasiliensibus Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 104. *N°.* 7.
Guarauna Brasiliensibus Marcgravii; Rusticula aquatica Brasiliensis. *Willugh. Ornith. pag.* 215. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LIII.*
Les Brasiliens l'appellent GUARAUNA. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Barr.*

Il est à peu près de la grosseur du *petit Courly*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux

Cum *Numenio minori* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem & novem pollices æquat, & ad extremos

ungues duos pedes & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque quatuor pollices, & ſex lineas longum eſt; cauda quatuor pollices & tres lineas; pars crurum plumis denudata octodecim lineas; pes tres pollices cum ſex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices, extimus duos pollices & ſex lineas, intimus duos pollices & quatuor lineas; poſticus autem ſexdecim lineas. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranâ nonnihil ultra primum articulum extenſâ, & cum digito intimo membranâ alterâ, ſolummodo ad primum articulum uſque protenſâ, connectitur. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt duorum pedum & ſeptem pollicum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam pertingunt. Caput, guttur & collum veſtiunt plumulæ in medio fuſcæ, in utroque latere albidæ; quò fit ut partes iſtæ lineolis longitudinalibus albidis variegatæ appareant. Dorſum, pectus, ventrem, crurum partem ſupremam & latera obtegunt pen-

pieds neuf lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a quatre pouces ſix lignes de long; ſa queue quatre pouces trois lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, dix-huit lignes; ſon pied trois pouces ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces, l'extérieur deux pouces ſix lignes, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derriere ſeize lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds ſept pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. La tête, la gorge & le col ſont couverts de petites plumes brunes, dans leur milieu, & blanchâtres ſur les deux côtés; ce qui rend ces parties variées de petites lignes longitudinales blanchâtres. Le dos, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés ſont d'un marron-brun. Les plumes ſcapulaires, le croupion, & les couvertures

du dessus & du dessous de la queue sont d'un brun brillant & changeant en verd, selon les différentes directions des rayons de lumiere. Les couvertures du dessous des aîles sont brunes. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un brun brillant & changeant en verd, comme les scapulaires : les grandes les plus éloignées du corps sont de la même couleur du côté extérieur, & tout-à-fait brunes du côté intérieur. Les plumes de l'aîle sont entiérement brunes, excepté en-dessus du côté extérieur, où elles sont d'un brun brillant & changeant en verd. Les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un brun brillant & changeant en verd en-dessus, & tout-à-fait brunes en dessous. Le bec est jaunâtre à son origine, & brun vers son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un gris-brun; & les ongles noirâtres. On le trouve au *Bresil*, & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Réaumur* par *M. des Essars*.

næ castaneo-fuscæ. Scapulares, uropygium, tectricesque caudæ superiores & inferiores sunt splendidè fuscæ, & secundùm varios ad lucem objectus, viridi colore variantes. Pennæ alas subtus cooperientes sunt fuscæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, splendidè fuscæ, & scapularium instar, viridi variantes: majores à corpore remotiores in latere exteriore concolores, in interiore penitùs fuscæ. Remiges quoque fuscæ, superne tamen in latere exteriore splendidè fuscescunt & viridi colore variant. Corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim constat rectricibus superne splendidè fuscis, viridi colore variantibus, subtus penitùs fuscis. Rostrum in exortu flavicans, versùs extremitatem fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedesque griseo-fusci; ungues verò nigricantes. Habitat in *Brasilia* & *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. des Essars*.

7. Le Courly varié du Mexique.

Numenius ſuperne purpureo, viridi & nigricante varius, infernè ſuſcus, rubro variegatus; capite anteriore nudo, albo-rubeſcente; collo fuſco, albo, viridi & fulveſcente vario; rectricibus viridibus, cupri puri colore variantibus; roſtro cyaneo; pedibus nigricantibus . . . . . Numenius Mexicanus varius.

Corvus aquaticus. *Euſ. Nieremb. pag.* 215.

Acacalotl, ſeu Corvus aquaticus. *Fern. Hiſt. Nov. Hiſp. pag.* 15. *Cap. IX. Jonſt. Avi. pag.* 127.

Acacalotl, ſeu Corvus aquaticus Nierembergii. *Willugh. Ornith. pag.* 218.

Acacalotl, ſeu Corvus aquaticus Hernandezii, Nierembergii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 104. *N°.* 5.

Les Mexiquains l'appellent Acacalotl. *Fern.*

Craſſitie præcedentem multùm antecellit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem tres circiter pedes æquat. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque octo pollices longum eſt. Crura, pedeſque, ſimul commenſurati, tredecim pollicum & ſex linearum longitudinem obtinent. Capitis anterior pars, à roſtro ſcilicet ultra oculos uſque, plumis denudatur, & cute tantummodo albo-rubeſcente obtegitur. Caput poſterius & collum veſtiunt pennæ fuſcæ, albæ & virides, quibuſdam ad fulvum vergentibus admixtis. Dorſum & uropygium purpureo, viridi & ni-

Il eſt beaucoup plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ trois pieds. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a huit pouces de long. Ses jambes & ſes pieds ſont, pris enſemble, longs de treize pouces ſix lignes. La partie antérieure de la tête, depuis le bec juſqu'au-delà des yeux, eſt dégarnie de plumes, & couverte ſeulement d'une peau d'un blanc-rougeâtre. La partie poſtérieure de la tête & le col ſont couverts de plumes brunes, blanches & vertes, & de quelques-unes qui tirent ſur le fauve. Le dos & le croupion ſont variés de pourpre, de verd &

de noirâtre, mêlés confusément ensemble, le tout étant fort brillant. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont variées des mêmes couleurs. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont couverts de plumes brunes, auxquelles sont mêlées quelques plumes rouges. Les couvertures du dessous de la queue sont pareillement brunes, & mêlées de quelques plumes rouges. Le dessous des aîles est d'un verd brillant & changeant, selon les différens jours auxquels il est exposé. Les couvertures du dessus des aîles sont vertes. Les plumes de l'aîle sont d'un verd brillant, & changeant en couleur de cuivre de rosette. Les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles des aîles. Les yeux sont noirs: leur iris est d'un rouge de sang. Le bec est bleu. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont noirâtres; & les ongles noirs. On le trouve au *Méxique*. Il se tient sur les bords des Lacs, & se nourrit de *Poissons*.

gricante confusè mixtis variegantur; omnes autem colores isti sunt valdè splendentes. Scapulares pennas & superiores caudæ tectrices iidem colores variegant. Pectus, ventrem, crurum partem supremam & latera cooperiunt pennæ fuscæ, pennis quibusdam rubris interfertis. Inferiores caudæ tectrices fusco quoque imbutæ, pennis quibusdam rubris similiter admixtis. Alæ subtus splendidè virides, & pro vario quo lucis radii incidunt modo, variantes. Superiores alarum tectrices virides. Remiges splendidè virides, cupri puri colore variantes. Corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Alam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Oculi sunt nigri: ipsorum irides sanguineæ. Rostrum cyaneum. Pars crurum plumis denudata, pedesque nigricantes; ungues verò nigri. *Habitat in Mexico.* Juxta Lacuum ripas versatur, & *Piscibus* victitat.

** 8. LE GRAND COURLY D'AMÉRIQUE.

Numenius albidus ; capite anteriore nudo, nigro-cœrulescente ; capite posteriore, & collo griseis ; uropygio nigro-virescente ; remigibus majoribus & rectricibus superne nigro-virescentibus, subtus nigris ; rostro fusco-rubescente ; pedibus nigris . . . . NUMENIUS AMERICANUS MAJOR.

Numenius niger. *Klein. Avi. pag.* 109. *N°. 6.*
Tantalus ; Loculator. *Klein. Avi. pag.* 127. *Lit. C.*
Linn. Systh. Nat. ed. 10. *Gen.* 75. *sp.* 1.
Curicaca. *Pison. Hist. Nat. pag.* 88, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*
Curicaca Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 191, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Jonst. Avi. pag. 131. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 57.
Curicaca Brasiliensium Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 218. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LIV.*
Raj. Syn. Avi. pag. 103. *N°.* 4.
Curiaca, Oiseau de Riviere. *Des March. Tom. III. pag.* 326.
Pélican Américain. *Catesb. Tom. I. pag.* 81 ; *avec une très-bonne figure Pl.* 81.
Les Portugais l'appellent MASARINO. *Marcgr. Pison. Jonst. Willugh. Raj. Klein.*
Les Anglois, WOOD PELICAN. *Catesb.*
Les Brasiliens, CURICACA. *Marcgr. Jonst. Willugh, Raj.*

Ad *Anseris* crassitiem accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & octo pollices æquat, & ad extremos ungues tres pedes duos pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem pollices & sex lineas longum est ; cauda quatuor pollices & novem lineas ; pars crurum plumis denudata tres polli-

Il est presqu'aussi gros qu'une *Oye*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf pouces six lignes de long ; sa queue quatre pouces neuf lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois pouces ; son pied

quatre pouces neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces trois lignes, l'extérieur deux pouces trois lignes, l'intérieur deux pouces une ligne; & celui de derriere dix-huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la premiere articulation. Il a trois pieds onze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des yeux, est dégarnie de plumes, & couverte seulement d'une peau d'un noir-bleuâtre. La partie postérieure de la tête & le col sont couverts de plumes grises. Celles qui couvrent la partie supérieure du dos, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés, ainsi que les plumes scapulaires & les couvertures du dessous de la queue, sont blanchâtres. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir-verdâtre. Les couvertures du dessous des

ces; pes quatuor pollices cum novem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & totidem lineas, extimus duos pollices & tres lineas, intimus duos pollices cum linea unica; posticus autem octodecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum productâ, coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum & undecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Capitis anterior pars, ab exortu rostri ultra oculos usque, plumis denudatur, & cute tantummodo nigro-cœrulescente obtegitur. Caput posterius & collum pennis vestiuntur griseis. Quæ partem dorsi supremam, pectus, ventrem, crurum supremam partem & latera obtegunt, sicut & scapulares, inferioresque caudæ tectrices, sunt albidæ. Dorsum infimum, uropygium & superiores caudæ tectrices ex nigro virescunt.

Pennæ

Pennæ alas subtus obtegentes sunt candicantes. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, candidæ: majores à corpore remotiores nigro-virescentes. Remiges majores superne ex nigro quoque virescunt, subtus sunt penitùs nigræ: minores candicantes. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus superne nigro-virescentibus, subtus penitùs nigris. Oculi sunt nigri: ipsorum irides rufescentes. Rostrum, quod versùs caput crassissimum, ex fusco rubescit. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. *Piscibus* & *Animalibus aquaticis* victitat. Habitat in *Carolina*, *Brasilia* & *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Artur.*

aîles sont blanchâtres. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont blanches: les grandes les plus éloignées du corps, sont d'un noir-verdâtre. Les grandes plumes de l'aîle sont en-dessus de cette derniere couleur, & tout-à-fait noires en-dessous: les moyennes sont blanchâtres. De ces dernieres, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un noir-verdâtre en-dessus, & tout-à-fait noires en-dessous. Les yeux sont noirs; & leur iris est roussâtre. Le bec, qui est très-gros vers la tête, est d'un brun-rougeâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. Il se nourrit de *Poissons* & d'*Animaux aquatiques*. On le trouve à *la Caroline*, au *Brésil* & à *Cayenne*; d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur.*

9. Le petit Courly d'Amérique.

Numenius albidus; capite anteriore nudo, nigro; capite posteriore, & collo griseis; uropygio nigro-virescente; re-

migibus majoribus & rectricibus ſuperne nigro-vireſcentibus, ſubtus nigris; roſtro fuſco-rubeſcente; pedibus pallidè rubris. . . . . NUMENIUS AMERICANUS MINOR.

Matuitui. *Piſon. Hiſt. Nat. pag.* 88.
Curicacæ alia ſpecies, Matuitui dicta. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 191.
Jonſt. Avi. pag. 131.
Willugh. Ornith. pag. 218.
Les Braſiliens l'appellent MATUITUI. *Marcgr. Jonſt. Willugh.*

Il eſt à peu près de la groſſeur d'une *Poule.* La partie antérieure de ſa tête, depuis l'origine du bec juſqu'au-delà des yeux, eſt dégarnie de plumes, & couverte ſeulement d'une peau noire. Le derriere de la tête & le col ſont couverts de plumes griſes Celles qui couvrent la partie ſupérieure du dos, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés, ſont blanchâtres. Les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſous des aîles & celles du deſſous de la queue ſont de la même couleur. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un noir-verdâtre. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont blanches : les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un noir-verdâtre. Les grandes plumes de l'aîle ſont en-deſſus de cette derniere couleur, & tout-à-fait noires en-deſſous :

Craſſitie *Gallinam* circiter æmulatur. Capitis anterior pars, ab exortu roſtri ultra oculos uſque, plumis denudatur, & cute tantummodo nigrâ obtegitur. Caput poſterius & collum veſtiunt pennæ griſeæ Quæ partem dorſi ſupremam, pectus, ventrem, crurum ſupremam partem & latera cooperiunt, ſunt albidæ. Scapulares, quæ alas ſubtus obtegunt, inferioreſque caudæ tectrices eodem colore imbutæ. Dorſi pars infima, uropygium & ſuperiores caudæ tectrices ſunt nigro-vireſcentes. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori viciniores, candidæ: majores à corpore remotiores nigro-vireſcentes. Remiges majores ſuperne ex nigro quoque vireſcunt, ſubtus verò ſunt penitùs nigræ: minores candicantes. Ex minoribus autem corpori finitimæ lon-

gæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices superne nigro-virescentes, subtus penitùs nigræ. Oculi sunt nigri : ipsorum irides rufescentes. Rostrum fusco-rubescens. Pars crurum plumis denudata, pedesque pallidè rubri : ungues verò nigri. Præcedentis instar, *Piscibus* & *aquaticis Animalibus* victitat. Habitat in *Brasilia*.

les moyennes sont blanchâtres. De ces dernieres, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un noir-verdâtre en-dessus, & tout-à-fait noires en-dessous. Les yeux sont noirs : leur iris est roussâtre. Le bec est d'un brun-rougeâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un rouge pâle ; & les ongles noirs. Il se nourrit, comme le précédent, de *Poissons* & d'*Animaux aquatiques*. On le trouve au *Brésil*.

** 10. Le Courly blanc du Brésil.

Numenius albus ; capite anteriore nudo, pallidè rubro ; remigibus quatuor majoribus apice nigro-virescentibus ; rectricibus candidis ; rostro, pedibusque pallidè rubris. . . . Numenius Brasiliensis candidus.

Numenius albus. *Klein. Avi. pag.* 109. *N°.* 3.
Scolopax rostro arcuato, pedibus rubris, corpore albo, alarum apicibus viridibus. Scolopax alba. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 2.
Corlieu blanc. *Catesb. Tom. I. pag.* 82 ; *avec une figure exacte Pl.* 82.
Les Anglois l'appellent White Curlew. *Catesb.*

Crassitie *Numenium minorem nostratem* multùm superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem unde-

Il est beaucoup plus gros que notre *petit Courly*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied onze pouces trois lignes, & jus-

qu'à celui des ongles de deux pieds deux pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six pouces de long; sa queue trois pouces neuf lignes; la partie des ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes; son pied deux pouces neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur deux pouces, l'intérieur un pouce dix lignes; & celui de derriere quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds huit pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des yeux, est dégarnie de plumes, & couverte seulement d'une peau d'un rouge pâle. Le derriere de la tête, le col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du

cim pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues duos pedes & totidem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex pollices longum est; cauda tres pollices & novem lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices cum novem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas, extimus duos pollices, intimus unum pollicem cum decem lineis; posticus autem quatuordecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & ad digitum intimum membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum protensâ, adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & octo pollicum; alæ verò complicatæ ferè ad extremitatem caudæ pertingunt. Capitis anterior pars, ab exortu rostri ultra oculos usque, plumis denudatur, & cute tantummodo pallidè rubrâ obducitur. Caput posterius, collum, universumque corpus vestiunt pennæ

albæ. Scapulares, quæ alas ſuperne & infernè obtegunt, tectricesſque caudæ ſuperiores & inferiores concolores. Remiges quatuor primores ſunt candidæ, attamen in apice ex nigro obſcurè vireſcunt : reliquæ omnes penitùs albent. Corpori viciniores, longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus candidis cauda conſtat. Oculorum irides eleganter griſeæ. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesſque pallidè rubri. *Fœmina* à *mare* nullo modo diſcrepat. Habitat in variis *Americæ* regionibus. A *Cayana* in *muſeum Realmurianum* miſſus à *D. des Eſſars.*

deſſus & du deſſous de la queue ſont de la même couleur. Les quatre premieres plumes de l'aîle ſont blanches, excepté leur extrémité, qui eſt d'un noir-verd obſcur : toutes les autres ſont entiérement blanches. Les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes blanches. L'iris des yeux eſt d'un joli gris. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont d'un rouge pâle. La *femelle* ne différe point du *mâle*. On le trouve en différens endroits de l'*Amérique*. Il a été envoyé de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. des Eſſars.*

** 11. Le Courly brun du Brésil.

Numenius ſuperne fuſcus, infernè albus ; capite anteriore nudo, pallidè rubro ; capite poſteriore & collo dilutè fuſcis ; uropygio candido ; rectricibus fuſcis ; roſtro, pedibuſque pallidè rubris. . . . . Numenius Brasiliensis fuscus.

Numenius fuſcus. *Klein. Avi. pag.* 109. *N°.* 4.
Arquata cinerea. *Barr. Hiſt. Fr. Eq. pag.* 126.
Arquata Americana cinerea. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. IX. ſp.* 5.
Scolopax roſtro arcuato, pedibus rubris, corpore fuſco, cauda baſi alba. Scolopax fuſca. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *ſp.* 3.
Corlieu brun. *Catesb, Tom. I. pag.* 83 ; *avec une figure exacte Pl.* 83.

Les François de la Guiane l'appellent FLAMANT GRIS. *Barr.*
Les Anglois, BROWN CURLEW. *Catesb.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'un pied onze pouces, & juſqu'à celui des ongles de deux pieds un pouce neuf lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a ſix pouces de long; ſa queue trois pouces ſept lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quatorze lignes; ſon pied deux pouces huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces ſix lignes, l'extérieur deux pouces, l'intérieur un pouce dix lignes; & celui de derriere quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds ſept pouces ſix lignes de vol; & ſes ailes, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec juſqu'au-delà des

Cum præcedente craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam unum pedem & undecim pollices explet, & ad extremos ungues duos pedes unum pollicem & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ſex pollices longum eſt; cauda tres pollices & ſeptem lineas; pars crurum plumis denudata quatuordecim lineas; pes duos pollices cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & ſex lineas, extimus duos pollices, intimus unum pollicem cum decem lineis; poſticus autem quatuordecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extenſâ, & digito intimo membranâ alterâ, ſolummodo ad primum uſque articulum productâ, coadunatur. Alis expanſis, extremitates majorum remigum duorum pedum ſeptem pollicum & ſex linearum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam ferè extre-

mam attingunt. Capitis anterior pars, ab exortu rostri ultra oculos usque, plumis denudatur, & cute tantummodo pallidè rubrâ obtegitur. Caput posterius & collum pennis vestiuntur dilutè fuscis. Dorsi suprema pars, pennæ scapulares, alas superne cooperientes & superiores caudæ tectrices sunt fuscæ. Dorsum infimum, uropygium, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices albicant. Pennæ alas subtus obtegentes sunt dilutè fuscæ. Remiges fusco saturatiore tinctæ. Corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus fuscis cauda conflatur Oculorum irides eleganter griseæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedesque pallidè rubri; ungues verò fusci. *Fœmina* cum *mare* satis benè convenit. Habitat in variis *Americæ* regionibus A *Cayana* in *museum Realmurianum* missus à *D. des Essars*.

yeux, est dégarnie de plumes, & couverte seulement d'une peau d'un rouge pâle. La partie postérieure de la tête & le col sont couverts de plumes d'un brun clair. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont brunes. La partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un brun clair. Les plumes de l'aîle sont d'un brun plus foncé. Les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes brunes. L'iris des yeux est d'un joli gris. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un rouge pâle; & les ongles bruns. La *femelle* ressemble assez bien au *mâle*. On le trouve en différens endroits de l'*Amérique*. Il a été envoyé de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

** 12. Le Courly rouge du Brésil.

Voyez Pl. XXIX. Fig. 1. & celui du moyen âge Fig. 2.

Numenius coccineus; capite anteriore nudo, pallidè rubro; remigibus binis majoribus apice nigro-chalybeis; rectricibus coccineis, ſcapis primâ medietate albis; roſtro, pedibuſque pallidè rubris. . . . . Numenius Brasiliensis coccineus.

Numenius ruber. *Klein. Avi. pag.* 109. *N°.* 5.
Numenius Indicus. *Cluſ. exot. Auctuar. pag.* 366, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Arquata phœnicea. *Barr. Hiſt. Fr. Eq pag.* 126.
Arquata Americana phœnicea. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. IX. ſp.* 6.
Scolopax roſtro arcuato; pedibus rubris, corpore ſanguineo, alarum apicibus nigris. Scolopax rubra. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *ſp.* 1.
Guara. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag.* 575.
Jonſt. Avi. pag. 151.
Guara Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 203, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
• *Jonſt. Avi. pag.* 139. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 58.
Guara Braſilienſibus Marcgravii. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 317. *N°. VIII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 104. *N°.* 6.
Guara Braſilienſibus Marcgravii; Numenius Indicus Cluſii. *Willugh. Ornith. pag.* 219. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LIV.*
Guara Braſilianis dicta. *Charlet. Exer. pag.* 119. *N°. III.*
Charlet. Onomazt. pag. 116. *N°. III.*
Avis Braſiliana Guara dicta. *Muſ. Worm. pag.* 308, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*
Ibis. *Moehr. Avi. Gen.* 80.
Ardea porphyrio. *Klein. Avi. pag.* 124. *N°.* 11.
Avis porphyrio, Amboinenſis; ſeu Ardea rubra, Carollina, Ibidis ſpecies. *Seb. Vol. I. pag.* 98. *hujus icon ſatis accurata Tab. LXII. fig.* 3.
Corlieu rouge. *Catesb. Tom. I. pag.* 84; *avec une figure exacte Pl.* 84.
Les François de la Guiane l'appellent Flamant rouge. *Barr.*
Les Anglois, Scarlet Curlew of Brasil. *Charlet.* Red-Curlew. *Catesb.*
Les Braſiliens, Guara. *Marcgr. Jonſt. Willugh. Raj. Charlet.*

Numenio

Numenio Brasiliensi candido paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem novem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem undecim pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor pollices & novem lineas longum est; cauda tres pollices & decem lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes duos pollices & octo lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices cum sex lineis; extimus duos pollices, intimus unum pollicem & decem lineas; posticus autem quatuordecim lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & cum digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum protensâ, connectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum septem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt.

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Courly blanc du Brésil.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces neuf lignes de long; sa queue trois pouces dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce; son pied deux pouces huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur deux pouces, l'intérieur un pouce dix lignes; & celui de derriere quatorze lignes Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds sept pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des yeux, est dégarnie de plumes, & couverte seulement d'une peau d'un

rouge pâle. Le derriere de la tête, le col & tout le corps sont couverts de plumes d'un rouge très-vif & très-éclatant. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Toutes les plumes de l'aîle sont du même rouge que celui du corps ; mais les grandes ont leur tige blanche depuis leur origine jusque vers leur extrémité ; & les moyennes ont aussi leur tige blanche, mais seulement depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur : de plus les deux premieres plumes de l'aîle sont terminées d'un noir brillant comme l'acier poli, & cela dans l'espace de deux pouces du côté extérieur, & d'un pouce neuf lignes du côté intérieur. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes du même rouge que celui des plumes de l'aîle, & qui ont leur tige blanche depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur. Les yeux sont noirs. Le bec, la partie des jambes

Capitis anterior pars, ab exortu rostri ultra oculos usque, plumis denudatur, & cute tantummodo pallidè rubrâ obtegitur. Capitis pars posterior, collum, universumque corpus pennis vestiuntur splendidissimè coccineis. Scapulares, quæ alas superne & infernè obtegunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores eodem colore perlustrantur. Remiges alarum omnes eodem imbuuntur coccineo ac corpus ipsum tingitur; majores tamen scapis donantur ab ipsarum exortu versùs extremitatem usque candidis; minores verò scapis quidem albis præditæ sunt, sed tantummodo ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque : binæ insuper primores remiges sunt in apice nigro-chalybeæ, idque in latere exteriore per spatium duorum pollicum, in interiore verò per unius pollicis & novem linearum intervallum. Remiges corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices eodem imbutæ coccineo ac

ipsæ remiges, & quarum scapi ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque albent. Oculi sunt nigri. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedesque pallidè rubri; ungues verò griseo-fusci.

qui est dégarnie de plumes & les pieds sont d'un rouge pâle; & les ongles gris-bruns.

Hæc Avis primùm exclusa coloris est in universo corpore saturatè fusci; hinc evadit grisea; deinde, ætate provectâ, alba efficitur, & tandem sensim atque sensim rubescit; ita tamen ut rubescere incipiat antequam griseus color penitùs deleatur; unde fit ut secundo ætatis anno griseo, albo & rubro sit variegata : & tandem, dum magìs magìsque senescit, splendidissimum illum colorem coccineum acquirit.

Cet Oiseau, en naissant, est entiérement d'un brun foncé; ensuite il devient gris; après quoi, à mesure qu'il avance en âge, il passe à la couleur blanche, & enfin peu à peu devient rouge; mais de façon que le rouge commence à paroître avant que le gris soit entiérement disparu; de sorte que dans la seconde année de son âge il est varié de gris, de blanc & de rouge : enfin en vieillissant il devient d'un rouge très-vif & très-éclatant.

Habitat in variis *Americæ* regionibus inter Tropicos positis, præsertim *Brasilia* & *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. des Essars*.

On le trouve en différens endroits de l'*Amérique*, entre les Tropiques, sur-tout au *Brésil*, & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

13. L'Ibis.

Numenius niger; capite anteriore nudo, rubro; rectricibus nigris; rostro, pedibusque rubris. . . . . Ibis.

Numenius holosericus. *Klein. Avi. pag.* 110. *N°.* 9.
Ardea capite lævi, corpore albo, rostro flavescente apice pedibusque nigris. Ibis nigra. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 18. *var.* β.

Gallinago sylvestris aquatica. *Gaz. Rup. Besl. hujus icon non satis accurata Tab.* 19.

Mus. Besl. pag. 31. *N°.* 2. *hujus icon non satis accurata Tab. VIII. N°.* 2.

Jonst. Avi. pag. 160.

Ibis. *Gesn. Avi. pag.* 567.

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 312. *hujus icon non satis accurata pag.* 313.

Jonst. Avi. pag. 101. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 50.

Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 199.

Moehr. Avi. Gen. 80.

Ibis nigra. *Bell. Obs. pag.* 103.

Charlet. Exer. pag. 108. *N°. II.*

Charlet. Onomazt. pag. 102. *N°. II.*

Ibis nigra Bellonii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 98.

Ibis Bellonii. *Willugh. Ornith. pag.* 212. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XLIX.*

Ibis. *Bel. Hist. nat. des Oiss. pag.* 199, *avec une figure peu exacte pag.* 200.

Espece de Cigogne noire. *Bel. Portr. d'Oiss. pag.* 44 *b, dans laquelle est la même figure.*

Les Grecs l'appellent Ἶβις. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Egyptiens, LEHERAS *ou* JEHERAS. *Aldrov.*

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Courly*. La partie antérieure de sa tête, depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des yeux, est dégarnie de plumes, & couverte seulement d'une peau rouge. Le derriere de la tête, le col & tout le corps sont couverts de plumes noires. Les plumes de l'aîle & celles de la queue sont de la même couleur. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, &

Numenio paululùm crassitie cedit. Capitis anterior pars, ab exortu rostri ultra oculos usque, plumis denudatur, & cute tantummodo rubrâ obducitur. Capitis posteriorem partem, collum & corpus universum vestiunt pennæ nigræ. Remiges, sicut & rectrices, eodem imbuuntur colore. Remiges corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedesque rubri sunt coloris;

ungues verò nigri. Habitat in *Ægypto.*

les pieds sont rouges; & les ongles noirs. On le trouve en *Egypte.*

14. L'IBIS BLANC.

Numenius sordidè albo-rufescens; capite anteriore nudo, rubro; lateribus rubro-purpureo & carneo colore maculatis; remigibus majoribus nigris; rectricibus sordidè albo-rufescentibus; rostro in exortu dilutè luteo, in extremitate aurantio; pedibus griseis. . . . . IBIS CANDIDA.

Ardea capite lævi, corpore albo, rostro flavescente apice pedibusque nigris. Ibis. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 18.

Ardea capite lævi, corpore albo, remigibus duabus primis margine exteriore fuscis. Ardea æquinoctialis. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76, *sp.* 19.

Ibis non ex toto nigra. *Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag.* 199.

Ibis blanc. *Hist. de l'Acad. Tom III. Part. III. pag.* 61; *avec une figure assez exacte Pl.* 13.

Ciconiæ albæ crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes sex pollices & quatuor lineas æquat, & ad extremos ungues tres pedes & sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem pollices longum est; cauda tres pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata quatuor pollices cum quinque lineis; pes septem pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & novem lineas, extimus duos pollices & octo lineas, intimus duos pollices cum tribus li-

Il n'est pas si gros que la *Cigogne blanche.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds six pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds six pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept pouces de long; sa queue trois pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre pouces cinq lignes; son pied sept pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces neuf lignes, l'extérieur deux pouces huit lignes, l'intérieur deux pouces trois lig-

nes ; & celui de derriere quinze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des yeux, est dégarnie de plumes, & couverte seulement d'un peau rouge & ridée. Le derriere de la tête, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont d'un blanc sale & roussâtre. Les côtés sont de la même couleur, & variés de taches, dont les unes sont d'un rouge-pourpré, & les autres de couleur de chair. Les grandes plumes de l'aîle sont noires : les moyennes sont d'un blanc sale & roussâtre. De celles-ci, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La

neis; posticus autem quindecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, tantummodo ad primum usque articulum protensâ, coadunatur. Alæ complicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Capitis anterior pars, ab exortu rostri ultra oculos usque, plumis denudatur, & cute tantummodo rubrâ & rugosâ obtegitur. Caput posterius, collum, dorsum, uropygium, pectus, venter, crurum suprema pars, pennæ scapulares, quæ alas superne & infernè cooperiunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores ex sordidè albo rufescunt. Latera eodem colore tinguntur, & maculis variegantur, aliis rubro-purpureis, alteris carneo colore imbutis. Remiges alarum majores sunt nigræ : minores sordidè albo-rufescentes. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim constatur rectricibus



1. Petit Courly ou Corlieu. 2. Courly verd.



Dessiné et Gravé par Martinet.

Courly de Madagascar.

1. Courly rouge du Brésil.

2. Courly rouge du Brésil, du moyen âge.

ſordidè albo-rufeſcentibus. Roſtrum, quod in exortu ſeſquipollicis diametrum obtinet, eſtque in extrémitate quaſi truncatum, eſt in exortu dilutè luteum; qui color magìs magìſque fit ſaturatior, & tandem versùs roſtri extremitatem aurantius evadit. Pars crurum plumis denudata rubra. Pedes ſunt griſei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Ægypto.*

queue eſt compoſée de douze plumes d'un blanc ſale & rouſſâtre. Le bec, qui a à ſon origine un pouce & demi de diametre & eſt comme tronqué à ſon extrémité, eſt d'un jaune clair à ſon origine; cette couleur devient de plus en plus foncée, & eſt orangée vers l'extrémité du bec. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, eſt rouge. Les pieds ſont gris; & les ongles noirâtres. On le trouve en *Egypte.*

SECTIO VII.

Eæ quæ roſtrum habent rectum, horizontaliter planum; ipſius apice ampliato, ſubrotundo, ſpathæformi.

IN illa ſectione unicum continetur genus, ſcilicet *Plateæ.*

SECTION VII.

Ceux qui ont le bec droit, plat horizontalement; & dont le bout eſt plus large & arrondi en forme de ſpatule.

CETTE ſection ne contient qu'un ſeul genre, ſçavoir celui de la *Spatule.*

LXXIX.

Genus Plateæ.

Hujus character eſt

Digiti quatuor, membranis deſtituti; tres ſcilicet antici, poſticus unus:

Crura in parte inferiore plumis denudata;

LXXIX.

Le genre de la Spatule.

Son caractere eſt d'avoir

Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:

Le bec droit, plat horizontalement; & dont le bout eſt plus large & arrondi en forme de ſpatule.

Roſtrum rectum, horizontaliter planum; ipſius apice ampliato, ſubrotundo, ſpathæformi.

** La Spatule.

Platea criſtata, in toto corpore candida; oculorum ambitu & gutture nudis, nigris. . . . . Platea.

Platea candida. *Barr. Ornith Claſſ. III. Gen. XXIX. ſp.* 1.
Platea. *Linn. Syſth. Nat. ed. 6. Gen.* 48. *ſp.* 1.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 341.
Platea, Leucorodius Willughbeii. *Klein. Avi. pag.* 126. *N°.* 1.
Platea, ſive Pelecanus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 212. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 102. *N°.* 1.
Sibbald. Scot. illuſtr. Part. II. Lib. III. pag. 18.
Platea ſive Pelicanus Aldrovandi; Leucorodius, ſeu Albardeola Willughbei. *Marſil. Danub. Tom. V. pag.* 28. *hujus icon ſatis accurata Tab.* 12.
Platalea corpore albo. Leucorodia. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 73. *ſp.* 1.
Pelecanus. *Geſn. Avi. pag.* 665. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 666.
Moehr. Avi. Gen. 60.
Pelecanus, Platea, vel Platalea. *Geſn. icon. Avi. pag.* 92, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Pelicanus Geſneri; Platea Plinii; Platelea Ciceronis; Anſer Cochlearius; Cochlearia; Anſer platorynchos; Albardeola; Leucorodius. *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag.* 407.
Albardeola. *Muſ. Worm. pag.* 310.
Albardeola, Platea Plinii, Platelea Ciceronis, quam Pelecanum facit Ornithologus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 384. *hujus icon ſatis accurata pag.* 385; *& altera icon minùs accurata pag.* 386.
Platyrinchos. *Muſ. Beſl. pag.* 36. *N°.* 4. *hujus capitis icon ſatis accurata Tab. IX. N°.* 4.
Ardea alba. *Jonſt. Avi. pag.* 103. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 46, *ſub titulo*, Pelicanus, ſive Platea.
Ardea alba, Cochlearia, Plateola. *Charlet. Exer. pag.* 109. *N°.* 2.
Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°.* 2.
Anas roſtro plano, apice dilatato, rotundatoque. *Faun. Suec. Linn. N°.* 87.

Πελεκάνος,

Πελεκᾶνος, Arist. *Schwenck. Klein.*

Pallette. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. III. pag.* 23; *avec une figure exacte Pl.* 5.

Pale, Poche & Cueiller. *Bel. Hist. Nat. des Ois. pag.* 194, *dans laquelle il y a une figure peu exacte.*

Pale, Poche, Cueiller, Truble. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 43 *a, dans laquelle est la même figure.*

Pélican. *Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag.* 173; *avec une figure passable pag.* 172. *N°.* 4.

Petit Héron, ou Bec à Cuiller. *Alb. Tom. II. pag.* 42; *avec une mauvaise figure Pl. 66.*

Les Hébreux l'appellent KAATH. *Gesn.*

Les Grecs, Πελεκάν. *Gesn. Schwenck.* Λευκορωδιός. *Bel. Aldrov.* Λευκοροδιός. *Jonst.*

Les Catalans, PELLICANO. *Bar.*

Les Italiens, BECQUAROVEGLIA. *Bel.* BECCAROVEGLIA. *Gesn. Aldrov. Marsil. Klein.*

Les Allemands, PELECAN. *Schwenck.* PELICAN. *Rzac.* LOEFFLER. *Gesn. Aldrov. Schwenck.*

Les Allemands aux environs de Cologne, LEFLER. *Gesn. Aldrov.*

Les Silésiens, LOEFFEL-GANS. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Worm. Besl. Rzac.*

Les Suisses, SCHUFLER. *Aldrov.*

Les Hollandois, LEEPELAER. *Aldrov.*

Les Flamands, LEPELAER. *Willugh. Raj. Sibbald. Klein.*

Les Frisons, LEPLER. *Gesn. Aldrov.*

Les Illyriens, BUCACZ. *Gesn.*

Les Polonois, PELIKAN; PLASKONOS. *Rzac.*

Les Russiens, CALPETRE. *Klein.*

Les Suédois, PELEKAN. *Linn.*

Les Anglois, PELLICANE. *Raj.* SPOON-BILL. *Willugh. Raj. Alb.* WHITE AND SPOON-BILL'D HERON; SCHOVELER; MIRE-DRUMBEL. *Charlet.* SCHOVELARD; SCHOFLER. *Aldrov.*

Les Hollandois du Cap de Bonne Espérance, SLANGEN-VREETER. *Kolbe.*

Cum *Ardea vulgari* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes & octo pollices æquat, & ad extremos ungues tres pedes & duos pollices. Rostrum ab ipsius ex-

Elle est à peu près de la grosseur du *Héron ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins

de la bouche a six pouces cinq lignes de long; il est large de sept lignes vers le milieu de sa longueur, & d'un pouce sept lignes vers son extrémité, qui est la partie arrondie en forme de spatule. Sa queue a quatre pouces neuf lignes de long; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois pouces six lignes; son pied quatre pouces sept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces une ligne, l'extérieur deux pouces sept lignes, l'intérieur deux pouces trois lignes, & celui de derriere dix-huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend presque jusqu'à la seconde articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui s'étend seulement jusqu'à la premiere articulation. Elle a quatre pieds quatre pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La gorge & le tour des yeux sont dégarnis de plumes, & couverts seulement d'une peau noire. Le reste de la tête, le col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous

tremitate ad oris angulos usque sex pollices & quinque lineas longum est; versùs mediam longitudinem septem lineas latum, & versùs ipsius extremitatem, quæ pars est subrotunda & spathæformis, unius pollicis & septem linearum latitudinem obtinens. Cauda quatuor pollices & novem lineas longa; pars crurum plumis denudata tres pollices cum sex lineis; pes quatuor pollices & septem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum linea una, extimus duos pollices & septem lineas, intimus duos pollices cum tribus lineis; posticus autem octodecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ferè ad secundum usque articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum productâ, coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuor pedum & totidem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Guttur & oculorum ambitus plumis denudantur, & tantum

modo cute nigrâ obſiti ſunt. Reliquum caput, collum & univerſum corpus veſtiunt pennæ candidæ. Scapulares, alas ſuperne & infernè veſtientes, tectriceſque caudæ ſuperiores & inferiores concolores. Pennæ in occipitio ſunt ſtrictiſſimæ, quatuor pollices & tres lineas longæ, elegantemque criſtam, collo incumbentem, efformant. Remiges omnes ſunt candidæ. (In quibuſdam majores nigro terminantur). Secunda reliquas omnes longitudine excedit. Duodecim rectricibus candidis cauda conſtat. Roſtrum in quibuſdam griſeo-fuſcum; in aliis nigrum; in alteris versùs ipſius exortum griſeo-fuſcum, maculis nigris aſperſum, & versùs extremitatem flavicans, maculis rubeſcentibus reſperſum. Mandibulæ ſuperioris extremitas paululùm deorſum incurvatur, & mandibulæ inferioris extremitatem obtegit. Supra mandibulam ſuperiorem in toto ambitu canaliculus extat circumferentiæ parallelus. Pars crurum plumis denudata, pedeſque in aliis nigri, in alteris griſeo-fuſci; ungues verò nigri. *Piſcibus* victitat, & in excelſarum arborum cacuminibus nidificat. *Ex muſeo Realmuriano.*

des aîles, & celles du deſſus & du deſſous de la queue ſont de la même couleur. Les plumes qui couvrent l'occiput, ſont fort étroites, longues de quatre pouces trois lignes, & forment une jolie hupe, qui retombe ſur le col. Toutes les plumes de l'aîle ſont blanches. (Dans quelques-unes les plus grandes ſont terminées de noir). La ſeconde eſt la plus longue de toutes. La queue eſt compoſée de douze plumes blanches. Le bec eſt d'un gris-brun dans quelques-unes; dans d'autres il eſt noir; & dans d'autres il eſt vers ſon origine d'un gris-brun ſemé de taches noires, & vers ſon extrémité il eſt jaunâtre, ſemé de taches rougeâtres. Le bout de la mandibule ſupérieure eſt un peu recourbé en-deſſous, & recouvre celui de la mandibule inférieure. Sur le demi-bec ſupérieur regne tout autour une rainure parallele à ſa circonférence. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont noirs dans les unes & d'un gris-brun dans d'autres : les ongles ſont noirs. Elle ſe nourrit de *Poiſſons*, & fait ſon nid au ſommet des grands arbres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. La Spatule couleur de rose.

Voyez Pl. XXX.

Platea rosea; capite anteriore & gutture nudis, candicantibus; collo supremo candido; tectricibus caudæ superioribus & inferioribus coccineis; rectricibus roseis. . . . . Platea rosea.

Platea Americana, albo roseoque colore mixta. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXIX. sp.* 2.
Platea Brasiliensis. *Klein. Avi. pag.* 126. *N°.* 2.
Platea Brasiliensis Ajaia dicta Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 102. *N°.* 3.
Platea Brasiliensis, Ajaia dicta, Lusitanis Colherado, Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 213.
Platalea corpore sanguineo. Ajaja. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 73. *sp.* 2.
Ardea rosea, Spatula dicta. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 124.
Ajaia Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 204.
Jonst. Avi. pag. 139.
Ayaya. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag.* 575.
Jonst. Avi. pag. 150.
Les François de la Guiane l'appellent Spatule; Espatule. *Barr.*
Les Portugais, Colherado. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Klein.*
Les Flamands, Lepelaer. *Marcgr. Jonst.*
Les Brasiliens, Ajaia. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Elle n'est pas si grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds trois pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds huit pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces cinq lignes de long; il est large de huit lignes & demie vers le milieu de sa

Præcedenti crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes tres pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues duos pedes octo pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque quinque pollices & totidem lineas longum est, versùs mediam longitudinem

ctto cum semi lineas latum, & versùs ipsius extremitatem, quæ pars est subrotunda & spathæformis, unius pollicis & decem linearum latitudinem obtinens. Cauda tres pollices & novem lineas longa; pars crurum plumis denudata duos pollices & quatuor lineas; pes tres pollices cum sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum linea una, extimus duos pollices & novem lineas, intimus duos pollices cum quatuor lineis; posticus autem octodecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ferè ad secundum usque articulum extensâ, & ad digitum intimum membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum protensâ, adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum & undecim pollicum; alæ vero complicatæ caudæ extremitatem pertingunt. Capitis universa pars anterior, ab exortu rostri ultra oculos usque, sicut & guttur, plumis denudatur, & tantummodo cute candicante oblita est. Caput pos-

longueur, & d'un pouce dix lignes vers son extrémité, qui est la partie arrondie en forme de spatule. Sa queue a trois pouces neuf lignes de long; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces quatre lignes; son pied trois pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces une ligne; l'extérieur deux pouces neuf lignes, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derriere dix-huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend presque jusqu'à la seconde articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui s'étend seulement jusqu'à la premiere articulation. Elle a trois pieds onze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Toute la partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des yeux, & la gorge sont dégarnies de plumes, & couvertes seulement d'une peau blanchâtre. Le derriere de la tête, & le col depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur, sont couverts de très-petites plumes blanches. Le

reste du col & la poitrine sont d'un blanc mêlé d'une légere teinte de couleur de rose, avec un peu de couleur de rose plus foncé à la partie inférieure du col immédiatement au-dessus de la poitrine. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, le ventre, les côtés, le haut des jambes, & les couvertures du dessous des aîles sont de couleur de rose; il y a cependant vers le bas des côtés quelques plumes d'un rouge très-vif. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les plus petites couvertures du dessus des aîles sont de ce même rouge vif: les moyennes & les grandes, ainsi que toutes les plumes de l'aîle, sont de couleur de rose. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec est d'un gris-blanc. Comme dans la précédente, le bout de la mandibule supérieure est un peu recourbé en-dessous, & recouvre celui de la mandibule inférieure. Sur le demi-bec supérieur regne aussi tout autour une rainure parallele à sa circonférence. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont gris; & les ongles noirâtres. On la trouve au *Brésil* & dans *la Guiane*. Elle a été envoyée de

terius, collumque ab ipsius exortu versus duas tertias longitudinis partes usque vestiunt minutissimæ plumulæ candidæ. Reliquum collum & pectus albicant, & aliquid rosei admixtum habent; qui color roseus in parte colli inferiore immediatè supra pectus est paulò saturatior. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque alarum tectrices roseo colore tinguntur; attamen versùs laterum partem infimam quædam extant pennæ splendidè coccineæ. Quæ caudam superne & infernè cooperiunt, & tectrices alarum superiores minimæ sunt similiter coccineæ: mediæ & majores, sicut & remiges omnes, roseæ. Duodecim rectricibus concoloribus cauda conflatur. Rostrum cinereo-album. Præcedentis instar, mandibulæ superioris extremitas paululùm deorsum incurvatur, & mandibulæ inferioris extremitatem obtegit. Supra mandibulam superiorem in toto ambitu canaliculus similiter extat circumferentiæ parallelus. Pars crurum plumis denudata, pedesque sunt grisei; ungues verò ni-

gricantes. Habitat in *Brasilia* & *Guiana.* A *Cayana* in *museum Realmurianum* missa est à *D. Artur.*

Cayenne à *M. de Reaumur* par *M. Artur.*

3. La Spatule rouge.

Platea coccinea; capite anteriore & gutture nudis, candicantibus; torque nigro; collo supremo candido; rectricibus coccineis. . . . . Platea coccinea.

Platea incarnata. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 316. *N°. VII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 189. *N°.* 5.
Platea Americana Phœnicea. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXIX. sp.* 3.
Platea sanguinea tota. *Klein. Avi. pag.* 126. *N°.* 3.
Platalea corpore sanguineo. Tlauhquechul s. Platea Mexicana. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 73. *sp.* 2. *var. β.*
Ardea phœnicea, Spatula dicta. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 125.
Avis vivivora. *Eus. Nieremb. pag.* 214.
Tlauhquechul. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag.* 49. *cap. CLXXVIII.*
Jonst. Avi. pag. 126.
Tlauhquechul, seu Platea Mexicana Nierembergii. *Willugh. Ornith. pag.* 213.
Tlauhquechul, seu Platea Mexicana Hernandezii, Nierembergii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 102. *N°.* 2.
Tlauquechul. *Charlet. Exer. pag.* 119. *N°. II.*
Charlet. Onomazt. pag. 116. *N°. II.*
Les François de la Guiane l'appellent Spatule rouge; Espatule rouge. *Barr.*
Les Portugais, Colherado. *Sloane. Raj.*
Les Flamands, Lepelaer. *Sloane. Raj.*
Les Anglois, American Scarlet Pelecan; American Scarlet Spoon-bill. *Sloane. Raj.* Scarlet Spoon-bill'd Bird of America. *Charlet.*
Les Mexiquains, Tlauhquechul. *Fern.*
Les Brasiliens, Aiaia. *Sloane. Raj.*

Cum præcedente crassitie convenit, & forsan illius est varietas. Caput anterius, ab exortu rostri ultra oculos

Elle est de la grosseur de la précédente, & en est peut-être une variété. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du

bec jusqu'au-delà des yeux, & la gorge sont dégarnies de plumes, & couvertes seulement d'une peau blanchâtre & ridée. Le derriere de la tête, & le col depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur, sont couverts de petites plumes blanches; il y a cependant une assez large bande noire, qui sépare la tête du col, & forme une espece de collier. Le reste du col & tout le corps, ainsi que les aîles & la queue, sont d'un rouge très-vif. La prunelle des yeux est noire: leur iris est rouge. Le bec est gris. Le bout de la mandibule supérieure est un peu recourbé en-dessous, & recouvre celui de la mandibule inférieure. Sur le demi-bec supérieur regne tout autour une rainure parallele à sa circonférence. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont gris; & les ongles noirâtres. On la trouve dans *la Guiane* au *Mexique* & à *la Jamaïque*.

usque, & guttur plumis denudantur, & tantummodo candicante & rugosâ cute obsita sunt. Capitis posteriorem partem, collumque ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes, vestiunt plumulæ candidæ; attamen latiuscula extat tænia nigra, caput à collo distinguens, & torquem quodammodo efformans. Reliquum collum, universumque corpus, sicut & alas caudamque, tingit color splendidè coccineus. Oculorum pupilla nigra: ipsorum irides rubræ. Rostrum griseum. Mandibulæ superioris extremitas nonnihil deorsum incurvatur, & mandibulæ inferioris extremitatem cooperit. Supra mandibulam superiorem in toto ambitu canaliculus extat circumferentiæ parallelus. Pars crurum plumis denudata, pedesque grisei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Guiana*, *Mexico* & *Jamaica*.

SECTIO VIII.



Dessiné et Gravé par Martinet.

Spatule couleur de rose.

SECTIO VIII.

Quæ rostro donantur crasso longo.

In illa sectione tria continentur genera Avium, formâ rostri à se invicem discrepantium. Aliæ enim rostrum habent rectum, acutum; inter quas aliæ rostro donantur levi, ut *Ciconia*: alteræ mandibulâ superiore sulco longitudinali utrinque exaratâ præditæ sunt, ut *Ardea*: aliæ rostrum habent rectum, lateraliter planum, mandibulæ superioris apice adunco, ut *Scopus*.

SECTION VIII.

Ceux qui ont le bec gros & long.

Cette Section contient trois genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la forme du bec. Les uns ont le bec droit & pointu; & parmi ceux-là les uns ont le bec lisse, comme la *Cigogne* : & les autres ont une rainure longitudinale de chaque côté sur la mandibule supérieure, comme le *Héron* : d'autres ont le bec droit, applati par les côtés, le bout de la mandibule supérieure étant crochu, comme l'*Ombrette*.

LXXX.

Genus Ciconiæ.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Rostrum crassum, longum, rectum, acutum, leve.

LXXX.

Le genre de la Cigogne.

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec gros, long, droit, pointu & lisse.

** 1. La Cigogne brune.

Voyez Pl. XXXI.

Ciconia superne fusca, violaceo & viridi-aureo varians, infernè alba; gutture & collo fuscis, maculis candicantibus variegatis; rectricibus fuscis, violaceo & viridi colore variantibus . . . . Ciconia fusca.

Ciconia nigra. *Gesn. Avi. pag.* 273, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Gesn. icon. Avi. pag. 122, *in qua eadem icon.*
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 310. *hujus icon non satis accurata pag.* 311.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 236.
Muf. Worm. pag. 306.
Jonst. Avi. pag. 101. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 50.
Willugh. Ornith. pag. 211. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 97. *N°.* 2.
Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 372.
Linn. Syst. Nat. ed. 6. *Gen.* 55. *sp.* 5.
Ciconia nigra Willughbeii. *Klein. Avi. pag.* 125. *N°.* 2.
Ciconia fusca Schwenckfeldii. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 372.
Ardea nigra; pectore abdomineque albo. *Faun. Suec. Linn. N°.* 135.
Ardea nigra, pectore abdomineque albo. Ciconia nigra. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 8.
Ardea ventre subalbo, dorso nigro. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 9.
Cigogne noire. *Bel. Portr. d'Oif. pag.* 45 *b*, *dans laquelle il y a une figure très-peu exacte.*
Alb. Tom. III. pag. 34; *avec une figure mal coloriée Pl.* 82.
Les Grecs l'appellent Πέλαργος μέλας. *Bel.*
Les Allemands, Schwartzer Storck. *Gesn. Aldrov.* Schwartzer Storch. *Schwenck. Rzac* Braun-Schwartzer Storch. *Rzac.*
Les Polonois, Bocian czarny; Bocian snidy. *Rzac.*
Les Suédois, Odenswala. *Linn.*
Les Anglois, Black Stork. *Willugh. Alb.*

Elle est à peu près de la grosseur d'un *Dindon femelle.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue

Cum *Gallo-pavone fœmina* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam

duos pedes novem pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos ungues tres pedes duos pollices & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quinque pollices & ſeptem lineas longum eſt; cauda novem pollices; pars crurum plumis denudata tres pollices cum novem lineis; pes ſex pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum totidem lineis, extimus duos pollices & octo lineas, intimus duos pollices cum quatuor lineis; poſticus autem tredecim cum ſemi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extenſâ, & digito intimo membranâ alterâ, ſolummodo ad primum uſque articulum productâ, coadunatur. Alis expanſis, extremitates majorum remigum quinque pedum & ſex pollicum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes uſque protenduntur. Capitis ſuperior pars fuſca eſt, violaceo & viridi-aureo perluſtrata. Guttur & collum veſtiunt plumulæ

eſt de deux pieds neuf pouces neuf lignes, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces neuf lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a cinq pouces ſept lignes de long; ſa queue neuf pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, trois pouces neuf lignes; ſon pied ſix pouces ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces trois lignes, l'extérieur deux pouces huit lignes, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derriere treize lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. Elle a cinq pieds ſix pouces de vol; & ſes aîles, lorqu'elles ſont pliées, s'étendent environ juſqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt d'un brun mêlé d'un luſtre de violet & de verd-doré. La gorge & le col ſont couverts de petites plumes brunes, terminées chacune par une petite tache blanchâtre; il faut cependant en

excepter les plumes qui couvrent le bas du col, qui ſont d'un brun luſtré de violet, & terminées de brun-griſâtre. (Quelques-unes n'ont point au col & à la gorge de taches blanchâtres). Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, toutes les couvertures du deſſus des aîles & les plus petites du deſſous ſont d'un brun changeant en violet & en verd-doré. Toutes les couvertures du deſſus de la queue, ainſi que les grandes & les moyennes du deſſous des aîles, ſont pareillement brunes, mais ſans aucun brillant. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont blancs. L'aîle eſt compoſée de trente plumes d'un brun changeant en verd & en violet : le verd eſt plus apparent dans les dix premieres plumes, & le violet l'eſt davantage dans les vingt autres. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aîle. Les deux du milieu ſont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en

fuſcæ, minutâ maculâ candicante in apice præditæ; ex iſtis tamen excipiendæ ſunt pennæ partem colli infimam obtegentes, quæ quidem fuſcæ ſunt, ſed violaceo perluſtratæ, & fuſco-griſeo terminatæ. (Quædam in collo & gutture maculis candicantibus deſtituuntur). Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, alas ſuperne coopetientes omnes & tectrices alarum inferiores minimæ ſunt fuſcæ, violaceo & viridi-aureo colore variantes. Pennæ caudam ſuperne veſtientes, inferioreſque alarum tectrices majores & mediæ penitùs fuſcæ & nullomodo ſplendentes. Pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars & tectrices caudæ inferiores albent. Alam componunt triginta remiges fuſcæ, viridi & violaceo colore variantes : viridis autem color in primoribus decem remigibus, violaceus verò in viginti reliquis magìs eſt conſpicuus. Remiges corpori viciniores longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus minoribus concolores. Binæ intermediæ lateralium

longitudinem paululùm excedunt; laterales autem ſenſim atque ſenſim longitudine minuuntur ad utrinque extimam uſque breviorem. Roſtrum griſeo-virideſcens, attamen in extremitate candicans. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque in quibuſdam obſcurè rubri, in aliis virideſcentes. Ungues lati ſunt & plani. Juxta fluviorum & ſtagnorum ripas verſatur; & *Ranis* maximè delectatur. *Ex muſéo Realmuriano.*

diminuant de longueur par degrés juſqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui eſt la plus courte. Le bec eſt d'un gris-verdâtre, excepté ſon bout, qui eſt blanchâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont d'un rouge ſombre dans quelques-unes & verdâtres dans d'autres. Les ongles ſont larges & plats. Elle ſe tient ſur les bords des rivieres & des étangs; & mange beaucoup de *Grenouilles. Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. La Cigogne blanche.

Voyez Pl. XXXII.

Ciconia alba; oculorum ambitu nudo, nigro; remigibus nigricantibus; rectricibus candidis. . . . . . Ciconia alba.

Ciconia. *Geſn. Avi. pag.* 262, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Geſn. icon. Avi. pag. 121, *in qua eadem icon.*
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 291.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 234.
Jonſt. Avi. pag. 100. *hujus duæ icones non ſatis accuratæ Tab.* 50.
Charlet. Exer. pag. 108. *N°. I.*
Charlet. Onomazt. pag. 102. *N°. I.*
Marſil. Danub. Tom. V. pag. 26. *hujus icon ſatis accurata Tab.* 11.
Proſp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 199.
Ciconia alba. *Willugh. Ornith. pag.* 210. *hujus icon à Jonſtone mutuata Tab. LII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 97. *N°. A.* 1.
Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag. 371.
Linn. Syſth. Nat. ed. 6. *Gen.* 55. *ſp.* 6.
Klein. Avi. pag. 125. *N°.* 1.

Ciconia; Crotalistria, Avis Hospita, peregrina, pietatis cultrix, Exul hyemis, Titulus tepidi temporis Petronio. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 274.

Ardea cirrata, alba, alis nigris, longiori gracilique rostro. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 8.

Ardea alba, remigibus nigris. *Faun. Suec. Linn. N°.* 136.

Ardea alba, remigibus nigris, cute sanguinea. Ciconia. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 7.

Ardea. *Moehr. Avi. Gen.* 81.

Ibis alba Herodoto. *Gesn.*

Cigogne. *Bel. Hist. nat. des Oif. pag.* 201; *avec une figure très-peu exacte pag.* 202.

Bel. Portr. d'Oif. pag. 45 *a, dans laquelle est la même figure.*

Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. III. pag. 61; *avec une figure passable Pl.* 13.

Cigogne ordinaire ou blanche. *Alb. Tom. II. pag.* 41; *avec une figure passable Pl.* 64.

Les Hébreux l'appellent CHASIDA. *Gesn. Aldrov.*

Les Chaldéens, CHARADITA; CHORATA. *Gesn.* CHAVARITA; DEIUTHA; MACHUAUTHA; MACUARTA. *Aldrov.*

Les Arabes, ZAKID. *Gesn.*

Les Perses, CHASIDA. *Gesn.*

Les Grecs, Πελαργὸς. *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Jonst. Raj. Charlet.* Πελαγος: *& quelques-uns*, Κίκυψ; Κικκφα. *Jonst.*

Les Turcs, LEGLÉK. *Gesn. Aldrov.*

Les Espagnols, CIGUENNA. *Gesn. Aldrov.*

Les Catalans, SEGONYA; GANTA. *Barr.*

Les Italiens, CIGOGNA; ZIGOGNA. *Bel. Gesn. Aldrov. & le jeune*, CICOGNINO. *Aldrov.*

Les Allemands, STORCK. *Gesn. Aldrov. Schwenck.* STORCH. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac.* WEISSER STORCH. *Rzac.* ELBIGER. *Schwenck.*

Les Saxons, EBEHER. *Gesn. Aldrov.*

Les Bas Saxons aux environs de Rostock, ADEBAR *ou* ODEBOER. *Gesn. Aldrov.*

Les Illyriens, CZIAP. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, BOCZAN. *Gesn. Aldrov.* BOCIAN; BOCIAN BIALY. *Rzac.*

Les Flamands, HOVARE. *Gesn. Aldrov.* OYEVAERT; OUWEWAER. *Aldrov.*

Les Suédois, STORCK. *Linn.*

Les Anglois, STORK. *Willugh. Charlet. Alb.* WHITE STORK. *Willugh. Raj.*

Elle est plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui

Praecedentem crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extre-

mam tres pedes totidem pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues tres pedes undecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem pollices & novem lineas longum est; cauda octo pollices & tres lineas; pars crurum plumis denudata quinque pollices; pes octo pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & quinque lineas, extimus duos pollices cum novem lineis, intimus duos pollices & sex lineas; posticus autem sexdecim cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum productâ, coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum sex pedum & trium pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudæ extremitatem pertingunt. Caput, guttur, collum, universumque corpus vestiunt pennæ albæ. Quæ colli inferioris infimam partem obtegunt, sex pollices

de la queue est de trois pieds trois pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds onze pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a sept pouces neuf lignes de long; sa queue huit pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq pouces; son pied huit pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces cinq lignes, l'extérieur deux pouces neuf lignes, l'intérieur deux pouces six lignes; & celui de derriere seize lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la premiere articulation. Elle a six pieds trois pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Celles qui couvrent le bas de la partie inférieure du col, ont jusqu'à six pouces de longueur, sont larges de dix lignes, & se terminent en pointe. Les

couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, toutes celles du deſſous des aîles, les plus petites & les moyennes du deſſus, & les petites plumes ſcapulaires ſont pareillement blanches : les grandes ſcapulaires ſont d'un brun-noirâtre ; quelques-unes cependant ſont d'un noir changeant en violet. Les grandes couvertures du deſſus des aîles ſont auſſi d'un brun-noirâtre, excepté les quatre plus proches du corps, qui ſont d'un noir changeant en violet. L'aîle eſt compoſée de trente plumes noirâtres. Les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes blanches. Le tour des yeux eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau noire. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont rouges. Les ongles ſont larges & plats. Elle ſe tient, comme la précédente, ſur les bords des rivieres & des étangs ; & mange volontiers des *Grenouilles*, des *Limaçons*, &c. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

longæ ſunt, decem lineas latæ, & in acumen deſinentes. Pennæ caudam ſupernè & infernè cooperientes, omnes iſtæ quæ alas ſubtùs obtegunt, ſuperiores alarum tectrices minimæ & mediæ, ſicut & ſcapulares minores, ſimiliter albicant. Scapulares majores ſunt fuſco-nigricantes ; quædam tamen ex nigro violaceo colore variant. Tectrices alarum ſuperiores majores ex fuſco quoque nigricant ; quatuor tamen corpori viciniores ſunt nigræ, violaceo colore variantes. Triginta remigibus nigricantibus ala conflatur. Corpori finitimæ longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Oculorum ambitus plumis denudatur, & tantummodo cute nigrâ obtegitur. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque rubri. Ungues lati ſunt & plani. Præcedentis inſtar, juxta fluminum & ſtagnorum ripas verſatur ; & *Ranas*, *Limaces*, &c. libenter devorat. *Ex muſeo Realmuriano.*

3. La Cigogne d'Amérique.

Ciconia alba ; oculorum ambitu nudo, coccineo ; tectricibus caudæ superioribus nigris ; remigibus nigro-virescentibus ; rectricibus candidis . . . . Ciconia Americana.

Ciconia Americana. *Klein. Avi. pag.* 125. *N°.* 3.
Ciconia Americana, Maguari Brasiliensibus Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 211.
Raj. Syn. Avi. pag. 97. *N°.* 3.
Maguari Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 204.
Jonst. Avi. pag. 139.
Les Brasiliens l'appellent Maguari. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Cum præcedente magnitudine circiter convenit. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem pollices longum est; collum unum pedem. Cauda brevis est, & alarum complicatarum extremitates non excedit. Pars crurum plumis denudata, pedesque eamdem ac in præcedente longitudinem obtinent. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum articulum usque productâ, coadunatur. Caput, guttur, collum, universumque corpus obtegunt pennæ albæ. Quæ colli inferioris partem infimam cooperiunt, reliquas

Elle est à peu près de la grandeur de la précédente. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a neuf pouces de long ; son col un pied. Sa queue est courte, & ne s'étend pas au-delà de l'extrémité des aîles, lorsqu'elles sont pliées. La partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont longs comme dans la précédente. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la premiere articulation. La tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Celles qui couvrent le bas de la partie in-

férieure du col, sont un peu plus longues que les autres. Les couvertures du dessus de la queue sont noires. Celles du dessous de la queue, toutes celles du dessous des aîles, les plus petites & les moyennes du dessus & les petites plumes scapulaires sont blanches. Les grandes scapulaires, les grandes couvertures du dessus des aîles & les plumes de l'aîle sont d'un noir qui a un certain lustre de verd. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, à peu près aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches. Le tour des yeux est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau d'un rouge très-vif. Entre le bec & la gorge est un espace couvert d'une peau de la même couleur. La prunelle des yeux est noire : leur iris est d'un blanc-argenté. Le bec est d'un verd-jaunâtre depuis son origine jusqu'à la moitié de sa longueur, & de là jusqu'à son extrémité il est d'un cendré-bleu. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont rouges. Les ongles sont larges & plats.

longitudine paululùm antecellunt. Superiores caudæ tectrices nigricant. Pennæ caudam subtus obtegentes, quæ alas infernè cooperiunt, superiores alarum tectrices minimæ & mediæ, minoresque scapulares sunt candidæ. Scapulares majores, tectrices alarum superiores majores, sicut & remiges, sunt nigro-virescentes. Remiges corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates circiter extenduntur. Duodecim rectricibus candidis cauda constat. Oculorum ambitus plumis denudatur, & tantummodo cute coccineâ obtegitur. Rostrum inter & guttur spatium extat cute concolore obsitum. Oculorum pupilla nigra : ipsorum irides albo-argenteæ. Rostrum ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque ex viridi flavicat, à medietate ad extremitatem ex cinereo cœrulescit. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque rubri. Ungues lati sunt & plani. Habitat in *America*, præsertim in *Brasilia*.

On la trouve en *Amérique* & sur-tout au *Brésil*.

*. 4. La Cigogne du Brésil.

Ciconia alba; capite anteriore nudo, cinereo-albicante; remigibus nigro-rubescentibus; rectricibus nigris. . . . Ciconia Brasiliensis.

Jabiru-Guacu. *Pison. Hist. Nat. pag.* 87, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*
Jabiru-Guacu Petiguaribus; Nhandu Apoa Tupinambis. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 200. *hujus icon non satis accurata pag.* 201.
Jonst. Avi. pag. 137. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 59.
Raj. Syn. Avi. pag. 96. *N°.* 5.
Jabiru-Guacu Petiguaribus, Nhandu Apoa Tupinambis, Belgis Scur-Vogel, Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 202. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XLVII.*
Mycteria Americana. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 74. *sp.* 1.
Les Flamands l'appellent Scur-Vogel. *Marcgr. Pison. Jonst. Willugh. Raj.*
Les Petivares, Jabiru-Guacu. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*
Les Toupinambous, Nhandu Apoa. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Cum *Ciconia alba* crassitie circiter convenit. Rostrum, quod sola est hujus Avis pars à me observata, ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim pollices longum est. Mandibula inferior majorem obtinet crassitiem quàm superior, & quodammodo sursum recurvatur. Cauda brevis est, & alarum complicatarum extremitates non excedit. Crura octo pollices longa sunt; pedes tredecim pollices & sex lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur mem-

Elle est à peu près de la grosseur de la *Cigogne blanche*. Son bec, qui est la seule partie de cet Oiseau que j'ai vue, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche treize pouces de long. Le demi-bec inférieur est plus épais que le supérieur & en quelque façon recourbé en enhaut. Sa queue est courte; & ne s'étend pas au-delà de l'extrémité des aîles, lorsqu'elles sont pliées. Ses jambes ont huit pouces de long; ses pieds treize pouces six lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une mem-

brane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la premiere articulation. Le devant de la tête est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau écailleuse d'un cendré mêlé d'un peu de blanc. Le reste de la tête est noir. Le col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Celles qui couvrent le bas de la partie inférieure du col, sont assez longues, & pendent en en-bas. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont pareillement blanches. Les plumes de l'aîle sont d'un noir qui a un certain lustre de rouge. Les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, à peu près aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noires. Les yeux sont noirs. Le bec est rouge, excepté son origine, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont cendrés. Les ongles sont larges & plats. On la trouve au *Brésil.*

branâ paululùm ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum articulum usque protensâ, coadunatur. Caput anterius plumis denudatur, & tantummodo cute obtegitur squamosâ cinereâ, aliquo albore mixtâ. Reliquum caput nigrum. Collum, universumque corpus vestiunt pennæ albæ. Quæ colli inferioris partem infimam obtegunt, sunt longiusculæ, & deorsum dependentes. Scapulares, alas superne & infernè cooperientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores similiter albicant. Remiges alarum nigræ, rubini colore transplendentes. Corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates circiter attingunt. Duodecim rectricibus nigris cauda conflatur. Oculi sunt nigri. Rostrum rubrum, attamen in exortu nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque cinerei. Ungues lati sunt & plani. Habitat in *Brasilia.*

5. La Cigogne de la Guiane.

Ciconia in toto corpore candida; capite & collo supremo nudis & nigris. . . . . Ciconia Guianensis.

Arquata Americana, cinerea maxima, vertice calvo & rugoso. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. IX. sp.* 10.
Grus incurvato rostro, vertice calvo & rugoso. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 133.
Jabiru Brasiliensibus, Belgis vulgò Negro. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 200, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Jonst. Avi. pag. 137. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 59.
Jabiru Brasiliensibus Marcgravii; Belgis vulgò Negro. *Willugh. Ornith. pag.* 201. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XLVII.*
Jabiru Brasiliensium Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 96. *N°.* 4.
Les Flamands l'appellent Negro. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*
Les Brasiliens, Jabiru. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Barr.*
Les Indiens de la Guiane, Aouarou. *Barr.*

Crassitie *Cignum* antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quatuor pedes & duos circiter pollices explet, & ad extremos ungues quinque pedes & tres pollices. Rostrum, quod duorum pollicum & sex linearum latitudinem obtinet, ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim pollices longum est; cauda novem circiter pollices; pars crurum plumis denudata sex pollices & totidem lineas; pes undecim pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices: latera-

Elle est plus grosse qu'un *Cigne*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quatre pieds deux pouces, & jusqu'à celui des ongles de cinq pieds trois pouces. Son bec qui est large de deux pouces six lignes, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche onze pouces de long; sa queue environ neuf pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six pouces six lignes; son pied onze pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est le plus court de

tous. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, &avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête & la partie du col qui en est la plus voisine, sont dégarnies de plumes, & couvertes seulement d'une peau noire. Le reste du col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Les plumes de l'aîle & celles de la queue, ainsi que toutes leurs couvertures, sont de la même couleur. Les yeux sont noirs. Le bec est de la même couleur. Le demi-bec supérieur est un peu plus épais que l'inférieur, & un peu courbé en en-bas vers son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirâtres. On la trouve dans la *Guiane* & au *Brésil*.

les paulo sunt breviores; posticus autem omnium brevissimus. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ paululùm ultra primum articulum extensâ, & cum digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum productâ, connectitur. Alæ complicatæ caudæ extremitatem pertingunt. Caput & pars colli ipsi finitima plumis denudantur, & tantummodo cute nigrâ obteguntur. Reliquum collum, universumque corpus pennis vestiuntur albis. Remiges, rectricesque, sicut & ipsarum tectrices omnes, eodem imbuuntur colore. Oculi sunt nigri. Rostrum similiter nigrum. Mandibula superior paulò majorem obtinet crassitiem quàm inferior, & versùs extremitatem paululùm deorsum incurvatur. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigricant. Habitat in *Guiana* & *Brasilia*.

** 6. La Grue.

Voyez Pl. XXXIII.

Ciconia cinerea; capite superiore pennis nigris, in occipite raris, pilorum æmulis, obsito; vertice nigro, occipitio rubro; maculâ triangulari infra occipitium saturatè cinerea;

genis ponè oculos & collo superiore candidis ; remigibus nigris ; rectricibus primâ medietate saturatè cinereis, alterâ nigricantibus . . . . GRUS.

Ardea vertice papilloso. *Faun. Suec. Linn. N°.* 131.

Ardea vertice nudo papilloso, fronte remigibus occipiteque nigris, corpore cinereo. Grus. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 4.

Ardea rostro rubro, robusto, quadrangulo. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 10.

Grus. *Gesn. Avi. pag.* 528. *hujus icon minimè accurata pag.* 529.

Gesn. icon. Avi. pag. 19, *in qua eadem icon.*

Schwenck. Avi. Sil. pag. 284.

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 324. *hujus icon satis accurata pag.* 329.

Jonst. Avi. pag. 114. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 54.

Willugh. Ornith. pag. 200. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XLVIII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 95. *N°. A.* 1.

Charlet. Exer. pag. 114. *N°. I.*

Charlet. Onomazt. pag. 110. *N°. I.*

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 18.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 281.

Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 383.

Marsil. Danub. Tom. V. pag. 6. *hujus icon satis accurata Tab. I.*

Prosper. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 199.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. *Gen.* 55. *sp.* 1.

Moehr. Avi. Gen. 79.

Grus nostras. *Klein. Avi. pag.* 121. *N°.* 1.

Grue. *Bel. Hist. nat. des Oiss. pag.* 187; *avec une mauvaise figure pag.* 188.

Bel. Portr. d'Oiss. pag. 41 *b, dans laquelle est la même figure.*

Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 172.

Alb. Tom. II. pag. 41 ; *avec une figure mal coloriée Pl.* 65.

Les Grecs l'appellent Γέρανος. *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Willugh. Raj. Charlet. Marsil.* Γερανὸς. *Jonst.* Κλαρος. *Gesn. Schwenck.*

Les Polyrheniens, Σέρτης. *Jonst.*

Les Toscans, Συριστὴς. *Jonst.*

Les Portugais, EMA. *Gesn. Aldrov.*

Les Espagnols, GRUILLA. *Gesn. Aldrov.* GRUZ. *Aldrov.*

Les Catalans, GRUA ; GABILAN. *Barr.*

Les Italiens, GRU ; GRUA. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, KRAN. *Gesn. Aldrov. Schwenck.* KRANE ; KRANCH. *Gesn. Aldrov.* KRANICH. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac. Ils appèllent le jeune* JUNGER KRANICH. *Schwenck.*

Les Flamands, KRANE. *Aldrov.*

Les Suisses, KRYE. *Gesn. Aldrov.*

Les Illyriens, GERZAB. *Gesn. Aldrov.*
Les Polonois, ZORAW. *Gesn. Aldrov. Rzac.*
Les Suédois, TRANA. *Linn.*
Les Anglois, CRANE. *Gesn. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb.*

Elle n'est pas tout-à-fait si grosse que la *Cigogne brune*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds un pouce, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds neuf pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces deux lignes de long; sa queue sept pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois pouces six lignes; son pied huit pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces neuf lignes, l'extérieur trois pouces, l'intérieur deux pouces neuf lignes; & celui de derriere dix lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a cinq pieds huit pouces de vol; & lorsque ses aîles sont pliées, leurs grandes plumes s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie antérieure du dessus de la tête est garnie de petites plumes noires, qui ressemblent à des poils. Le derriere de la

Ciconiæ fuscæ paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes & unum pollicem æquat, & ad extremos ungues tres pedes novem pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor pollices & lineas binas longum est; cauda septem pollices; pars crurum plumis denudata tres pollices & sex lineas; pes octo pollices cum sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & novem lineas, extimus tres pollices, intimus duos pollices cum novem lineis; posticus autem decem cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quinque pedum & octo pollicum; alis verò complicatis, extremitates majorum remigum caudam extremam attingunt. Capitis superioris pars anterior nigris obsita est plumulis

lis pilorum æmulis. Caput posterius sive occipitium cute obtegitur rubrâ, quibusdam pariter plumulis nigris, pilorum æmulis, sed rarissimis, obsitâ. Infra occipitium macula extat triangularis saturatissimè cinerea, supra collum superius per duorum pollicum longitudinem producta. Genæ ponè oculos, & colli superior pars sunt candidæ. Spatium rostrum inter & oculum, genas infra oculos, guttur, collumque inferiùs & ad latera tingit color cinereus saturatissimus. Partem colli corpori finitimam, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crurum partem supremam vestiunt pennæ eleganter cinereæ. Inferiores caudæ tectrices, pennæ alas subtus obtegentes, scapularesque concolores. Superiores caudæ tectrices cinereo tinguntur nonnihil saturatiore. Tectrices alarum superiores minimæ, sicut & mediæ, eodem imbuuntur cinereo ac dorsum ipsum tingitur: majores corpori finitimæ sunt in latere exteriore concolores, in interiore nigricantes: majores à corpore remotiores nigræ. Ala notha eodem imbuta colore. Remiges alarum

tête ou l'occiput est couvert d'une peau rouge, garnie de même de quelques petites plumes noires, en forme de poils, mais très-clair-semées. Au-dessous de l'occiput est une tache triangulaire d'un cendré très-foncé, qui s'étend sur le dessus du col dans la longueur de deux pouces. Les joues derriere les yeux, & la partie supérieure du col sont blanches. L'espace contenu entre le bec & l'œil, les joues au-dessous des yeux, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col sont d'un cendré très-foncé. La partie du col la plus voisine du corps, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont couverts de plumes d'un joli cendré. Les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les plumes scapulaires sont de la même couleur. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré un peu plus foncé. Les plus petites & les moyennes du dessus des aîles sont du même cendré que le dos : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur du côté extérieur, & noirâtres du côté intérieur : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aile bâtarde est

de cette derniere couleur. Les plumes de l'aîle sont pareillement noires; il faut cependant en excepter quelques-unes des moyennes, sçavoir les plus proches du corps, qui sont d'un joli cendré du côté extérieur, & noires du côté intérieur & à leur bout. Elles se terminent en pointe; & de celles-là les quatre plus proches du corps sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, jusqu'à cinq pouces au-delà du bout de la queue. La queue est composée de douze plumes d'un cendré foncé depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur; & de là jusqu'à leur extrémité elles sont noirâtres. Le bec est d'un noir-verdâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. Elle se nourrit de grains. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

similiter nigræ; ex istis tamen excipiendæ sunt minores quædam, corpori scilicet viciniores, in latere exteriore eleganter cinereæ, in latere interiore & apice nigræ. Quæ remiges in acumen desinunt; ex istis autem quatuor corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, ad quinque pollicum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caudam componunt duodecim rectrices ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque saturatè cinereæ, indeque ad extremitatem nigricantes. Rostrum ex nigro viridescit. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Granis victitat. *Ex museo Realmuriano.*

7. La Grue des Indes Orientales.

Ciconia cinerea, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; capite & collo supremo rubris, capite pennis raris nigris, pilorum æmulis, obsito; vertice & maculis ad aures nudis, candidis; remigibus majoribus nigris; rectricibus cinereis . . . Grus Orientalis Indica.

Ardea capite nudo collarique papilloso, corpore cinereo, remigibus nigris. Antigone. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 6.

Grus Indica major. *Klein. Avi. pag.* 121. *N°.* 5.

Grande Grue des Indes. *Edwards. Tom. I. pag. XLV ; avec une figure exacte Pl. 45.*

Les Anglois l'appellent Greater Indian Crane. *Edwards.*

Magnitudine & crassitie præcedentem paululùm antecellit ; & proportione servatâ, rostro longiori donatur. Alæ complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Capitis verticem obtegit cutis candida, plumis penitùs denudata. In utroque capitis latere macula extat similiter candida, plumis quoque destituta, & versùs aures posita. Reliquum caput, guttur & partem colli supremam obvestit cutis rubra : quæ cutis in toto basis rostri ambitu, sub gutture & capitis posteriore parte plumulis obsita est rarissimis nigris, pilorum æmulis ; pars autem colli suprema plumis penitùs denudatur. Reliquam colli longitudinem cooperiunt pennæ albæ, gradatim versùs ipsarum extremitatem procedendo, magìs magìsque cinerascentes. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ tectrices sunt eleganter cinereæ. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes eodem imbuuntur

Elle est un peu plus grande & plus grosse que la précédente ; & a proportionnellement le bec plus long. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est couvert d'une peau blanche, entiérement dégarnie de plumes. De chaque côté de la tête est une tache de la même couleur, pareillement dénuée de plumes, & placée vers les oreilles. Le reste de la tête, la gorge & le haut du col sont couverts d'une peau rouge : cette peau est garnie tout autour de la bâse du bec, sous la gorge & à la partie postérieure de la tête de petites plumes noires, en forme de poils clair-semés, tandis que le haut du col reste entiérement nud. Le reste de la longueur du col est couvert de plumes blanches, qui par degrés deviennent cendrées vers leur extrémité. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un joli cendré. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aî-

les & les côtés sont de la même couleur, mais plus claire. Les grandes plumes de l'aîle sont noires : les moyennes sont cendrées. De ces dernieres, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes cendrées. L'iris des yeux est rougeâtre. Le bec est d'un jaune-verdâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges; & les ongles blancs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On la trouve dans les *Indes Orientales*.

colore, sed dilutiore. Remiges alarum majores sunt nigræ : minores cinereæ. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereis cauda constat. Oculorum irides rubescentes. Rostrum flavo-viridescens. Pars crurum plumis denudata, pedesque rubri; ungues verò candidi. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranâ ad primum usque articulum productâ. Habitat in *India Orientali*.

8. LA GRUE DU MEXIQUE.

Ciconia cinerea; capite superiore rubro, pennis raris nigris, pilorum æmulis, obsito; remigibus majoribus nigris; rectricibus cinereis . . . . GRUS MEXICANA.

Grus Indica. *Willugh. Ornith. pag.* 201.
Raj. Syn. Avi. pag. 95. *N°.* 2.
Grus Indica Willughbeji. *Klein. Avi. pag.* 121. *N°.* 2.
Toquil coyotl. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag.* 44. *Cap. CXLVIII.*
Les Mexiquains l'appellent TOQUIL-COYOTL : *& quelques-uns*, COCEAYAUHQUI. *Fern.*

Elle n'est pas tout-à-fait si grande ni si grosse que la *nôtre*; mais elle a le bec plus long,

Magnitudine & crassitie paululùm *Grui nostrati* cedit; sed rostro longiori do-

natur. Alæ complicatæ caudæ extremitatem pertingunt; cauda autem valdè brevis est. Partem capitis superiorem obtegit cutis rubra, rugosa, plumulis rarissimis nigris, pilorum æmulis, obsita. Reliquum caput, guttur, collum, universumque corpus vestiunt pennæ cinereæ. Scapulares, alas superne & infernè vestientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores idem tingit color. Remiges alarum majores sunt nigræ : minores cinereæ. Ex minoribus autem corpori finitimæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereæ. Oculorum irides luteæ. Cujus coloris sint rostrum, pedesque, prorsùs me latet. Habitat in *Mexico*.

Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue, qui est très-courte. La partie supérieure de la tête est couverte d'une peau rouge, raboteuse, & garnie de petites plumes noires, en forme de poils clair-semés. Le reste de la tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes cendrées. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les grandes plumes de l'aîle sont noires : les moyennes sont cendrées. De ces dernieres, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes cendrées. L'iris des yeux est jaune. J'ignore quelle est la couleur du bec & des pieds. On la trouve au *Mexique*.

9. LA GRUE DU JAPON.

Ciconia alba; capite superiore rubro, pennis raris nigris, pilorum æmulis, obsito; collo inferiore & remigibus majoribus nigris; rectricibus candidis . . . . GRUS JAPONENSIS.

Grus Japponensis. *Jonst. Avi. pag.* 116. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 54.
Charlet. Exer. pag. 114. *N°.* 2.

Charlet. Onomazt. pag. 110. *N°*. 2.
Grus Japonensis alia. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 365. *hujus icon non satis accurata pag.* 364.
Grus Japonensis Charletoni. *Klein. Avi. pag.* 121. *N°*. 4.

Elle ressemble assez à la *nôtre* par sa forme & sa grandeur. La partie supérieure de sa tête est couverte d'une peau rouge, garnie de petites plumes noires, en forme de poils clair-semés. La partie inférieure du col est noire. Le dessus du col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les grandes plumes de l'aile sont noires : les moyennes sont blanches. De ces dernieres, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un verd obscur. On la trouve au *Japon*.

Formâ & magnitudine cum *Grue nostrate* satis benè convenit. Partem capitis superiorem obtegit cutis rubra, raris plumulis nigris, pilorum æmulis obsita. Collum inferius nigrum est. Partem colli superiorem, universumque corpus vestiunt pennæ albæ. Scapulares, alas superne & infernè coopérientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Remiges alarum majores nigro tinguntur colore : minores sunt candidæ. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus candidis cauda conflatur. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedesque sunt obscurè virides. Habitat in *Japonensi* Regno.

10. La Grue d'Amérique.

Ciconia alba ; capite superiore pennis nigris, pilorum æmulis, in occipite raris, obsito, vertice nigro, occipitio & tænia

infra oculos rubris; maculâ triangulari infra occipitium nigrâ; marginibus alarum pallidè roseis; remigibus majoribus nigris; rectricibus candidis . . . . . GRUS AMERICANA.

Ardea vertice temporibusque nudis papillosis, fronte nucha remigibusque primariis nigris, corpore albo. Grus Americana. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 5.

Grande Grue de la Baye de Hudson. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXII; avec une figure exacte Pl.* 132.

Grue blanche de l'Amérique. *Catesb. Tom. I. pag.* 75; *avec une figure exacte de la tête & du col Pl.* 75.

Les Anglois l'appellent HOOPING CRANE. *Catesb.* HOOPING-CRANE FROM HUDSON'S-BAY. *Edwards.*

Gruem nostratem magnitudine & crassitie multùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quatuor pedes duos pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues quinque pedes duos pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices & septem lineas longum est; cauda septem pollices; pars crurum plumis denudata quatuor pollices & octo lineas; pes decem pollices cum tribus lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices cum linea unica : laterales paulò sunt breviores; posticus autem pollicis unius longitudinem non multùm excedit. Trium digitorum anticorum medius

Elle est beaucoup plus grande & plus grosse que la *nôtre*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pieds deux pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pieds deux pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces sept lignes de long; sa queue sept pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre pouces huit lignes; son pied dix pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces une ligne : les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere n'a guères plus d'un pouce de longueur. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane,

qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte d'une peau rouge, laquelle est entiérement garnie, sur le devant de la tête & de chaque côté entre le bec & l'œil, de petites plumes noires en forme de poils, si épaisses que la peau rouge ne paroît point du tout : au contraire sur l'occiput la peau rouge est très-apparente, & il n'y a que fort peu de ces plumes noires en forme de poils clair-semés. De chaque côté de la tête s'étend une bande d'une peau rouge, garnie de même de quelques poils noirs clair-semés; laquelle bande part des coins de la bouche, passe pardessous les yeux, & s'étend jusque vers le col, en se terminant en pointe. Au-dessous de l'occiput est une grande tache triangulaire noire. Les côtés de la tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessous des aîles sont de la même couleur. Les petites plumes qui couvrent le bord de l'aîle, depuis son origine jusque vers le pli qui répond à celui du poignet, sont

cum extimo digito connectitur membranâ ad primum usque articulum extensâ. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Caput superius obtegit cutis rubra, in parte capitis anteriore & utrinque rostrum inter & oculum plumulis penitùs obsita nigris, pilorum æmulis, & ita densis ut cutis rubra nullomodo sit conspicua: contrà verò in occipitio cutis rubra valdè apparet, rarissimisque plumulis nigris, pilorum æmulis, obsita est. In utroque capitis latere tænia protenditur cute rubrâ conflata, raris quibusdam pilis nigris similiter obsita; quæ tænia ab oris angulis orta, & infra oculos ducta, versùs collum usque protenditur, & in acumen desinit. Infra occipitium majuscula extat macula triangularis nigra. Caput ad latera, guttur, collum, universumque corpus vestiunt pennæ albæ. Scapulares, caudam superne & infernè cooperientes, alarumque tectrices inferiores eodem colore tinguntur. Plumulæ alarum margines, ab ipsarum exortu versùs articulum carpo humano respondentem usque, cooperientes sunt pallidè roseæ. Superiores

res alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, candidæ : majores à corpore remotiores nigræ. Pennæ nigræ, pennæque candidæ alam notham variegant. Remiges novem primores sunt nigræ : decima in latere exteriore concolor, in interiore alba : reliquæ omnes penitùs albicant. Corpori viciniores sunt valdè flexibiles, longæ & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Rostrum ex fusco flavicat, obscuriùs tamen in medio quàm in utraque extremitate. Utriusque mandibulæ extremitas, serræ instar, dentata est, idque per spatium circiter sesquipollicis. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Habitat in variis *Americæ Septentrionalis* regionibus.

d'un couleur de rose pâle. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont blanches : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aîle bâtarde est variée de plumes noires & de plumes blanches. Les neuf premieres plumes de l'aîle sont noires : la dixiéme est de la même couleur du côté extérieur, & blanche du côté intérieur : toutes les autres sont entiérement blanches. Les plus proches du corps sont très-fléxibles, longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec est d'un brun-jaunâtre, plus obscur dans le milieu qu'aux deux extrémités. Le bout des deux mandibules est dentelé comme une scie dans l'espace d'environ un pouce & demi. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve en différens endroits de l'*Amérique Septentrionale*.

11. La Grue de la Baye de Hudson.

Ciconia superne rufescens, marginibus pennarum fuscis, infernè cinereo-rufescens; vertice rubescente, pennis nigris, pilorum æmulis, obsito; genis & gutture candidis; occipite,

collo & uropygio cinereis; tæniâ tranſverſâ in alis cinereo-albâ; remigibus majoribus fuſco-nigricantibus, ſcapis albis; rectricibus ſaturatè cinereis . . . . . . GRUS FRETI HUDSONIS.

Ardea ſyncipite nudo papilloſo, corpore cinereo, alis extus teſtaceis.
Ardea Canadenſis. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *ſp.* 3.
Grue brune & cendrée. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXIII; avec une figure exacte Pl.* 133.
Les Anglois l'appellent BROWN AND ASH-COLOUR'D CRANE. *Edwards.*

Elle eſt beaucoup moins groſſe que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ deux pieds huit pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces neuf lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces neuf lignes de long; ſa queue environ ſix pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, deux pouces neuf lignes; ſon pied ſix pouces ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces: les latéraux ſont un peu plus courts; & celui de derriere n'a guères que neuf lignes de longueur. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de

Præcedenti multùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam duos pedes octo pollices & ſex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues tres pedes duos pollices & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tres pollices & novem lineas longum eſt; cauda ſex circiter pollices; pars crurum plumis denudata, duos pollices cum novem lineis; pes ſex pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices: laterales paulò ſunt breviores; poſticus autem novem linearum longitudinem non multùm excedit. Trium digitorum anticorum medius digito extimo membranâ, ad primum uſque articulum productâ, coadunatur. Alæ complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur.

Summum caput obtegit cutis rubescens, raris quibusdam plumulis nigris, pilorum æmulis, obsita. Genæ & guttur albicant. Caput superius sive occipitium, collumque cinereo tinguntur colore. Dorsi pars suprema pennis vestitur rufescentibus, fusco marginatis. Dorsum infimum & uropygium sunt cinerea. Pennæ caudam superne cooperientes, inferioresque alarum tectrices concolores. Pectus, venter, crurum suprema pars & latera ex cinereo rufescunt; qui color cinereo-rufescens, versùs tectrices caudæ inferiores procedendo, magis magisque fit dilutior; inferiores autem caudæ tectrices sunt candicantes. Pennæ scapulares, superiores alarum tectrices minimæ & mediæ rufescentes, fusco fimbriatæ: superiores alarum tectrices majores à corpore remotiores fusco-nigricantes: majores corpori viciniores cinereo-albæ, unde fit in utraque ala tænia transversa concolor. Remiges alarum majores ex fusco nigricant, & scapo donantur candido: minores rufescunt. Ex minoribus autem corpori finitimæ sunt valdè flexibiles, longæ & in acu-

la longueur de la queue. Le sommet de la tête est couvert d'une peau rougeâtre, garnie de quelques petites plumes noires, en forme de poils clairsemés. Les joues & la gorge sont blanches. Le derriere de la tête ou l'occiput, & le col sont cendrés. La partie supérieure du dos est couverte de plumes roussâtres, bordées de brun. La partie inférieure du dos & le croupion sont cendrés. Les couvertures du dessus de la queue & celles du dessous des aîles sont de la même couleur. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont d'un cendré-roussâtre; cette couleur devient de plus en plus claire en approchant des couvertures du dessous de la queue, qui sont blanchâtres. Les plumes scapulaires, les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont roussâtres, & bordées de brun: les grandes couvertures du dessus des aîles les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre: les grandes les plus proches du corps sont d'un gris-blanc; ce qui forme sur chaque aîle une bande transversale de cette couleur. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un brun-noirâtre, & ont leur tige blanche: les moyennes sont roussâtres. De

ces dernieres, les plus proches du corps font très - fléxibles, longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, bien au-delà de l'extrémité des plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un cendré foncé. Le bec est noirâtre, excepté le bout du demi-bec inférieur, qui est d'un couleur de chair pâle. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles font noirs. On la trouve en été à la *Baye de Hudson.*

men desinentes, & dum alâ complicatur, non parùm ultra majorum remigum extremitates protenduntur. Duodecim rectricibus saturatè cinereis cauda constat. Rostrum nigricat; attamen mandibulæ inferioris extremitas pallidè carneo colore tingitur. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Æstate in *Freto Hudsonis* habitat.

** 12. La Grue de Numidie, appellée vulgairement Demoiselle de Numidie.

Ciconia cinereo-cœrulescens; vertice dilutè cinereo; capite & collo supremo nigris; fasciculis pennarum candidis, ab utriusque oculi angulo ortis, retrorsum pendulis; pennis longis nigris in collo inferiore deorsum dependentibus; remigibus majoribus, rectricibusque apice nigricantibus.... Grus Numidica Virgo Numidica vulgo dicta.

Ardea superciliis albis, retrorsum longè cristatis. Virgo. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 2.
Grus Numidiæ. *Klein. Avi. pag.* 121. *N°.* 6.
Otus plumbeus. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXVII.*
Scops. *Moehr. Avi. Gen.* 84.
Demoiselle de Numidie. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. II. pag.* 3; *avec une figure passable Pl.* 35.
Edwards. Tom. III. pag. CXXXIV; avec une figure exacte Pl. 134.
Grue de Numidie. *Alb. Tom. III. pag.* 35; *avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl.* 83.
Les Grecs l'appellent Ανθρωποειδής. *Hist. de l'Acad.*
Les Anglois, Numidian Crane. *Alb.* Demoiselle of Numidia. *Edwards.*

Crassitie *Grui vulgari* cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes totidem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues tres pedes & sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est; cauda decem pollices cum sex lineis; pars crurum plumis denudata tres pollices; pes septem pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices, extimus duos pollices cum linea una, intimus duos pollices & tres lineas; posticus autem novem tantummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum usque articulum productâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuor pedum & novem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ quartam longitudinis caudæ partem non multùm excedunt. Vertex capitis cinereo diluto tingitur. Reliquum caput, guttur & collum supremum nigra sunt. Colli infima pars superiùs & ad latera, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera

Elle n'est pas si grosse que la *Grue ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds trois pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds six pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long; sa queue dix pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois pouces; son pied sept pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces, l'extérieur deux pouces une ligne, l'intérieur deux pouces trois lignes; & celui de derriere neuf lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a quatre pieds neuf pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà du quart de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est d'un cendré-clair. Le reste de la tête, la gorge & le haut du col sont noirs. Le bas du col dans sa partie supérieure & sur les côtés, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés & le haut des jambes sont couverts de plumes d'un joli cendré-bleu. Les sca-

pulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. De l'angle extérieur de chacun des yeux part un petit faisceau de plumes blanches, longues de trois pouces six lignes, très-flexibles, qui pendent en arriere, & flottent au moindre mouvement de tête que se donne l'Oiseau. Le bas de la partie inférieure du col est couvert de plumes noires, longues, se terminant en pointe, très-fléxibles, dont quelques-unes ont jusqu'à neuf pouces de longueur, & pendent sur la poitrine. Les grandes plumes de l'aîle sont cendrées depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur; le reste est noirâtre : les moyennes sont d'un joli cendré-bleu. De ces dernieres, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, jusqu'à l'extrémité des plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-bleu, terminées de noirâtre. L'iris des yeux est d'un rouge vif. Le bec est verdâtre à son origine, jaune vers le milieu de sa longueur, & rouge à son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les

& crurum pars suprema pennis vestiuntur eleganter cinereo-cœrulescentibus. Scapulares, quæ alas supernè & infernè obtegunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores eodem imbuuntur colore. Ab utriusque oculi exteriori angulo fasciculus oritur pennis conflatus candidis, trium pollicum & sex linearum longitudinem obtinentibus, valdè flexibilibus, retrorsum dependentibus, & minimo capitis hujus Avis motu fluctuantibus. Colli inferioris infima pars pennis obsita est nigris, longis, in acumen desinentibus, valdè flexibilibus, quarum quædam novem pollicum longitudine pollent, & pectori incumbunt. Remiges alarum majores sunt ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque cinereæ, à medietate ad apicem nigricantes : minores eleganter cinereo-cœrulescentes. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereo-cœrulescentes, apice tamen nigricantes. Oculorum irides coccineæ. Rostrum in exortu



Dessiné et Gravé par Martinet

Cigogne brune.

Dessiné et Gravé par Martinet.

Cigogne blanche.



Dessiné et Gravé par Martinet.

Grue.

viridescens, versùs mediam longitudinem luteum, in extremitate rubrum. Pars cru[illegible] plumis denudata, pedes unguesque nigri. Habitat in *Numidia. Ex museo Realmuriano.*

ongles sont noirs. On la trouve en *Numidie. Du cabinet de M. de Reaumur.*

LXXXI.

Genus Ardeæ.

Hujus character est

Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus :

Crura in parte inferiore plumis denudata :

Rostrum crassum, longum, rectum, acutum :

Mandibula superior sulco longitudinali utrinque exarata.

In omnibus hujus generis Avibus trium digitorum anticorum · medii unguis interiùs est, serræ instar, dentatus. Mandibulæ binæ sunt similiter in utroque latere versùs ipsarum extremitatem nonnihil denticulatæ; & mandibulæ superioris apex est utrinque paululùm emarginatus. Omnes corpore donantur lateraliter compresso.

LXXXI.

Le genre du Héron.

Son caractere est d'avoir

Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere :

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :

Le bec gros, long, droit & pointu :

Une rainure longitudinale de chaque côté sur la mandibule supérieure.

Tous les Oiseaux de ce genre ont l'ongle de celui du milieu des trois doigts antérieurs intérieurement dentelé comme une scie. Il ont aussi les deux mandibules un peu dentelées de chaque côté vers leur extrémité; & le bout de la mandibule supérieure a de chaque côté une petite échancrure. Ils ont tous le corps applati par les côtés.

** 1. Le Héron.

Voyez Pl. XXXIV.

Ardea superne cinerea, infernè alba; medio vertice cinereo-nigricante; occipitio nigro; collo inferiore maculis longitudinalibus nigris vario; pectore & ventre supremo maculis longitudinalibus cinereo-nigricantibus variegatis; rectricibus cinereis, versùs apicem fuscescentibus; rostro superiùs flavo-viridescente, infernè flavicante, apice nigricante; pedibus virescentibus . . . . Ardea.

Ardea occipite crista pendula, dorso cœrulescente, subtus albida, pectore maculis oblongis nigris. Ardea cinerea. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 10.
Ardea. *Gesn. Avi. pag.* 207.
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 365.
Musf. Worm. pag. 306.
Moehr. Avi. Gen. 81.
Ardea subcœrulea. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 223.
Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 364.
Ardea pulla, sive cinerea. *Gesn. Avi. pag.* 211. *hujus icon non satis accurata pag.* 212.
Ardea, vel Ardeola pulla vel cinerea. *Gesn. icon. Avi. pag.* 117, *in qua eadem icon.*
Ardea pella, pulla, cinerea, Schwenckfeldii, *Klein. Avi. pag.* 122. *N°.* 1.
Ardea cinerea. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 271.
Ardea cinerea major. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 377. *hujus icon non satis accurata pag.* 378.
Jonst. Avi. pag. 103. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 50.
Charlet. Exer. pag. 109. *N°.* 1.
Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°.* 1.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 18.
Marsil. Danub. Tom. V. pag. 8. *hujus icon satis accurata Tab.* 2.
Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 364.
Ardea cinerea major Jonstoni. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 5.
Ardea cinerea cristata. *Linn. Systh. Nat. ed.* 6. *Gen.* 55. *sp.* 3.
Ardea cristâ dependente. *Faun. Suec. Linn. N°.* 133.
Pella Aristoteli. *Gesn.*
Héron. *Bel. Portr. d'Oisf. pag.* 42 *a, dans laquelle il y a une figure peu exacte.*

Héron ordinaire. *Alb. Tom. III. pag.* 32 ; *avec une figure mal coloriée Pl.* 78.

Héron cendré. *Bel. Hist. Nat. des Ois. pag.* 189 ; *avec une figure peu exacte pag.* 190.

Les Hébreux l'appellent SCHALACH. *Gesn.*

Les Chaldéens, SCHALENUNA. *Gesn.*

Les Arabes, BABGACH. *Gesn.*

Les Perses, AUKOH. *Gesn.*

Les Grecs, Ἐρωδιὸς. *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Jonst. Charlet.* Πελλὸς. *Bel. Aldrov. Schwenck. Worm.*

Les Turcs, BALAKZEL. *Gesn. Aldrov.*

Les Portugais, GARZA. *Gesn. Aldrov.*

Les Espagnols, GARZA. *Gesn. Aldrov.*

Les Catalans, AGRO ; CAPU D'AIGUA ; BERNARD PISCAIRA. *Barr.*

Les Italiens, AIRON ; ANGHIRON. *Bel. Gesn. Aldrov.* AIRON NEGRO. *Aldrov.*

Les Savoyards, AIRON *ou* HEYRON. *Gesn. Aldrov.*

Les Suisses, REIGEL. *Gesn. Aldrov. Schwenck.*

Les Allemands, REIGER. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac.* REIHER. *Gesn. Aldrov. Schwenck.* RAYER ; HEER-GANSS. *Gesn. Aldrov.* HERR-GANSS. *Schwenck.*

Les Silésiens, REGER ; BLAWER REGER ; ASCHENFARBENER REGER. *Schwenck.*

Les Hollandois, REIGHER. *Aldrov.*

Les Flamands, RIEGHER. *Gesn. Aldrov.* BLAUWER REIGEL ; GRAUWER REIGEL. *Gesn. Aldrov.* GRAUER REIGEL. *Schwenck.*

Les Frisons, RARG. *Gesn. Aldrov.*

Les Illyriens, CZIEPIE. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, CZAPLA. *Rzac.* ZORAW. *Gesn. Aldrov.*

Les Suédois, HAEGER. *Linn.*

Les Anglois, HERON. *Gesn.* COMMON HERON. *Charlet. Sibbald. Alb.* ASH-COLOURED HERON. *Charlet.*

Grui fuscæ crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & decem pollices explet, & ad extremos ungues tres pedes totidem pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices

Il n'est pas si gros que la *Grue brune*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds trois pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces cinq lig-

nes de long ; sa queue six pouces huit lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois pouces trois lignes ; son pied cinq pouces six lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces huit lignes, l'extérieur trois pouces, l'intérieur deux pouces dix lignes ; & celui de derriere un pouce onze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a cinq pieds un pouce de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. Le milieu du dessus de la tête, depuis le bec jusque vers l'occiput, est d'un cendré-noirâtre. L'occiput est noir. Le reste du dessus de la tête, la partie supérieure & les côtés du col sont d'un cendré clair. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un cendré beaucoup plus foncé. La partie inférieure du dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les côtés sont d'un cendré un peu plus clair, mais moins que celui du dessus du col. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement

& totidem lineas longum est; cauda sex pollices & octo lineas; pars crurum plumis denudata tres pollices cum totidem lineis; pes quinque pollices & sex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum octo lineis, extimus tres pollices, intimus duos pollices & decem lineas; posticus autem unum pollicem & undecim lineas. Trium digitorum anticorum medius digito extimo coadunatur membranâ ad primum usque articulum productâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum quinque pedum & pollicis unius intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra caudam extremam protenduntur. Medius vertex, à rostro scilicet versùs occipitium usque, ex cinereo nigricat. Occipitium nigrum est. Reliquum caput superius, collumque superiùs & ad latera sunt dilutè cinerea. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ cinereo quidem tinguntur colore, sed multò saturatiore. Dorsum infimum, uropygium, superiores caudæ tectrices & latera tingit color cinereus nonnihil dilutior, minùs tamen quàm in collo superiore

dilutus. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & tantummodo cute flavo-viridescente obtegitur. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, inferioresque caudæ tectrices candore nitent. Secundùm colli inferioris longitudinem pennæ in medio positæ sunt in latere interiore nigræ : quæ sequuntur, idque secundùm eamdem directionem versùs infimum ventrem usque, interiùs ex cinereo nigricant; unde fit à gutture versùs imum ventrem usque tænia longitudinalis per totam colli longitudinem nigra, & in medio pectore, medioque ventre supremo cinereo-nigricans. Crurum suprema pars extrorsum grisea, introrsum candida. Pennæ alas subtus obtegentes cinereæ. Margines alarum ad articulum carpo humano respondentem, rufescunt, dein in reliqua longitudine albicant. Superiores alarum tectrices minores eodem imbuuntur cinereo ac dorsum ipsum tingitur : majores corpori viciniores sunt cinereæ quidem, sed paulò dilutiùs : majores à corpore remotiores nigræ. Ala notha similiter nigra. Vi-

d'une peau d'un jaune-verdâtre. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un beau blanc. Tout le long de la partie inférieure du col les plumes du rang du milieu ont leur côté intérieur noir : celles qui suivent la même direction jusque vers le bas-ventre, ont leur côté intérieur d'un cendré-noirâtre ; ce qui forme depuis la gorge jusque vers le bas-ventre une bande longitudinale, qui est noire dans toute la longueur du col, & d'un cendré-noirâtre sur le milieu de la poitrine & du haut du ventre. Le haut des jambes est gris en-dehors & blanc en-dedans. Les couvertures du dessous des aîles sont cendrées. Le bord de l'aîle, précisément sur le pli qui répond à celui du poignet, est roussâtre ; ensuite il est blanc dans le reste de sa longueur. Les petites couvertures du dessus des aîles sont du même cendré que celui du dos : les grandes les plus proches du corps sont d'un cendré un peu plus clair : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aîle bâtarde est de cette derniere couleur. L'aîle est composée de vingt-sept plumes : les vingt premieres sont noirâtres : les trois suivantes

ſont d'un cendré-noirâtre d'autant plus foncé, que la plume eſt plus éloignée du corps : & les quatre plus proches du corps ſont cendrées. Ces dernieres ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un cendré qui brunit un peu vers le bout de chaque plume. Le demi-bec ſupérieur eſt d'un jaune-verdâtre, excepté ſon bout, qui eſt noirâtre ; l'inférieur eſt jaunâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont verdâtres & les ongles noirâtres. Il ſe tient ſur les bords des lacs & des rivieres, & ſe nourrit de *Poiſſons*, de *Grenouilles*, &c. Il fait ſon nid dans les grands arbres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

ginti ſeptem remigibus ala conflatur : viginti primores nigricant : tres proximè ſequentes ſunt cinereo-nigricantes, idque eò ſaturatius, quò remix fit à corpore remotior : quatuor tandem corpori finitimæ cinereæ. Quæ noviſſimè dictæ ſunt longiſſimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereæ, versùs ipſarum apicem paululùm fuſceſcentes. Mandibula ſuperior eſt flavo-virideſcens, attamen in apice nigricans ; inferior flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedeſque virideſcentes ; ungues verò nigricantes. Lacuum & fluminum ripas frequentat, & *Piſcibus*, *Ranis*, &c. victitat. In excelſis arboribus nidificat. *Ex muſeo Realmuriano.*

** 2. Le Héron hupé.

Voyez Pl. XXXV.

Ardea criſtata, ſuperne cinerea, infernè alba ; medio vertice candido ; vertice ad latera, & criſtâ nigris ; collo inferiore maculis longitudinalibus nigris vario ; pennis in colli inferioris ima parte ſtrictiſſimis & longiſſimis ; tæniâ tranſversâ in ſummo pectore nigrâ ; faſciâ utrinque longitudinali in pectore & ventre nigrâ ; rectricibus cinereis ; roſtro fuſco-flavicante ; pedibus virideſcentibus .... Ardea cristata.

Ardea cinerea major. *Willugh. Ornith. pag.* 203. *hujus icon non ſatis accurata Tab. XLIX.*

Raj. Syn. Avi. pag. 98. *N°. A.* 1.

Alia Ardeæ ſpecies. *Geſn. icon. Avi. pag.* 117, *in qua capitis & colli icon non ſatis accurata.*

Alia quædam Ardea. *Geſn. Avi. pag.* 219. *capitis & colli eadem icon pag.* 220.

Alia quædam Ardea ex Ornithologo. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 383.

Ardea. *Jonſt. Avi. hujus icon non ſatis accurata Tab.* 52.

Héron. *Alb. Tom. I. pag.* 59; *avec une figure mauvaiſe & mal coloriée Pl.* 67.

Les Grecs l'appellent. Ἐρωδιός *Raj.*

Les Anglois, Common Heron. *Willugh. Raj.* Crested Heron. *Alb.*

Craſſitie præcedentem paululùm antecellit. Ipſius longitudo à roſtri apice ad caudæ extremitatem tres pedes & ſeſquipollicem æquat, & ad extremos ungues tres pedes ſeptem pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ſex pollices longum eſt; cauda ſex pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata duos pollices cum undecim lineis; pes quinque pollices & decem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum novem lineis, extimus tres pollices & totidem lineas, intimus duos pollices & decem lineas; poſticus autem viginti quinque lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum

Il eſt un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de trois pieds un pouce ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds ſept pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a ſix pouces de long; ſa queue ſix pouces ſix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, deux pouces onze lignes; ſon pied cinq pouces dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces neuf lignes, l'extérieur trois pouces trois lignes, l'intérieur deux pouces dix lignes; & celui de derriere vingt-cinq lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a cinq pieds quatre pouces de vol;

& ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le synciput est couvert de plumes blanches, dont quelques-unes sont fort longues, & qui, étant couchées les unes sur les autres, couvrent le milieu du sommet de la tête, & s'étendent jusqu'à l'occiput. Le dessus de la tête est couvert de plumes d'un beau noir, dont quelques-unes sont fort longues & fort étroites, & forment une belle hupe, qui retombe en arriere. La partie supérieure & les côtés du col sont d'un gris-blanc. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un très-joli cendré : quelques-unes des plumes scapulaires, sçavoir les supérieures, sont très-longues & très-étroites : les inférieures sont fort larges, & marquées de petites lignes transversales noirâtres, peu apparentes. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'oeil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau d'un verd-jaunâtre. Les joues & la gorge sont blanches. La partie inférieure du col est de la même couleur, & marquée de chaque côté d'un rang de taches longitudinales noires, placées sur le côté intérieur de cha-

articulum usque protensæ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quinque pedum & quatuor pollicum; alæ verò complicatæ caudam extrema attingunt. Synciput vestiunt pennæ candidæ, quarum quædam sunt longissimæ, quæque, aliæ aliis incumbentes, medium verticem cooperiunt, & ad occipitium usque protenduntur. Caput superius obtegunt pennæ splendidè nigræ, quarum quædam longissimæ sunt & strictissimæ, elegantemque cristam, retrorsum propendentem, efficiunt. Collum superiùs & ad latera ex cinereo albicat. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices sunt eleganter cinereæ. Ex scapularibus quædam, superiores scilicet, longissimæ sunt & strictissimæ: inferiores verò maximâ latitudine pollentes, & lineolis transversis nigricantibus, non multùm conspicuis, insignitæ. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & tantummodo cute viridi-flavicante tectum. Genæ & guttur albent. Pars colli inferior similiter albicat, & utrinque macularum

longitudinalium nigrarum in latere interiore cujusque pennæ collocatarum, serie insignitur. Pennæ colli inferioris partem infimam cooperientes longissimæ sunt & strictissimæ, pectusque ferè universum obtegunt : pennæ autem istæ pleræque sunt cinereo-albæ. In summo pectore lata extat tænia transversa splendidè nigra, utrinque versùs dorsum usque producta. Reliquum pectus & venter albicant, & in utroque latere fasciâ longitudinali splendidè nigrâ donantur : quæ fasciæ binæ à suprà dicta tænia transversa nigra oriuntur, & in imo ventre inter se connectuntur. Crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices sunt candidæ. Pennæ alas subtus & latera obtegentes cinereo tinguntur colore. Margines alarum ab articulo carpo humano respondente ad ipsarum extremitates usque albæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, cinereæ : majores à corpore remotiores nigræ. Ala notha similiter nigra. Alam componunt viginti octo remiges, omnes subtus cinereæ ; superne verò majores sunt nigræ : proximè sequentes ci-

que plume. Les plumes du bas de la partie inférieure du col sont très-longues & très-étroites, & couvrent presque toute la poitrine : la plûpart de ces plumes sont d'un gris-blanc. Sur le haut de la poitrine est une large bande transversale d'un beau noir, qui s'étend de chaque côté jusque vers le dos. Le reste de la poitrine & le ventre sont blancs, & bordés de chaque côté d'une bande longitudinale d'un beau noir : ces bandes partent toutes deux de la bande transversale noire, dont nous avons parlé ci-dessus, & vont se réunir au bas-ventre. Le haut des jambes est blanc, ainsi que les couvertures du dessous de la queue. Les couvertures du dessous des aîles & les côtés sont cendrés. Le bord de l'aîle est blanc depuis le pli qui répond à celui du poignet jusqu'à son extrémité. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont cendrées : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aile bâtarde est de cette derniere couleur. L'aîle est composée de vingt-huit plumes, toutes cendrées en-dessous ; mais en-dessus les grandes sont noires : les suivantes sont d'un cendré-noirâtre d'autant plus

foncé, que la plume eſt plus éloignée du corps : les ſix plus proches du corps ſont cendrées. Ces dernieres plumes ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aile eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue eſt compoſée de douze plumes cendrées. L'iris des yeux eſt d'un jaune-rouſſâtre : les paupieres ſont d'un verd-jaunâtre. Le bec eſt d'un brun-jaunâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont verdâtres ; & les ongles noirs. Il ſe tient ſur les bords des lacs & des rivieres, & ſe nourrit de *Poiſſons*, de *Grenouilles*, &c. Il fait ſon nid ſur le ſommet des grands arbres : ſes œufs ſont d'un bleu pâle & verdâtre. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

nereo-nigricantes, idque eò ſaturatiùs, quò remix ſit à corpore remotior : ſex corpori viciniores cinereæ. Quæ nuper deſcriptæ remiges ſunt longiſſimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereis cauda conſtat. Oculorum irides flavo-ruſeſcentes : palpebræ viridi-flavicantes. Roſtrum ex fuſco flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedeſque virideſcentes; ungues verò nigri. Juxta lacuum & fluviorum ripas verſatur, & *Piſcibus*, *Ranis*, &c. victitat. In excelſarum arborum cacuminibus nidificat : ova ponit pallidè cœruleo-virideſcentia. *Ex muſeo Realmuriano.*

** 3. LE HÉRON HUPÉ DE CAYENNE.

Ardea criſtata, dilutè cinerea; capite ſuperiore in medio cinereo, ad latera nigro; criſtâ cincreâ; collo albo, inferiùs maculis longitudinalibus nigro-cinereis vario; pennis in colli inferioris ima parte ſtrictiſſimis longiſſimis candidis; rectricibus dilutè cinereis; roſtro flavo-vireſcente; pedibus cinereis.... ARDEA CAYANENSIS CRISTATA.

Ardea Braſilienſis Cocoi dicta Marcgravio. *Willugh. Ornith. pag.* 209. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LI.*
Raj. Syn. Avi. pag. 100. *N°.* 15.
Cocoi Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 209. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 210.

Jonſt.

Jonst. Avi. pag. 143. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 61.
Cocoi secundus. *Pison. Hist. Nat. pag.* 89, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*
Heron bleu. *Alb. Tom. III. pag.* 32; *avec une figure mal coloriée Pl.* 79.
Second Crabier. *Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag.* 273; *avec une figure peu exacte pag.* 246. *N°.* 13.
Les Anglois l'appellent BLEW HERON. *Alb.*
Les Brasiliens, COCOI. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes & pollicem unum explet, & ad extremos ungues tres pedes decem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices & novem lineas longum est; cauda quinque pollices; pars crurum plumis denudata quatuor pollices; pes sex pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & novem lineas, extimus tres pollices cum totidem lineis, intimus duos pollices & decem lineas; posticus autem duos pollices cum linea unica. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum quinque pedum & pollicis unius intervallo distant; alæ verò com-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds un pouce, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds dix pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces neuf lignes de long; sa queue cinq pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre pouces; son pied six pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces neuf lignes, l'extérieur trois pouces trois lignes, l'intérieur deux pouces dix lignes; & celui de derriere deux pouces une ligne. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a cinq pieds un pouce de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est cendré. Les côtés du

dessus de la tête sont noirs. Les plumes qui couvrent l'occiput, sont cendrées, très-longues, très-étroites, & forment une jolie hupe : quelques-unes ont jusqu'à cinq pouces six lignes de long, & pendent en arriere sur le col. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau cendrée. Les joues, la gorge & le col sont d'un beau blanc : la partie inférieure du col est marquée de chaque côté d'un rang de taches longitudinales d'un cendré-noir, placées sur le côté intérieur de chaque plume. Le bas de la partie inférieure du col est garni de plumes très-longues, très-étroites, très-flexibles & d'un beau blanc. Le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont d'un joli cendré clair. Les scapulaires supérieures sont très-longues, très-étroites & flexibles. Les plumes de l'aîle sont du même cendré que celui du reste du corps. Les plus proches du corps sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle.

plicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Summum caput cinereum est. Caput superius ad latera nigrum. Pennæ occipitium obtegentes cinereæ sunt, longissimæ, strictissimæ, elegantemque cristam efformant : ex illis quædam quinque pollicum & sex linearum longitudinem obtinent, & retrorsum supra collum propendent. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & tantummodo cute cinereâ obductum. Genæ, guttur & collum albore nitent : pars colli inferior utrinque macularum longitudinalium cinereo-nigricantium, in latere interiore cujuslibet pennæ collocatarum, serie insignitur. Colli inferioris pars infima pennis obsita est longissimis, strictissimis, valdè flexibilibus & candidis. Dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera, scapulares pennas, alas superne & infernè vestientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores tingit color dilutè cinereus elegans. Scapulares superiores longissimæ sunt, strictissimæ & valdè flexibiles. Remiges alarum eodem imbuuntur cinereo ac reliquum cor-

pus ipsum tingitur. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices dilutè cinereæ. Oculorum irides aureo colore imbutæ. Rostrum ex flavo virescit. Pars crurum plumis denudata, pedesque cinerei; ungues verò fusci. Habitat in *Brasilia* & *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Artur*.

La queue est composée de douze plumes d'un cendré clair. L'iris des yeux est de couleur d'or. Le bec est d'un jaune-verdâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont cendrés; & les ongles bruns. On le trouve au *Brésil* & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur*, par *M. Artur*.

4. Le Héron cendré.

Ardea cinerea, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; collo inferiore & pectore albis, maculis longitudinalibus nigris variegatis; rectricibus cinereis. . . . . ARDEA CINEREA.

Ardea minor alia rostro arcuato. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 402, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Ardea minor alia rostro arcuato Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 207. *Raj. Syn. Avi. pag.* 100. *N°.* 10.
Ardea rostro maximè arcuato. *Jonst. Avi. pag.* 104.

Hæc est Ardeæ species minor. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ tectrices sunt saturatè cinereæ. Ventrem, latera, crurum partem supremam, inferiores caudæ tectrices & pennas alas subtus obtegentes tingit color

Celui-ci est de la petite espece. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un cendré foncé. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont de la

même couleur, mais plus claire. La gorge eſt blanche. La partie inférieure du col & la poitrine ſont de la même couleur, & variées de taches longitudinales noires. Les plumes de l'aîle ſont cendrées. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes de la même couleur que celles de l'aîle. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. J'ignore la couleur du bec & des pieds. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

cinereus quidem, ſed dilutior. Guttur albicat. Collum inferius & pectus ſimiliter albent, maculiſque longitudinalibus nigris variegantur. Remiges alarum ſunt cinereæ. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque productâ. Cujus coloris ſint roſtrum, pedeſque, prorſus me latet. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

5. LE HÉRON CENDRÉ DU MEXIQUE.

Ardea criſtata, cinerea; fronte albo & nigro varia; capite ſuperiore & criſtâ purpuraſcentibus; alis albo, cinereo & cyaneo variis; rectricibus cinereis; roſtro nigro; pedibus fuſco, nigro & flaveſcente variegatis.... ARDEA MEXICANA CINEREA.

Xoxouqui hoactli. *Fern. Hiſt. Nov. Hiſp. pag.* 40. *cap. CXXVI.*
Xoxouhqui-hoactli. *Fern. Hiſt. Nov. Hiſp. pag.* 14. *cap. VI.*
Xoxouhqui hoactli, Hoacton, ſeu Ardea cinerea minor Mexicana criſtata. *Raj. Syn. Avi. pag.* 102. *N°.* 21.
Les Mexiquains l'appellent XOXOUQUI-HOACTLI *ou* XOXOUHQUI-HOACTLI. *Fern.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du précédent. Sa longueur

Præcedentem craſſitie circiter æmulatur. Ipſius longi-

tudo ab apice roſtri ad extremos ungues duos pedes & tres circiter pollices æquat. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ſeptem pollices longum eſt ; pes, ſimul cum digitis, novem pollices. Capitis pars anterior ſive frons albo & nigro promiſcuè variegatur. Reliquum caput ſuperius eſt purpureum. In capitis vertice ſeptem extant pennæ ſimiliter purpureæ, criſtam efficientes. Guttur, collum, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, tectrices caudæ ſuperiores & inferiores, & pennæ alas ſubtus obtegentes cinereo tinguntur colore. Margines alarum, ad articulum carpo humano reſpondentem, albent. Superiores alarum tectrices, ſicut & remiges, cinereo & cyaneo variegantur. Remiges corpori viciniores ſunt longiſſimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereis cauda conflatur. Roſtrum nigrum. Pedes fuſco, nigro & flaveſcente variegati. Trium digitorum anticorum medius digito extimo membranâ, ad primum

depuis le bout du bec juſqu'à celui des ongles eſt d'environ deux pieds trois pouces. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a ſept pouces de long; ſon pied, joint avec les doigts, neuf pouces. Le devant de la tête ou le front eſt varié confuſément de blanc & de noir. Tout le reſte du deſſus de la tête eſt pourpre. Sur le ſommet de la tête ſont ſept plumes de la même couleur, qui forment une hupe. La gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, celles du deſſous des aîles & les côtés ſont cendrés. Le bord de l'aîle, ſur le pli qui répond à celui du poignet, eſt blanc. Les couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les plumes de l'aîle, ſont variées de cendré & de bleu. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes cendrées. Le bec eſt noir. Les pieds ſont variés de brun, de noir & de jaunâtre. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt

extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve dans les marais du *Mexique*.

usque articulum protensâ, coadunatur. In paludibus *Mexicanis* habitat.

6. Le Héron cendré d'Amérique.

Ardea superne dilutè cinerea, infernè alba; remigibus partim nigris, partim candidis; rectricibus dilutè cinereis; rostro cyaneo, apice nigro; pedibus cœruleis. . . . Ardea Americana cinlrea.

Héron ou Calidris leucophæa. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag* 287. (*ed.* 1725).

Il est à peu près de la grosseur d'une *Corneille*. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré clair. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau d'un bleu d'azur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessus des ailes sont du même cendré que celui du dos, & mêlées de quelques plumes noires. Les plumes de l'aîle sont en partie noires

Cum *Cornice* crassitie circiter convenit. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt dilutè cinereæ. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & tantummodo cute cyaneâ obductum. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, & pennæ caudam subtus obtegentes albicant. Superiores alarum tectrices eodem imbuuntur cinereo ac dorsum ipsum tingitur, quibusdam tamen pennis nigris interspersis. Remiges sunt partim nigræ partim candidæ. Corpori fini-

timæ majorem obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices dilutè cinereæ. Rostrum cyaneum, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque cœrulei; ungues verò nigri. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum usque articulum protensâ. Habitat in *America*.

& en partie blanches. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un cendré clair. Le bec est d'un bleu d'azur, excepté son extrémité, qui est noire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont bleus; & les ongles noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Amérique*.

7. Le Héron de la Baye de Hudson.

Ardea cristata, superne cinereo-fuscescens, infernè alba; collo inferiore & pectore maculis longitudinalibus nigris, rufescente mixtis, variis; capite superiore & cristâ nigris; collo superiore fusco, colore saturatiore transversim striato; pennis in colli inferioris ima parte strictissimis longissimis; rectricibus fuscis; rostro superiùs nigro, infernè aurantio; pedibus nigricantibus. . . . . Ardea Freti Hudsonis.

Héron cendré de l'Amérique Septentrionale. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXV; avec une figure exacte Pl.* 135.
Les Anglois l'appellent Ash-colour'd Heron from North-America. *Edwards.*

Ardeam cristatam nostratem crassitie paululùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam ex-

Il est un peu plus gros que *notre Héron hupé*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ

trois pieds deux pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds onze pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a cinq pouces ſept lignes & demie de long; ſa queue environ quatre pouces neuf lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, deux pouces neuf lignes; ſon pied ſix pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces onze lignes, l'extérieur quatre pouces deux lignes, l'intérieur quatre pouces; & celui de derriere deux pouces dix lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt couverte de plumes noires, dont quelques-unes ont quatre pouces de longueur, & forment une belle hupe. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau d'un jaune-verdâtre. La gorge & les côtés de la tête ſont blancs. La partie ſupérieure du col eſt brune, & rayée tranſverſalement d'une

tremam tres pedes duos pollices & ſex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues tres pedes undecim pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quinque pollices & ſeptem cum ſemi lineas longum eſt; cauda quatuor pollices & novem circiter lineas; pars crurum plumis denudata duos pollices & novem lineas; pes ſex pollices cum linea unica; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & undecim lineas, extimus quatuor pollices cum lineis binis, intimus quatuor pollices; poſticus autem duos pollices & decem lineas. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ ad primum articulum uſque productâ. Alæ complicatæ ad extremitatem caudæ pertingunt. Partem capitis ſuperiorem obtegunt pennæ nigræ, quarum quædam quatuor pollicum longitudine pollent, elegantemque criſtam efficiunt. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & tantummodo cute flavo-virideſcente obducitur. Caput ad latera, gutturque

turque albicant. Pars colli superior fusca est, coloreque saturatiore transversim striata. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices ex cinereo fuscescunt. Partem colli inferiorem & pectus obtegunt pennæ candidæ, majusculis maculis longitudinalibus nigris, rufescente mixtis, insignitæ. Colli inferioris pars infima pennis obsita est longissimis, strictissimis, pectori incumbentibus. Venter & tectrices caudæ inferiores albicant. Crurum suprema pars rufescit. Pennæ alas subtus cooperientes, sicut & latera, sunt cinereo-cœrulescentes. Margines alarum, ab ipsarum exortu ad articulum carpo humano respondentem usque, vestiunt plumulæ fuscæ, rufescente fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, dorsi instar, cinereo imbuuntur colore, attamen nonnihil dilutiore: majores à corpore remotiores sunt fuscæ, cinereo-fuscescente marginatæ. Remiges alarum minores concolores: majores penitùs fuscæ. Remiges corpori viciniores maximam obtinent

couleur plus foncée. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-brunâtre. La partie inférieure du col & la poitrine sont couvertes de plumes blanches, marquées de grandes taches longitudinales noires, mêlées de roussâtre. Le bas de la partie inférieure du col est garni de plumes très-longues & très-étroites, qui retombent sur la poitrine. Le ventre est blanc, ainsi que les couvertures du dessous de la queue. Le haut des jambes est roussâtre. Les couvertures du dessous des aîles & les côtés sont d'un cendré-bleuâtre. Le bord de l'aîle, depuis son origine jusqu'au pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes brunes, bordées de roussâtre. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même cendré que le dos, mais un peu plus clair: les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & bordées de cendré-brunâtre. Les moyennes plumes de l'aîle sont de la même couleur: les grandes sont tout-à-fait brunes. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée,

presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes brunes. Le demi-bec supérieur est noir; l'inférieur est orangé. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes est jaunâtre. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve à la *Baye de Hudson*.

longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices fuscæ. Mandibula superior nigra, inferior aurantia. Pars crurum plumis denudata flavicat. Pedes, unguesque nigricant. Habitat in *Freto Hudsonis*.

8. Le Héron tacheté.

Ardea superne cinereo-fuscescens, maculis rufis varia, infernè cinereo-alba; pectore maculis rufis, albis & nigris asperso; remigibus apice albis; rectricibus cinereo-fuscescentibus; rostro roseo; pedibus virescentibus . . . . Ardea nævia.

Ardeæ cinereæ tertium genus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 383. *hujus icon non satis accurata pag.* 382.
Ardeæ cinereæ tertium genus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 204. *Raj. Syn. Avi. pag.* 98. *N°.* 2.
Ardeæ cinereæ congener. *Jonst. Avi. pag.* 103.

Il est presqu'aussi gros que le *Héron ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces de long; sa queue six pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce; son pied environ cinq pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs,

Ad *Ardeæ vulgaris* crassitiem accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes & novem pollices æquat, & ad extremos ungues tres pedes. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor pollices longum est; cauda sex pollices; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes quinque circiter pollices; trium digitorum anticorum medius cum

ungue tres pollices : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ caudæ extremitatem attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ tectrices sunt cinereo-fuscescentes, qualibet tamen penna maculâ rufâ terminata. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & cute nudâ solummodo obtegitur. Guttur, pars colli inferior, venter, latera, inferioresque caudæ tectrices ex cinereo albicant. Pectus eodem imbuitur colore, sed in tota superficie maculis aspergitur, aliis rufis, aliis albis, nigris alteris. Crurum suprema pars ex cinereo-albo paululùm ad rufescentem inclinat colorem. Remiges alarum ex cinereo fuscescunt, & unaquæque maculâ terminatur candidâ. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala

joint avec l'ongle, trois pouces : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est le plus court de tous. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent, jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un cendré-brunâtre, chaque plume étant terminée par une tache rousse. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau nue. La gorge, la partie inférieure du col, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris-blanc. La poitrine est de la même couleur, & toute parsemée de taches, les unes rousses, les autres blanches & les autres noires. Le haut des jambes est d'un gris-blanc tirant un peu sur le roussâtre. Les plumes de l'aîle sont d'un cendré-brunâtre, & terminées chacune par une tache blanche. Les plus proches du corps sont fort lon-

gues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-brunâtre. La prunelle des yeux est noire : leur iris est jaune. Le bec est de couleur de rose. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verdâtres. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereo-fuscescentibus cauda conflatur. Oculorum pupilla nigra : ipsorum irides luteæ. Rostrum roseo colore imbutum. Pars crurum plumis denudata, pedesque virescentes. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

** 9. LE HÉRON GRIS.

Voyez Pl. XXXVI. Fig. 1.

Ardea superne griseo-fusca, infernè alba, griseo mixta; vertice fusco; tæniâ supra oculos albido & fusco variâ; gutture albo; collo inferiore griseo, pennis tæniâ longitudinali fulvescente in medio notatis; uropygio cinereo-albo; rectricibus griseo-cinereis, lateralibus albo in apice marginatis : rostro superiùs & apice nigro, infernè fusco; pedibus griseo-fuscis. * . . . ARDEA GRISEA.

Il n'est guères plus gros qu'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied dix pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces sept lignes de long; sa queue quatre pouces deux lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, neuf lignes;

Crassitie *Cornicem* non multùm excedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem octo pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem decem pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & septem lineas longum est; cauda quatuor pollices cum lineis binis ; pars cru-

rum plumis denudata novem lineas; pes duos pollices cum novem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & undecim lineas, extimus duos pollices cum tribus lineis, intimus viginti quinque lineas; posticus autem unum pollicem & octo lineas. Trium digitorum anticorum medius digito extimo membranâ, ad primum articulum usque productâ, coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum unius pollicis & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput superius fuscum est: ex pennis tamen occipitium obtegentibus quædam viridi-aureo colore variant. Collum superiùs & ad latera vestiunt pennæ griseæ, tæniâ ad fulvum vergente & secundùm scapi longitudinem ductâ notatæ. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ minores sunt griseo-fuscæ. Majores pennæ scapulares griseo-cinereæ. Dorsum infimum, uropygium, superiores caudæ tectrices & latera ex cinereo albent. In utroque capitis latere tænia ex-

son pied deux pouces neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces onze lignes, l'extérieur deux pouces trois lignes, l'intérieur vingt-cinq lignes; & celui de derriere un pouce huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a trois pieds un pouce quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est brune: quelques-unes des plumes de l'occiput sont changeantes en une couleur de verd-doré. La partie supérieure & les côtés du col sont couverts de plumes grises, marquées chacune d'une bande tirant sur le fauve, & qui s'étend selon la longueur de leur tige. La partie supérieure du dos & les petites plumes scapulaires sont d'un gris-brun. Les grandes plumes scapulaires sont d'un gris-cendré. La partie inférieure du dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les côtés sont d'un gris-blanc. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale, variée de brun & de blanchatre, qui

s'étend depuis les narines jusqu'au-dessus des yeux. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau blanchâtre. Les joues sont variées de blanc & de brun. La gorge est blanche. La partie inférieure du col est couverte de plumes, qui sont d'un blanc tirant sur le fauve dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & grises sur les deux côtés. Le bas de la partie inférieure du col est garni de plumes assez longues, qui couvrent une partie de la poitrine, & sont tout-à-fait blanches. La poitrine & le haut du ventre sont d'un blanc mêlé de gris. Le bas-ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sans aucun mêlange d'autre couleur. Le haut des jambes est garni extérieurement de plumes blanches dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & grises sur les côtés; & il est couvert intérieurement de plumes tout-à-fait blanches. Les petites couvertures du dessous des aîles sont grises, & marquées chacune d'une bande blanche, qui s'étend selon la longueur de leur tige : les grandes sont d'un gris-blanc & terminées de blanc : de ces dernieres, les

tat longitudinalis fusco & candicante varia, à naribus supra oculos usque protensa. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & cute albidâ tantummodo tegitur. Genæ albo & fusco variegantur. Guttur albicat. Partem colli inferiorem obtegunt pennæ in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem albo-fulvescentes, in utroque latere griseæ. Colli inferioris pars infima pennis obsita est longiusculis, pectus partim obtegentibus, & penitùs candidis. Pectus & venter supremus albent, & aliquid grisei admixtum habent. Venter imus, inferioresque caudæ tectrices albicant, nullo altero colore admixto. Crurum partem supremam exteriùs vestiunt pennæ in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem albæ, ad latera griseæ; interiùs verò illam cooperiunt pennæ penitùs candidæ. Inferiores alarum tectrices minores sunt griseæ, tæniâ candidâ, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, insignitæ : majores cinereo-albæ, albo terminatæ : ex majoribus autem corpori finitimæ marginibus exterio-

ribus candidis quoque prædıtæ ſunt. Superiores alarum tectrices minimæ ex griſeo fuſceſcunt, & tæniâ albo-fulveſcente, ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem ductâ, notantur: minores ſunt griſeæ : majores ex griſeo cinereæ, maculâ candidâ terminatæ. Alam notham componunt pennæ tectricibus alarum majoribus ſuperioribus concolores, & inſuper exteriùs albo fimbriatæ. Viginti quatuor remigibus griſeo-cinereis ala conſtat : octodecim primores (decimâ tamen exceptâ) maculâ albâ in apice præditæ ſunt : ſex reliquæ, à decima nona ſcilicet ad vigeſimam quartam uſque incluſivè, ſunt immaculatæ. Quæ ſex noviſſimè dictæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ ſunt griſeo-cinereæ : laterales omnes eodem imbutæ colore, & inſuper albo in apice marginatæ : quæ margo alba eò majorem obtinet latitudinem, quò rectrix fit exterior. Mandibula ſuperior nigra, attamen ad latera candicans: inferior fuſca, exceptâ ex-

plus proches du corps ſont auſſi bordées extérieurement de blanc. Les plus petites couvertures du deſſus des aîles ſont d'un gris-brun, & ont chacune une bande d'un blanc-fauve, qui s'étend ſelon la longueur de leur tige : les moyennes ſont griſes : les plus grandes ſont d'un gris-cendré, & terminées par une tache blanche. Les plumes de l'aîle bâtarde ſont de la même couleur que ces dernieres couvertures, & de plus bordées extérieurement de blanc. L'aîle eſt compoſée de vingt-quatre plumes d'un gris-cendré : les dix-huit premieres (ſi l'on en excepte la dixieme) ſont terminées chacune par une tache blanche : les ſix autres, ſçavoir depuis la dix-neuviéme juſqu'à la vingt-quatriéme incluſivement, ſont ſans taches. Ces ſix dernieres ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont d'un gris-cendré : toutes les latérales ſont de la même couleur, & de plus bordées de blanc par le bout : cette bordure eſt d'autant plus large que la plume eſt plus extérieure. Le demi-bec ſupérieur eſt noir, excepté ſur ſes côtés, où il eſt

blanchâtre : l'inférieur est brun, excepté son extrémité, qui est noire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. On le trouve sur les bords des rivieres & des étangs. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

tremitate nigrâ. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque griseo-fusci. Fluviorum & stagnorum ripas frequentat. *Ex mu..o D. Aubry.*

10. Le Héron hupé de Virgini..

Ardea cristata, fusca; collo inferiore & pectore rufescentibus, maculis longitudinalibus fuscis variis; remigibus nigris; rectricibus fuscis; rostro superne & infernè fusco, ad latera fusco-flavicante; pedibus fuscis . . . . Ardea Virginiana cristata.

Ardea occipite cristato, dorso cinereo, femoribus rufis, pectore maculis oblongis nigris. Herodias. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 11.
Ardea cristata maxima Americana. *Klein. Avi. pag.* 125. *N°.* 14.
Grand Héron hupé. *Catesb. append. pag.* 10; *avec une assez bonne figure de la tête & du col. Pl.* 10. *fig.* 1.
Les Anglois l'appellent Largest Crested Heron. *Catesb.*

Il est plus grand & plus gros que toutes les autres especes de *Heron* connues. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui des ongles est de plus de cinq pieds. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a près de huit pouces de long. La tête est couverte de plumes brunes : celles qui partent de l'occiput, sont étroites & fort longues, quelques-unes ayant jusqu'à cinq pouces de longueur, & forment une belle

Omnium *Ardearum* hactenus cognitarum hæc est maxima & crassissima species. Ipsius longitudo ab apice rostri ad extremos ungues quinque pedes & amplius explet. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octo ferè pollices longum est. Caput obtegunt pennæ fuscæ : quæ ab occipitio oriuntur, strictissimæ sunt & longissimæ, quædam enim quinque pollicum longitudinem obtinent

nent, elegantem efformant cristam, quam Avis ad libitum erigere aut contrahere potest. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute obtegitur fusco-flavicante. Guttur & pars colli superior rufescunt. Collum inferius & pectus eodem imbuuntur colore, maculis longitudinalibus fuscis vario. Dorsum, uropygium, scapulares pennas, ventrem, latera, crurum partem supremam, tectrices caudæ superiores & inferiores, & pennas alas superne & infernè cooperientes fuscus tingit color. Remiges alarum sunt nigræ. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus fuscis cauda constat. Rostrum superne & infernè fuscum, ad latera verò fusco-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusci. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Habitat in *Virginia*, ibique lacuum & fluviorum ripas frequentat,

hupe, que l'Oiseau peut redresser ou abaisser à volonté. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau d'un brun-jaunâtre. La gorge & la partie supérieure du col sont roussâtres. La partie inférieure du col & la poitrine sont de la même couleur, & variées de taches longitudinales brunes. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessus & du dessous des aîles, & les côtés sont bruns. Les plumes de l'aîle sont noires. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes brunes. Le bec est brun en-dessus & en-dessous, & d'un brun-jaunâtre sur ses côtés. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Virginie*, où il se tient sur les bords des lacs & des rivieres, & se nourrit de

Poissons, de *Grenouilles*, de *Lezars*, &c. & *Piscibus*, *Ranis*, *Lacertis*, &c. victitat.

11. LE HÉRON HUPÉ DU MEXIQUE.

Ardea cristata, superne (nigro-virescens, *mas*) (fusca, albo varia, *fœmina*), infernè alba, (fusco variegata, *fœmina*); vertice & cristâ nigris; tæniâ ab oculo ad oculum, & collo candidis; alis superne cinereo-virescentibus; rectricibus cinereis; rostro superne & infernè nigro, ad latera flavicante; pedibus dilutè flavis .... ARDEA MEXICANA CRISTATA.

Avis ficca. *Eus. Nieremb. pag.* 222. (*Mas.*)
Avis ficca, Hoactli, seu Tobactli. *Willugh. Ornith pag.* 300. (*Mas*).
Hoactli, seu Avis ficca. *Raj. Syn. Avi. pag.* 179. *N°.* 8. (*Mas*).
Hoactli, seu Tobactli, id est, Avis ficca. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag.* 26. *cap. LIII.* (*Mas*).
Jonst. Avi. pag. 128. (*Mas*).
Hoacton. *Eus. Nieremb. pag.* 225. (*Fœmina*).
Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 13. *cap. I.* (*Fœmina*).
Willugh. Ornith. pag. 302. (*Fœmina*).
Les Espagnols du Mexique appellent le mâle MARTINETE PESCADOR. *Fern. Willugh.*
Les Mexiquains, le mâle, HOACTLI; TOBACTLI; *& la femelle*, HOACTON. *Nieremb. Fern. Willugh. & quelques-uns* XOXOUHQUI-HOACTLI. *Nieremb. Fern.*

Il est de la grosseur d'une *Poule*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds trois pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds neuf pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces de long; sa queue environ six pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, son pied & celui du mi-

Cum *Gallina* crassitie convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem duos pedes & tres pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes & novem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices longum est; cauda sex circiter pollices; pars crurum plumis denudata, pes, triumque digito-

rum anticorum medius cum ungue, simul commensurati, unum pedem. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Capitis verticem obtegunt pennæ nigræ, quarum quædam maximè longitudine pollent, elegantemque cristam efficiunt. Caput anterius cingit tænia candida, ab oculo ad oculum producta. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & tantummodo cute flavicante coopertum. Guttur, collum, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ caudam subtus obtegentes, inferioresque alarum tectrices albicant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices ex nigro splendidè virescunt. Tectrices alarum superiores sunt cinereæ, & aliquid viridis admixtum habent. Remiges cinereæ. Corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereæ. Oculi magni sunt &

lieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, le tout pris ensemble, un pied. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Le sommet de la tête est couvert de plumes noires, dont quelques-unes sont fort longues, & forment une belle hupe. Le devant de la tête est entouré d'une bande blanche, qui s'étend d'un œil à l'autre. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. La gorge, le col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir-verd assez brillant. Les couvertures du dessus des aîles sont d'un cendré sur lequel est une légere teinte de verd. Les plumes de l'aîle sont cendrées. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes cendrées. Les yeux sont

grands & noirs : leur iris eft jaune; & les paupieres font rouges. Le bec eft noir deffus & deffous, & jaunâtre fur fes côtés. La partie des jambes qui eft dégarnie de plumes, & les pieds font d'un jaune clair.

La *femelle* différe du *mâle* en ce que le deffus de fon corps eft d'un brun varié de blanc, & le deffous d'un blanc varié de brun. Du refte elle lui reffemble affez bien. Elle fait fon nid, & éleve fes Petits dans les rofeaux.

On les trouve au *Mexique*, où ils fe tiennent fur les bords des lacs, & fe nourriffent de *Poiffons*.

nigri : ipforum irides luteæ; palpebræ verò rubræ. Roftrum fuperne & infernè nigrum, ad latera verò flavefcens. Pars crurum plumis denudata, pedefque funt dilutè flavi.

Fœmina à *mare* difcrepat corpore fuperiore fufco, albo variegato, & parte inferiore albo, fufcô vario. In reliquis cum illo fatis benè convenit. In arundinetis nidificat, & Sobolem educat.

Habitant in *Mexico*, ibique lacuum ripas frequentant, & *Pifcibus* victitant.

12. LE HÉRON POURPRÉ.

Ardea fuperne caftaneo-purpurea, infernè cinerafcens; vertice cinereo-nigricante; collo fuperne cinereo, lineolis nigricantibus vario, collo inferiore & pectore maculis obfcurè flavis afperfis; rectricibus caftaneo-purpureis; roftro fuperiùs flavo-viridefcente, in exortu & infernè flavicante; pedibus grifeo-fufcis . . . . ARDEA PURPURASCENS.

Ardea cinerea flavefcens, nova fpecies. *Marfil. Danub. Tom. V. pag.* 20. *hujus icon minùs accurata Tab.* 8.

Ardea cinerea flavefcens, nova fpecies, Marfilli. *Klein. Avi. pag.* 124. *N°.* 12.

Il eft à peu près de la grandeur & de la groffeur du *Héron ordinaire*; mais il a la tête plus groffe, & le bec plus allongé. Le fommet de la tête eft d'un cendré-noirâtre. La partie fu-

Magnitudine & craffitie cum *Ardea vulgari* circiter convenit; capite tamen craffiori & roftro magìs elongato donatur. Vertex capitis ex cinereo nigricat. Pars colli fu-

perior cinereo tingitur colore, lineolis nigricantibus vario. Collum inferius & pectus sunt quoque cinerea, maculis obscurè flavis eleganter aspersa. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute flavescente coopertum. Dorsum, uropygium, scapulares pennas, superioresque caudæ tectrices tingit color castaneo-purpureus. Venter, crurum suprema pars & latera cinereo imbuuntur; qui color, versùs imum ventrem procedendo, magìs magìsque fit dilutior. Pennæ caudam subtus obtegentes sunt quoque dilutè cinereæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur: majores à corpore remotiores sunt fusco-nigricantes. Remiges alarum ex fusco similiter nigricant. Corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus castaneo purpureis cauda conflatur. Mandibula superior in exortu flavicans, in reliqua longi-

périeure du col est d'un cendré varié de petites lignes noirâtres. La partie inférieure du col & la poitrine sont pareillement cendrées, & joliment parsemées de taches d'un jaune obscur. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un marron-pourpré. Le ventre, le haut des jambes & les côtés sont cendrés: cette couleur devient de plus en plus claire, en approchant vers le bas-ventre. Les couvertures du dessous de la queue sont de même d'un cendré clair. Les petites du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre. Les plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un marron-pourpré. Le demi-bec supérieur est jaunâtre à son origine, & d'un jaune-verdâtre dans le reste

de sa longueur; le demi-bec inférieur est entiérement jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve sur les bords du *Danube*.

tudine flavo-viridescens; mandibula inferior penitùs flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque griseo-fusci. Trium digitorum anticorum medius digito extimo membranâ, ad primum articulum usque productâ, coadunatur. Juxta *Danubii* ripas versatur.

13. LE HÉRON POURPRÉ DU MEXIQUE.

Ardea castaneo-purpurea, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; capite dilutè spadiceo, vertice nigro; remigibus saturatè spadiceis; rectricibus castaneo-purpureis . . . . ARDEA MEXICANA PURPURASCENS.

Ardea Mexicana; seu Avis Xoxouquihaactli. *Seb. Vol. I. pag.* 100. *hujus icon non satis accurata Tab. LXIV. fig.* 2.
Crex. *Moehr. Avi. Gen.* 82.

Il est à peu près de la grosseur d'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces trois lignes de long; sa queue environ trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, huit lignes; son pied un pouce huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pou-

Cornicem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem circiter explet, & ad extremos ungues tredecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & tres lineas longum est; cauda tres circiter pollices; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes unum pollicem cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pol-

lices & totidem lineas, extimus unum pollicem & decem cum semi lineas, intimus unum pollicem cum novem lineis; posticus autem quindecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alæ complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. Vertex capitis nigro tingitur colore. Reliquum caput est dilutè spadiceum. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute nudâ obtegitur. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ tectrices sunt castaneo-purpureæ. Guttur, collum inferius, pectus, ventrem, latera, crurum partem supremam, inferiores caudæ tectrices & pennas alas subtus obtegentes idem tingit color, sed dilutior. Remiges alarum sunt saturatè spadiceæ. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cas-

ces deux lignes, l'extérieur un pouce dix lignes & demie, l'intérieur un pouce neuf lignes; & celui de derriere quinze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est noir. Le reste de la tête est d'un rouge-bai clair. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau nue. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un marron-pourpré. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont de la même couleur, mais plus claire. Les plumes de l'aîle sont d'un rouge-bai foncé. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un marron-

pourpré. J'ignore la couleur du bec & des pieds. On le trouve au *Mexique*.

taneo-purpureæ. Cujus coloris sint rostrum & pedes, prorsus me latet. Habitat in *Mexico*.

** 14. Le Héron pourpré hupé.

Voyez Pl. XXXVI. Fig. 2.

Ardea cristata, superne obscurè olivacea, infernè purpurascens; vertice & cristâ splendidè nigris; collo supremo rufo, triplici tæniâ nigrâ notato; colli inferioris imâ parte maculis longitudinalibus nigris variâ; pennis in colli inferioris ima parte strictissimis & longissimis; fasciâ longitudinali à pectore ad anum nigrâ; rectricibus saturatè cinereis, superne ad olivaceum, infernè ad cœrulescentem colorem vergentibus; rostro superiùs dilutè fusco, infernè flavicante, apice nigricante; pedibus virescentibus . . . .
Ardea cristata purpurascens.

Il est beaucoup moins gros que le *Héron ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds quatre pouces huit lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a six pouces de long; sa queue cinq pouces deux lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces cinq lignes; son pied quatre pouces quatre lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces sept lig-

Ardeæ vulgari multùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes decem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues tres pedes quatuor pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex pollices longum est; cauda quinque pollices cum lineis binis; pars crurum plumis denudata duos pollices & quinque lineas; pes quatuor pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius, cum ungue, quatuor pollices

&

& septem lineas, extimus tres pollices cum octo lineis, intimus tres pollices & quatuor lineas; posticus autem duos pollices & octo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuor pedum & sesquipollicis intervallo distant; alæ verò complicatæ ad caudæ extremitatem usque protenduntur. Partem capitis superiorem obtegunt pennæ splendidè nigræ: quæ capitis verticem cooperiunt, longæ sunt & strictissimæ, elegantemque cristam efficiunt: ex illis autem pennis binæ quatuor pollicum & novem linearum longitudinem obtinent. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute obducitur flavicante. In utroque capitis latere exigua extat tænia nigra, ab oris angulis orta, & ad occipitium usque obliquè producta. Guttur albicat. Collum ab ipsius exortu, idque caput versùs, ad mediam longitudinem usque rufum, tribus notatum tæniis longi-

nes, l'extérieur trois pouces huit lignes, l'intérieur trois pouces quatre lignes; & celui de derriere deux pouces huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a quatre pieds un pouce six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes d'un noir brillant: celles du sommet de la tête sont longues & très-étroites, & forment une jolie hupe: deux de ces plumes ont jusqu'à quatre pouces neuf lignes de longueur. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. De chaque côté de la tête est une petite bande noire, qui part des coins de la bouche, & monte obliquement jusqu'à l'occiput. La gorge est blanche. Le col depuis son origine vers la tête jusqu'à la moitié de sa longueur est roux, & marqué de trois bandes longitudinales noires, dont une placée au milieu, qui part de l'occiput & s'étend sur la partie supérieure du col, & une autre de chaque côté, qui

part des coins de la bouche, & s'étend tout le long des côtés du col. Le reſte de la longueur du col eſt cendré en-deſſus, cette couleur tirant un peu ſur l'olivâtre, roux ſur les côtés, & d'un blanc-rouſſâtre en-deſſous : cette derniere couleur eſt variée de taches longitudinales noires, qui occupent le côté intérieur de chaque plume. Le bas de la partie inférieure du col eſt garni de plumes très-longues & très-étroites, dont l'extrémité eſt d'un blanc ombré d'une légere teinte de rouſſâtre. La partie ſupérieure du dos eſt d'un olivâtre ſombre, mais brillant. Les plumes ſcapulaires ſont de la même couleur; cependant les ſupérieures, qui ſont très-longues & très-étroites, & finiſſent en pointe, ſont terminées de roux; & les inférieures, qui ſont aſſez larges, ſont d'un cendré-foncé. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du deſſus de la queue, ſont de cette derniere couleur. La poitrine eſt d'un marron-pourpré très-brillant. Le ventre eſt de la même couleur; mais il eſt marqué d'une large bande noire, qui s'étend ſur ſon milieu depuis la poitrine juſqu'à l'anus. Les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un blanc mêlé

tudinalibus nigris, unâ ſcilicet in medio poſitâ, ab occipitio ortâ, & ſupra partem colli ſuperiorem productâ, utrinque autem alterâ, ab oris angulis ortâ; & ſecundùm colli latera protenſâ. Collum in reliqua longitudine ſupernè cinereum, cinereo colore paululùm ad olivaceum vergente; ad latera rufum, infernè albo-ruſeſcens : qui noviſſimus color maculis variegatur longitudinalibus nigris, cujuſlibet pennæ latus interius occupantibus. Colli inferioris pars infima pennis obſita eſt longiſſimis & ſtrictiſſimis, in extremitate albis & aliquâ rufeſcentis mixturâ adumbratis. Dorſi ſuprema pars eſt obſcurè quidem, attamen ſplendidè olivacea. Scapulares pennæ concolores; ſuperiores tamen, quæ longiſſimæ ſunt, ſtrictiſſimæ & in acumen deſinentes, rufo terminantur; inferiores verò, quæ latiuſculæ, ſunt ſaturatè cinereæ. Dorſum infimum, uropygium, ſuperioreſque caudæ tectrices ſimiliter tingit color ſaturatè cinereus. Pectus ſplendidiſſimo imbuitur caſtaneo-purpuraſcente. Venter eodem tingitur colore; latâ autem

insignitur fasciâ nigrâ, in ipsius medio à pectore ad anum usque protensâ. Pennæ caudam subtus obtegentes albent, & aliquid rufi admixtum habent, nigroque terminantur. Crurum suprema pars est rufa. Latera ex cinereo ad violaceum inclinant, sed minùs ita quàm in dorso, splendidè. Inferiores alarum tectrices minores ex rufo ad castaneum vergunt : majores saturatè cinerascunt. Margines alarum sunt dilutè rufæ. Superiores alarum tectrices minores sunt obscurè quidem, sed splendidè olivaceæ; qui color supra quarumdam pennarum margines & quarumdam aliarum extremitatem paululùm rufi admixtum habet : majores corpori finitimæ cinereæ, in interiore cujuslibet pennæ latere nonnihil ad cœrulescentem inclinantes colorem : majores à corpore remotiores cinereo-nigricantes. Remiges majores ex cinereo similiter nigricant : minores sunt in latere exteriore ex cinereo ad olivaceum vergentes, in interiore saturatè cinereæ; ex istis tamen excipiendæ sunt quatuor corpori viciniores in utroque latere ex cinereo ad olivaceum inclinantes. Quæ

d'un peu de roux, & terminées de noir. Le haut des jambes est roux. Les côtés sont d'un cendré tirant sur l'olivâtre, mais moins brillant que celui du dos. Les petites couvertures du dessous des aîles sont d'un roux tirant sur le marron : les grandes sont d'un cendré foncé. Le bord de l'aîle est d'un roux très-clair. Les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un olivâtre sombre, mais brillant; cette couleur est mêlée d'un peu de roux sur les bords de quelques plumes & sur le bout de quelques autres : les grandes les plus proches du corps sont d'un cendré qui tire un peu sur le bleuâtre sur le côté intérieur de chaque plume : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré-noirâtre. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur : les moyennes sont du côté extérieur d'un cendré tirant sur l'olivâtre, & du côté intérieur d'un cendré foncé; il faut cependant en excepter les quatre plus proches du corps, dont le cendré tire sur l'olivâtre des deux côtés. Ces quatre dernieres plumes sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La

queue est composée de douze plumes d'un cendré foncé, tirant sur l'olivâtre en-dessus & sur le bleuâtre en-dessous. Le demi-bec supérieur est d'un brun clair, excepté son bout, qui est noirâtre ; l'inférieur est jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verdâtres; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords des rivieres & des étangs, où il se nourrit de *Poissons*. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

quatuor novissimè dictæ remiges maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim constatur rectricibus saturatè cinereis, supernè ad olivaceum, infernè ad cœrulescentem colorem vergentibus. Mandibula superior dilutè fusca, attamen in extremitate nigricans; inferior flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedesque virescentes; ungues verò nigricantes. Juxta fluminum & stagnorum ripas versatur, ibique *Piscibus* victitat. *Ex museo D. de Bandeville.*

** 15. LE HÉRON BLANC.

Ardea in toto corpore alba; spatio rostrum inter & oculos nudo viridi; rostro croceo-flavicante; pedibus nigris.... ARDEA CANDIDA.

Ardea alba tota; capite lævi. *Faun. Suec. Linn. N°.* 132.

Ardea capite lævi, corpore albo, rostro rubro. Ardea alba. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen* 76. *sp.* 17.

Ardea alba. *Gesn. Avi. pag.* 213, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 389. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 390.
Jonst. Avi. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 51.
Linn. Syst. Nat. ed. 6. Gen. 55. *sp.* 2.

Ardea alba; Albardeola. *Gesn. icon. Avi. pag.* 118, *in qua hujus icon non satis accurata.*

Ardea alba major. *Willugh. Ornith. pag.* 205. *hujus icon satis accurata Tab. XLIX.*
Raj. Syn. Avi. pag. 99. *N°. A.* 4.

Marsil. Danub. Tom. V. pag. 12. *hujus icon satis accurata Tab.* 4.
Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 478.
Ardea alba major Willughbeji. *Klein. Avi. pag.* 122. *N°.* 2.
Ardea alba major cristâ carens. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 364.
Ardea alba maxima. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 314. *N°. II. hujus icon non satis accurata Tab.* 266.
Ardea alba cirrata Jonstoni. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 6.
Ardea alba alba. *Charlet. Exer. pag.* 109. *N°.* 2.
Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°.* 2.
Ardea candida. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 224.
Aztatl, seu Ardea candens. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag.* 14. *cap. V.*
Guira-tinga. *Joan. de Laët. Nov. orb. pag.* 575.
Guira-tinga Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 210.
Jonst. Avi. pag. 144.
Raj. Syn. Avi. pag. 101. *N°.* 17.
Guira-tinga Brasiliensibus Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 189. *N°.* 1.
Guira-tinga Brasiliensibus, Garza Lusitanis, Ardeæ species Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 210.
Quiratinga. *Jonst. Avi. pag.* 150.
Héron blanc. *Bel. Hist. Nat. des Ois. pag.* 191.
Les Grecs l'appellent Ἐρωδιὸς λευκος, *ou* Λευκερώδιος. *Gesn. Schwenck. Klein.*
Les Catalans, AGRO BLANC. *Barr.*
Les Italiens, AIRON BIANCO. *Gesn.* GIRONE; GARZA BIANCHA. *Gesn. Aldrov.* GARZETTA BIANCA. *Charlet.*
Les Vénitiens, AIRON BIANCO. *Marsil.* GARZA. *Willugh. Marsil.*
Les Allemands, WYSSER REIGER. *Gesn. Aldrov.* WEISSER REGER; WEISSER REIGEL. *Schwenck.*
Les Saxons, REIGER. *Gesn. Aldrov.*
Les Anglois, WHITE HERON. *Gesn. Aldrov.* GREAT WHITE HERON. *Willugh. Raj.*
Les Anglois de la Jamaïque, WHITE GAULDING. *Browne.* LARGEST WHITE GAULDING. *Sloane. Raj.*
Les Portugais du Brésil, GARZA. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*
Les Brasiliens, GUIRA-TINGA. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*
Les Mexiquains, AZTATL. *Fern.*

Cum *Ardea cristata* circiter crassitie convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem tres pedes unum pollicem & septem lineas explet, & ad

Il est à peu près de la grosseur du *Héron hupé*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds un pouce sept lignes, & jusqu'à celui des on-

gles de quatre pieds deux pouces deux lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a six pouces trois lignes de long; sa queue six pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre pouces cinq lignes; son pied dix pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces trois lignes, l'extérieur trois pouces huit lignes, l'intérieur trois pouces trois lignes; & celui de derriere deux pouces six lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a quatre pieds dix pouces sept lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes d'un blanc de neige. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau verte. Les plumes de l'aîle sont blanches. Les plus proches du corps sont très-longues, & s'é-

extremos ungues quatuor pedes duos pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex pollices & tres lineas longum est; cauda sex pollices; pars crurum plumis denudata quatuor pollices & quinque lineas; pes decem pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & tres lineas, extimus tres pollices cum octo lineis, intimus tres pollices & totidem lineas; posticus autem duos pollices & sex lineas. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuor pedum decem pollicum & septem linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, guttur, collum, universumque corpus vestiunt pennæ niveo candore nitentes. Scapulares, quæ alas superne & infernè cooperiunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute viridi tectum.

Remiges alarum albent. Corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus candidis cauda constat. Rostrum croceo-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Juxta maris littora degit. *Ex museo Realmuriano.*

tendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec est d'un jaune de safran. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 16. L'Aigrette.

Ardea cristata, in toto corpore alba; spatio rostrum inter & oculos nudo, viridi; rostro nigro; pedibus nigro-virescentibus . . . . Egretta.

Ardea alba minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 389. *hujus icon pessima pag.* 391.
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 393. *hujus icon satis accurata, si cristam haberet, pag.* 394.
Willugh. Ornith. pag. 205.
Marsil. Danub. Tom. V. pag. 14. *hujus icon accurata. Tab.* 5.
Ardea alba minor, seu Garzetta Gesneri & Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 99. *N°.* 5.
Ardea alba minor secunda, Garzetta etiam dicta Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 206.
Ardea alba minor cristata. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 364.
Ardea alba maxima. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 124.
Ardea Americana, alba maxima Sloan. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen.* 1. *sp.* 16.
Leucorodios, seu Ardea alba minor alia. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 392. *hujus icon non satis accurata pag.* 395.
Garzetta. *Gesn. Avi. pag.* 214.
Garzetta Italorum. *Jonst. Avi. pag.* 104.
Charlet. Exer. pag. 110. *N°.* 3.
Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°.* 3.
Garzetta bianca. *Jonst. Avi. pag.* 104.
Egretta Gallorum. *Jonst. Avi. pag.* 104.
Charlet. Exer. pag. 110. *N°.* 4.
Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°.* 4.

Aigrette. *Gesn. Avi. pag.* 795.

Aigrette Gallorum. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 392, *in qua hujus icon à Bellonio mutuata.*

Aigrette. *Bel. Hist. nat. des Oiſ. pag.* 195 ; *avec une mauvaiſe figure pag.* 196. *Bel. Portr. d'Oiſ. pag.* 43 *b, dans laquelle eſt la même figure. Du Tertre. Hiſt. des Antil. Tom. II. pag.* 277.

Les Italiens l'appellent AGROTI. *Bel. Aldrov.* GARZETTA. *Geſn. Aldrov. Jonſt.*

Les Boulonnois, GARZETTA ; GAZZA BIANCA. *Aldrov.*

Les Anglois, EGRET, *ou* RED LEGG'D HERON ; CRYALL. *Charlet.*

Elle eſt à peu près de la groſſeur d'une *Poule.* Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'un pied onze pouces, & juſqu'à celui des ongles de deux pieds ſix pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a quatre pouces trois lignes de long ; ſa queue quatre pouces ſix lignes ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quatre pouces ; ſon pied cinq pouces ſix lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces ſix lignes, l'extérieur deux pouces deux lignes, l'intérieur un pouce onze lignes ; & celui de derriere dix-huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Elle a deux pieds dix pouces ſix lignes de vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſ-

Craſſitie *Gallinam* circiter æmulatur. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam unum pedem & undecim pollices explet, & ad extremos ungues duos pedes ſex pollices & totidem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quatuor pollices & tres lineas longum eſt ; cauda quatuor pollices & ſex lineas ; pars crurum plumis denudata quatuor pollices ; pes quinque pollices & ſex lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices cum ſex lineis, extimus duos pollices & totidem lineas, intimus unum pollicem & undecim lineas ; poſticus autem octodecim lineas. Trium digitorum anticorum medius digito extimo membranâ, ad primum articulum uſque productâ, coadunatur. Alis expanſis, extremitates majorum remigum duorum pedum decem pollicum

pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, guttur, collum, universumque corpus pennis vestiuntur candidissimis. Scapulares, alas superne & inferne coopeprientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores tingit idem color. Ab occipitio quædam oriuntur pennæ quinque circiter pollicum longitudinem obtinentes, strictissimæ & valdè flexibiles, elegantem cristam efficientes; unde *Egrettæ* nomen. Scapulares superiores sunt quoque longissimæ, strictissimæ & flexibiles. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute viridi obducitur. Remiges alarum albicant. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Oculorum irides pallidè flavæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque nigro-virescentes; ungues verò nigri. Juxta maris littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

qu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes d'un beau blanc. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. De l'occiput partent quelques plumes longues d'environ cinq pouces, très-étroites & fléxibles, qui forment une jolie aigrette; d'où l'Oiseau a tiré son nom. Les supérieures des scapulaires sont pareillement très-longues, étroites & flexibles. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau verte. Les plumes de l'aîle sont blanches. Les plus proches du corps sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches. L'iris des yeux est d'un jaune pâle. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un noir-verdâtre; & les ongles noirs. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

17. Le Héron blanc du Brésil.

Ardea in toto corpore alba ; ſpatio roſtrum inter & oculos nudo , roſtroque croceis ; pedibus nigris . . . . Ardea Brasiliensis candida.

Alia Ardeæ ſpecies. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 220. *Jonſt. Avi. pag.* 150.
Ardea nivea *Muſ. Worm. pag.* 307.

Il eſt à peu près de la groſſeur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ deux pieds onze pouces, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds huit pouces. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a cinq pouces de long ; ſa queue eſt de la même longueur ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, eſt longue d'environ quatre pouces ; ſon pied de ſix pouces ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de quatre pouces : les latéraux ſont un peu plus courts ; & celui de derriere eſt le plus court de tous. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Tout ſon corps eſt cou-

Præcedentem craſſitie circiter æquat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem duos pedes & undecim circiter pollices explet, & ad extremos ungues tres pedes & octo pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quinque pollices longum eſt ; cauda eâdem longitudine pollet ; pars crurum plumis denudata quatuor circiter pollices longa ; pes ſex pollices ; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices : laterales paulò ſunt breviores ; poſticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque protensâ. Alæ complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. In univerſo corpore pennis veſtitur albis. Spatium roſtrum inter &

oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute croceo colore imbutâ tectum. Remiges alarum candidæ. Corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus albis cauda conflatur. Oculorum pupilla nigra : ipsorum irides aureo colore imbutæ. Rostrum croceo colore tinctum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Brasilia*.

vert de plumes blanches. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau de couleur de safran. Les plumes de l'aîle sont blanches. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches. La prunelle des yeux est noire : leur iris est de couleur d'or. Le bec est de couleur de safran. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Brésil*.

18. Le Héron blanc de la Caroline.

Ardea in toto corpore alba; spatio rostrum inter & oculos nudo, rostroque rubris; pedibus viridibus . . . . Ardea Carolinensis candida.

Ardea alba minor Caroliniensis. *Klein. Avi. pag.* 124. *N°.* 10.
Petit Héron blanc. *Catesb. Tom. I. pag.* 77; *avec une figure exacte Pl.* 77.
Les Anglois l'appellent Little White Heron. *Catesb.*

Cornici crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octodecim circiter pollices æquat, & ad extremos ungues unum pedem novem pollices & sex lineas. Ros-

Il n'est pas si gros qu'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ dix-huit pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied neuf pouces six lignes. Son bec depuis sa

pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces dix lignes de long; sa queue environ trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces trois lignes; son pied deux pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes, l'intérieur seize lignes; & celui de derriere treize lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Tout son corps est couvert de plumes blanches. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau rouge. Les plumes de l'aîle sont blanches. Les plus proches du corps sont fort longües, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches. L'iris des yeux est jaune. Le bec est rouge. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verds. On le trouve en été à *la Caroline*. Il

trum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & decem lineas longum est; cauda tres circiter pollices; pars crurum plumis denudata duos pollices & tres lineas; pes duos pollices cum sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas, extimus unum pollicem cum quinque lineis, intimus sexdecim lineas; posticus autem tredecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Universum corpus pennis vestitur candidis. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & tantummodo cute rubrâ obtegitur. Remiges alarum albicant. Corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Oculorum irides luteæ. Rostrum rubrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque virides. Æstate habi-

tat in *Carolina*. Juxta fluviorum & stagnorum ripas versatur, paludesque frequentat. *Piscibus*, *Ranis*, &c. victitat.

se tient sur les bords des rivieres & des étangs, & dans les marais. Il se nourrit de *Poissons*, de *Grenouilles*, &c.

19. Le Héron blanc du Mexique.

Ardea in toto corpore alba; spatio rostrum inter & oculos nudo luteo; rostro purpureo; pedibus pallidè purpurascentibus . . . . Ardea Mexicana candida.

Ardea Mexicana minima candidissima, Hoitzilaztatl dicta Hernandezii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 102. *N°.* 22.
Hoitzilaztatl. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag.* 27. *cap. LXII.*
Les Mexiquains l'appellent Hoitzilaztatl. *Fern.*

Ad *Columbæ* crassitiem accedit, aut saltem eam non superat. In toto corpore pennis vestitur albis. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute luteâ solummodo coopertum. Remiges alarum candidæ. Corpori finitimæ sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus albis cauda conflatur. Rostrum purpureum. Pars crurum plumis denudata, pedesque eodem imbuti colore, sed pallidiore; ungues verò fusci. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranâ ad pri-

Il est tout au plus de la grosseur d'un *Pigeon*. Tout son corps est couvert de plumes blanches. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. Les plumes de l'aîle sont blanches. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec est pourpre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont de la même couleur, mais plus pâle; les ongles sont bruns. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une

membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve au *Mexique*, où il se tient sur les bords des lacs, & s'y nourrit de *Poissons*.

mum articulum usque protensâ. Habitat in *Mexico*, ibique lacuum ripas frequentat, & *Piscibus* victitat.

20. Le petit Héron blanc.

Ardea alba; vertice & pectore croceis; spatio rostrum inter & oculos nudo, rostroque luteis; pedibus flavo-croceis....
Ardea candida minor.

Ardea vertice croceo. *Jonst. Avi. pag.* 104.
Ardea minor alia vertice croceo. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 393. *hujus icon satis accurata pag.* 396.
Ardea alba minor tertia Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 206.
Raj. Syn. Avi. pag. 99. *N°.* 6.

Il est moins grand que l'*Aigrette*; mais il est plus gros. Le sommet de la tête est de couleur de safran. Le reste de la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont couverts de plumes blanches. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. La poitrine est de couleur de safran, mais plus pâle que le sommet de la tête. Les plumes de l'aile sont blanches. Les plus proches du

Egrettæ magnitudine cedit; illam tamen crassitie superat. Vertex capitis croceo imbuitur colore. Reliquum caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, ventrem, crurum partem supremam & latera vestiunt pennæ albæ. Scapulares, quæ alas superne & infernè cooperiunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute luteâ solummodo coopertum. Pectus croceo tingitur colore, sed quàm in capitis vertice pallidiore. Remiges alarum albicant. Corpori viciniores maximam ob-

tinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus candidis cauda consftat. Oculorum irides luteæ. Rostrum, quod quidem breviusculum, similiter luteum. Pars crurum plumis denudata, pedesque flavo-crocei : digiti tamen, qui longissimi, fusci sunt, & annulis candicantibus circumdati; ungues verò fusci. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes blanches. L'iris des yeux est jaune. Le bec, qui est assez court, est de la même couleur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune de safran : cependant les doigts, qui sont fort longs, sont bruns, & entourés d'anneaux blanchâtres ; les ongles sont bruns. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

21. LE HÉRON NOIR.

Ardea nigricans ; tectricibus alarum superioribus cinereo-cœrulescentibus ; rectricibus nigricantibus ; rostro, pedibusque nigris . . . . ARDEA NIGRA.

Ardea nigra. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 224.
Klein. Avi. pag. 123. *N°.* 3.
Les Allemands l'appellent SCHWARTZER REGER. *Schwenck.*

Magnitudine & crassitie *Ardeam vulgarem* æmulatur. Per universum corpus pennis vestitur nigricantibus. Scapulares, alas subtus obtegentes, tectricesque caudæ superiores & inferiores sunt

Il est de la grandeur & de la grosseur du *Héron ordinaire*. Tout son corps est couvert de plumes noirâtres. Les scapulaires, les couvertures du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont

de la même couleur. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau noire. Les couvertures du dessus des aîles sont d'un cendré-bleuâtre. Les plumes de l'aîle sont noirâtres. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noirâtres. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Silésie*.

quoque nigricantes. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute nigrâ obducitur. Superiores alarum tectrices ex cinereo cœrulescunt. Remiges nigricant. Corpori viciniores longissimæ sunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus nigricantibus cauda conflatur. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Trium digitorum anticorum medius extimo digito membranâ, ad primum articulum usque productâ, coadunatur. Habitat in *Silesia*.

22. LE HÉRON NOIR A COLLIER.

Ardea nigricans; collo torque albo cincto; rectricibus nigricantibus; rostro luteo, in medio & apice maculâ nigrâ superne & infernè notato; pedibus nigris . . . . ARDEA NIGRA TORQUATA.

Ardeæ congener. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 412, *in qua hujus icon satis accurata.*

Ardeæ congener Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 207. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. L.*

Ardeæ congener Aldrovandi, seu nigra. *Raj. Syn. Avi. pag.* 102. *N°.* 19.

Ardea nigra. *Jonst. Avi. pag.* 105. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 51.

Ardea nigra Aldrovandi. *Charlet. Exer. pag.* 110. *N°.* 8.

Charlet. Onomazt. pag. 104. *N°.* 8.

Ardea nigra Jonstoni. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. Sp.* 4.

Cum *Numenio* crassitie circiter convenit. Rostro donatur, proportione servatâ, quàm aliarum *Ardearum* rostrum multò breviore. In toto corpore pennis vestitur nigricantibus. Collum tamen cingit torquis albus. Remiges alarum nigricant. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes. Rostrum luteum, binis superne & infernè notatum maculis nigris, unâ scilicet mediam versùs longitudinem positâ, alterâ in extremitate collocatâ. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Habitat in *Italia* circa *Bononiam.*

Il est à peu près de la grosseur du *Courly*. Son bec est proportionnellement beaucoup plus court que celui des autres *Hérons*. Tout son corps est couvert de plumes noirâtres. Le col est cependant entouré d'un collier blanc. Les plumes de l'aîle sont noirâtres. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noirâtres. Le bec est jaune, & marqué dessus & dessous de deux taches noires, l'une placée vers le milieu de sa longueur, & l'autre à son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne.*

** 23. LE HÉRON DU BRÉSIL.

Ardea nigricans, flavescente punctulata; capite & collo superiore fuscis, nigro punctulatis; collo inferiore albo, maculis longitudinalibus nigris & fuscis vario; rectricibus nigricantibus; rostro nigro; pedibus fuscis . . . . ARDEA BRASILIENSIS.

Ardea subfusca major, collo & pectore albo undatis. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag.* 478.

Ardea sylvatica, coloris ferruginei. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 125.

Ardea Americana, sylvatica, coloris ferruginei. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 14.

Soco Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 199, *in qua hujus icon non satis accurata.*

Jonst. Avi. pag. 136. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 58.

Soco Brasiliensibus Marcgravio. *Willugh. Ornith. pag.* 209. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LI.*

Raj. Syn. Avi. pag. 100. *N°.* 14.

Cocoi tertius. *Pison. Hist. Nat. pag.* 90, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*

Les François de la Guiane l'appellent Onouré des bois. *Barr.*

Les Anglois de la Jamaïque, Clucking-Hen. *Browne.*

Les Brasiliens, Soco. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Il est à peu près de la grosseur du *Héron pourpré hupé*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds un pouce six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a six pouces de long; sa queue cinq pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces trois lignes; son pied quatre pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces neuf lignes, l'extérieur trois pouces, l'intérieur deux pouces neuf lignes; & celui de derriere deux pouces trois lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une mem-

Ardeam cristatam purpurascentem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & octo pollices explet, & ad extremos ungues tres pedes & sesquipollicem. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex pollices longum est; cauda quinque pollices; pars crurum plumis denudata duos pollices & tres lineas; pes quatuor pollices cum sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & novem lineas, extimus tres pollices, intimus duos pollices cum novem lineis; posticus autem duos pollices & tres lineas. Trium digitorum anticorum medius ad exti-

mum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuor pedum intervallo distant; alæ verò complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. Caput, collumque superiùs & ad latera fusco tinguntur colore, quem punctula nigra variegant. Guttur & collum inferius alba sunt, maculis longitudinalibus, aliis nigris, alteris fuscis, variegata. Dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ scapulares, tectricesque caudæ superiores & inferiores nigricant, & flavescente in tota superficie punctulantur. Pennæ alas subtus obtegentes sunt quoque nigricantes, maculis candidis variæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, dorso concolores : majores à corpore remotiores nigricantes & immaculatæ. Remiges similiter nigricant. Corpori viciniores maximam longitudinem obtinent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus nigricantibus cauda con-

brane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a quatre pieds de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure & les côtés du col sont d'un brun varié de petits points noirs. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc varié de taches longitudinales, les unes noires, & les autres brunes. Le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les plumes scapulaires, & les couvertures du dessus & du dessoûs de la queue sont d'un noirâtre tout pointillé de jaunâtre. Les couvertures du dessous des aîles sont pareillement noirâtres, & variées de taches blanches. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres & sans taches. Les plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noirâtres. Les yeux sont noirs : leur iris est de couleur d'or. Le bec est

noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve au *Brésil* & dans *la Guiane*. Il a été envoyé de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

flatur. Oculi sunt nigri: ipsorum irides aureo colore imbutæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusci. Habitat in *Brasilia* & *Guiana*. A *Cayana*, in *museum Realmurianum* missa à *D. Artur*.

** 24. LE BUTOR.

Voyez Pl. XXXVII. Fig. 1.

Ardea superne rufescente & nigro varia, infernè dilutè fulva, maculis longitudinalibus nigricantibus variegata; vertice nigricante; collo superne nigricante, infernè fusco transversim striato; pennis in colli inferioris ima parte longissimis; uropygio fulvo, nigricante transversim striato; rectricibus binis intermediis nigricantibus, rufescente marginatis, lateralibus fulvis, maculis nigricantibus variegatis; rostro fusco, infernè viridescente; pedibus viridi-flavicantibus . . . . BOTAURUS.

Ardea vertice nigro; pectore pallido maculis longitudinalibus nigricantibus. *Faun. Succ. Linn. N°.* 134.

Ardea capite læviusculo, supra testacea maculis transversis, subtus pallidior maculis oblongis fuscis. Ardea stellaris. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 16.

Ardea pallida, pennis in dorso fulvis. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 2.

Ardea Stellaris minor. *Jonst. Avi. pag.* 104. *hujus duæ icones Tab.* 50, *una sub titulo*, Ardea minor, *non satis accurata*, *altera sub titulo*, Ardea, *ab Aldrovando mutuata.*

Ardea Stellaris minor, quam Botaurum, vel Butorium Recentiores vocant. *Gesn. Avi. pag.* 214. *hujus icon non satis accurata pag.* 215.

Ardea Stellaris Plinio & Aristoteli. *Gesn. icon. Avi. pag.* 120, *in qua hujus icon non satis accurata.*

Ardea Stellaris. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 225.

Willugh. Ornith. pag. 207. *hujus icon non satis accurata Tab. L; & insuper altera icon à Jonstono mutuata Tab. LII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 100. *N°. A.* 11.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 18.
Mus. Worm. pag. 307.
Linn. Systh. Nat. ed. 6. *Gen.* 55. *sp.* 4.
Klein. Avi. pag. 123. *N°.* 4.

Ardea Stellaris Willughbeji. *Marsil. Danub. Tom. V. pag. 16. hujus icon pessima Tab.* 6.

Ardea Stellaris, Asterias. *Charlet. Exer. pag.* 110. *N°.* 5.
Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°.* 5.

Ardea Asterias, sive Stellaris. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 403. *hujus icon non satis accurata pag.* 405.

Botaurus Ornithologis; aliis Butio; Ardea Stellaris Gesnero; Ardea palustris vel Arundinum. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 273.

Botaurus Ornithologorum; Ardea Stellaris Gesneri; Ardea palustris vel Arundinum; Butio. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 368.

Taurus Plinii. *Willugh.*

Grus crispa. *Jonst. Avi. hujus icon satis accurata Tab.* 54.

Mos Kuw. *Jonst. Avi. hujus icon non satis accurata Tab. XXVII.*

Ἀστέριας ἐρώδιος, Arist. *Klein.*

Ὀκνὸς Aristotelis. *Jonst. Raj.*

Butor. *Alb. Tom. I. pag.* 60; *avec une figure mal coloriée Pl.* 68.
Bel. Hist. nat. des Oiss. pag. 192, *dans laquelle il y a une très-mauvaise figure.*

Butor, nommé par aucuns de nom corrompu Pittouër. *Bel. Portr. d'Oiss. pag.* 42 *b, dans laquelle est la même figure.*

Les Bretons l'appellent GALERAND. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Grecs, Ἀστερίας. *Gesn. Aldrov.* Ἐρωδιὸς ἀστερίας. *Bel. Schwenck.* Ὀκνός *Bel. Schwenck. Aldrov.*

Les Turcs, GELVÆ. *Gesn.* GELVE. *Aldrov.*

Les Portugais, GAZOLA. *Gesn.*

Les Italiens, TRUMBOTTO. *Bel.* TROMBONE. *Gesn. Aldrov.* AIGERON. *Bel. Gesn.*

Les Boulonnois, TERRABUSO *ou* TERRABUSA. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Ferrarois, TERRABUSO *ou* TERRABUSA. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, US-RIND; MEER-RIND; LOS-RIND; PICKART; ROS-TRUMM; ROS-DUMP; ROS-DUMPF; MOS; MOSS-OCHS; MOSS-KOU; MOSS-REIGEL; ROS-REIGEL. *Gesn. Aldrov.* MOSS-OCHSE; MOOS-KUH; MOS-REIGEL. *Schwenck.* MOSZ-REIGEL. *Rzac.* ROHR-REIGEL; ROHR-TRUMEN. *Schwenck. Rzac.*

Les Bas Allemands, DOMP-HORN *ou* DOMPS-HORN. *Gesn. Aldrov.*

Les Silésiens, ROR-DUMMEL. *Gesn. Aldrov.* ROHR-DRUMMEL. *Schwenck. Rzac.*

Les Saxons, WASSER-OCHSZ. *Gesn. Aldrov.*

Les Autrichiens, ERDBOULL. *Gesn. Aldrov.*

Les Bavarois, HORTYBEL. *Gesn. Aldrov.*
Les Hollandois, ROER-DRUM. *Worm.* PITTOOR. *Aldrov.*
Les Frisons, REI-DOMMEL; ROS-DAM. *Gesn. Aldrov.*
Les Polonois, BAK. *Rzac.* BUNCK. *Gesn. Aldrov.*
Les Illyriens, BUKACZ; FAUSER. *Gesn.* BUBACZ; FUSER. *Aldrov.*
Les Suédois, ROER-DRUM. *Linn.*
Les Anglois, BITTERN. *Willugh. Raj. Sibbald. Alb.* BITTORN. *Charlet.* BITTOUR. *Raj.*
Les Anglois Septentrionaux, MIRE-DRUM. *Willugh. Raj.*
Les Ecossois, BUTTOUR. *Sibbald.*

Il n'eſt pas ſi gros que le *Héron ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de deux pieds cinq pouces, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces neuf lignes de long; ſa queue quatre pouces ſix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quinze lignes; ſon pied quatre pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces ſix lignes, l'extérieur quatre pouces trois lignes, l'intérieur trois pouces neuf lignes; & celui de derriere deux pouces dix lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. L'ongle du doigt de derriere eſt le plus grand & le plus fort de

Ardeæ vulgari craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem duos pedes & quinque pollices æquat, & ad extremos ungues tres pedes duos pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tres pollices & novem lineas longum eſt; cauda quatuor pollices & ſex lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes quatuor pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & ſex lineas, extimus quatuor pollices cum tribus lineis, intimus tres pollices & novem lineas; poſticus autem duos pollices & decem lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque protenſâ. Digiti poſtici unguis magnitudine & validitate reliquos

omnes antecellit; octodecim enim linearum longitudine pollet. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum decem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Capitis superior pars nigricat. Caput ad latera rufescit: color autem rufescens tæniâ terminatur longitudinali fuscâ, ab exortu mandibulæ inferioris ortâ, & secundùm maxillæ inferioris longitudinem versùs collum usque productâ. Partem colli superiorem obtegunt pennæ rufescentes, nigricante transversim striatæ. Dorsi suprema pars, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices rufescente & nigro variegantur. Dorsum infimum & uropygium fulva sunt, nigricante transversim striata. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute viridi solummodo tectum. Guttur ex albò rufescit, & tæniâ longitudinali rufâ in medio insignitur. Pars colli inferior est dilutè fulva, quibusdam variegata maculis rufis, & fusco transversim striata. Pennæ quibus obsita est colli inferioris pars infi-

tous; il a jusqu'à dix-huit lignes de longueur. Il a trois pieds dix pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est noirâtre. Les côtés de la tête sont roussâtres: cette couleur est terminée par une bande longitudinale brune, qui part de l'origine du demi-bec inférieur, & s'étend tout le long de la mâchoire inférieure jusque vers le col. La partie supérieure du col est couverte de plumes roussâtres, rayées transversalement de noirâtre. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont variées de roussâtre & de noir. La partie inférieure du dos & le croupion sont d'un fauve rayé transversalement de noirâtre. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau verte. La gorge est d'un blanc-roussâtre, & marquée dans son milieu d'une bande longitudinale rousse. La partie inférieure du col est d'un fauve clair, varié de quelques taches rousses, & rayé transversalement de brun. Les plumes du bas de la partie inférieure du col sont assez larges, & beaucoup plus

longues que les autres. La poitrine & le ventre font d'un fauve clair, varié de taches longitudinales noirâtres. Les côtés font fauves, & rayés tranfverfalement de noirâtre. Le haut des jambes eft d'un fauve très-clair, varié en-dehors feulement de quelques bandes noirâtres, tranfverfales & en zigzags. Les couvertures du deffous de la queue font d'un fauve très-clair & fans taches. Celles du deffous des aîles font rouffâtres, & variées de taches brunes. Les plus petites couvertures du deffus des aîles, fçavoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, font d'un fauve foncé, varié de bandes noires tranfverfales & en zigzags: les moyennes, ainfi que les grandes les plus proches du corps, font rouffâtres, & rayées pareillement de bandes noires tranfverfales & en zigzags : enfin les grandes les plus éloignées du corps font rayées tranfverfalement de larges bandes alternativement noires & d'un fauve foncé. Les grandes plumes de l'aîle font rayées tranfverfalement des mêmes couleurs, & terminées de noir : les moyennes font fauves, & marquées de larges bandes noires tranfverfales & en zigzags, avec

ma, funt latiufculæ, & reliquis multò longiores. Pectus & venter fulvo tinguntur diluto, & maculis longitudinalibus nigricantibus variegantur. Latera fulva, nigricante tranfverfim ftriata. Crurum fuprema pars dilutiffimè fulva, quibufdam tæniis nigricantibus tranfverfis & undatis extrorfùm follummodo variegata. Inferiores caudæ tectrices dilutiffimè fulvæ & immaculatæ. Pennæ alas fubtus obtegentes rufefcentes, maculis fufcis variæ. Tectrices alarum fuperiores minimæ, iftæ fcilicet quæ articulum carpo humano refpondentem obtegunt, faturatè fulvæ, tæniis nigris tranfverfis & undatis variæ : mediæ, ficut & majores corpori finitimæ, rufefcentes, tæniis fimiliter nigris tranfverfis & undatis ftriatæ : majores tandem à corpore remotiores latis tæniis alternatim nigris & faturatè fulvis tranfverfim ftriatæ. Remiges alarum majores iifdem coloribus tranfverfim ftriantur, nigroque terminatur : minores funt fulvæ, latis infignitæ tæniis nigris tranfverfis & undatis, maculis aliis nigris in fulvo colore diffeminatis. Remiges corpori

pori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ nigricant, & in tota circumferentia rufescente marginantur : laterales omnes sunt fulvæ, maximâ macularum nigricantium irregularium copiâ variegatæ. Oculorum irides in aliis avellaneo-flavicantes, in alteris avellaneo-rubescentes. Mandibula superior fusca ; inferior fusco-viridescens. Pars crurum plumis denudata, pedesque viridi-flavicantes ; ungues verò fusci. Paludes frequentat, ibique humi nidificat. Uno incubitu quinque ova ponit ex candicante ad cinereum aut viride vergentia. *Ex museo Realmuriano.*

d'autres taches noires répandues sur le fauve. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont noirâtres, & bordées de roussâtre dans toute leur circonférence : toutes les latérales sont d'un fauve varié d'une grande quantité de taches noirâtres irrégulieres. L'iris des yeux est de couleur de noisette-jaunâtre dans quelques-uns & rougeâtre dans d'autres. Le demi-bec supérieur est brun ; l'inférieur est d'un brun-verdâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un verd-jaunâtre ; & les ongles bruns. Il se tient ordinairement dans les marais, & y fait son nid par terre. Il pond à chaque couvée cinq œufs d'un blanchâtre tirant sur le cendré ou sur le verd. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

25. Le Butor de la Baye de Hudson.

Ardea superne rufescens, nigricante transversim striata, infernè candicans, maculis longitudinalibus rufescentibus, nigro aspersis, varia; vertice nigricante ; collo inferiore albo, maculis longitudinalibus rufescentibus, nigro marginatis, vario ; pennis in colli inferioris ima parte longissimis ; rectricibus

rufescentibus, nigricante transversim striatis; rostro superiùs & apice nigricante, infernè luteo; pedibus flavis . . . .
BOTAURUS FRETI HUDSONIS.

Butor de la Baye de Hudson. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXVI*; *avec une figure exacte Pl.* 136.

Les Anglois l'appellent BITTERN FROM HUDSON'S-BAY. *Edwards.*

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *nôtre*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ deux pieds trois pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds sept pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces six lignes de long; sa queue environ trois pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce; son pied trois pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a aussi trois pouces trois lignes de long, l'extérieur deux pouces cinq lignes, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derriere deux pouces. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est couvert

Botauro nostrati paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & tres circiter pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes septem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & sex lineas longum est; cauda tres pollices & totidem circiter lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes tres pollices cum totidem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem longitudine pollet; extimus duos pollices & quinque lineas longus, intimus duos pollices cum quatuor lineis; posticus autem duos pollices. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum membranâ, ad primum articulum usque protensâ, adnectitur. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Vertex capitis pennis obtegitur ni-

gris, longiusculis, tactu mollissimis. Caput ad latera rufescit. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & cute luteâ obtegitur. Guttur albicat. Collum superius fuscum est. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices sunt rufescentes, nigricante transversim striatæ. Partem colli inferiorem cooperiunt pennæ albæ, maculâ longitudinali rufescente, nigro marginatâ, versùs ipsarum extremitatem variæ. Pectus, venter, crurum suprema pars & tectrices caudæ inferiores candicant, & majusculis variegantur maculis longitudinalibus rufescentibus, minutis aliis maculis nigris aspersis, & nigro quoque fimbriatis. Latera penitùs candicant. Pennæ alas subtus obtegentes sunt albo-flavicantes, nigricante transversim striatæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, pennis scapularibus concolores: majores à corpore remotiores & pennæ alam notham constituentes nigræ, rufescente terminatæ. Remiges quinque sexve primores superne nigræ, in-

de plumes noires, assez longues & douces au toucher. Les côtés de la tête sont roussâtres. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. La gorge est blanche. La partie supérieure du col est brune. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un roussâtre, rayé transversalement de noirâtre. La partie inférieure du col est couverte de plumes blanches, variées vers leur extrémité d'une tache longitudinale roussâtre, bordée de noir. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanchâtre varié d'assez grandes taches longitudinales roussâtres, parsemées d'autres petites taches noires, & bordées de la même couleur. Les côtés sont tout-à-fait blanchâtres. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un blanc-jaunâtre, rayé transversalement de noirâtre. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les plumes scapulaires: les grandes les plus éloignées du corps, ainsi que les plumes de l'aîle bâtarde, sont noires,

& terminées de roussâtre. Les cinq ou six premieres plumes de l'aîle sont noires en-dessus & cendrées en-dessous : les suivantes sont de la même couleur, mais elles sont de plus terminées de roussâtre : les plus proches du corps sont roussâtres, & rayées transversalement de noirâtre. Ces dernieres sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que ces dernieres plumes de l'aîle. Le demi-bec supérieur est noir, excepté ses bords qui sont jaunes jusque vers son extrémité; le demi-bec inférieur est jaune depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur, le reste est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont jaunes; & les ongles gris-bruns. On le trouve à la *Baye de Hudson.*

fernè cinereæ : proximè sequentes eodem imbutæ colore, sed insuper rufescente terminatæ : corpori viciniores rufescentes, nigricante transversim striatæ. Quæ novissimè dictæ sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus proximè dictis concolores. Mandibula superior nigra, attamen ad margines versùs extremitatem usque lutea; inferior ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque lutea, in reliqua longitudine nigra. Pars crurum plumis denudata, pedesque flavi; ungues verò griseo-fusci. Habitat in *Freto Hudsonis.*

26. LE PETIT BUTOR.

Ardea rufescens, fusco striata; gutture & collo inferiore candidis; rectricibus albicantibus; rostro superiùs obscurè fusco, infernè flavo; pedibus fuscis . . . . BOTAURUS MINOR.

Ardea viride-flavescens, Nova species. *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 22. *hujus icon satis accurata Tab.* 9.

Ardea viride-flavescens, Nova species Marsili. *Klein. Avi. pag.* 124. *N°.* 13.

Præcedenti multùm crassitie cedit. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque ad trium pollicum longitudinem accedit, sed eam non penitùs explet. Partes capitis & colli superiores, pectus, venter, latera, uropygium, caudæ tectrices superiores & inferiores, & pennæ alas superne vestientes rufescunt, lineolisque fuscis striantur. Dorsum & scapulares pennæ concolores; attamen lineæ fuscæ majorem obtinent latitudinem, ipsarumque major extat copia. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute flavâ tectum. Guttur & collum inferius sunt candida. Crurum partem supremam vestiunt pennæ ex albido fuscescentes. Remiges alarum fuscescunt, & tæniis transversis fuscis variegantur. Corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda, quæ quidem valdè brevis, duodecim constat rectricibus albicantibus. Oculi sunt nigri: ipsorum irides albidæ. Mandibula superior obscurè fusca; inferior

Il est beaucoup plus petit que le précédent. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche n'a pas tout-à-fait trois pouces de long. Les parties supérieures de la tête & du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le croupion, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessus des aîles sont d'un roussâtre rayé de petites lignes brunes. Le dos & les plumes scapulaires sont de la même couleur; mais les lignes brunes sont plus larges & en plus grand nombre. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. La gorge & la partie inférieure du col sont blanches. Le haut des jambes est couvert de plumes d'un blanchâtre rembruni. Les plumes de l'aîle sont roussâtres, & variées de bandes transversales brunes. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue, qui est très-courte, est composée de douze plumes blanchâtres. Les yeux sont noirs: & leur iris est blanchâtre. Le demi-bec supérieur est d'un brun obscur; l'inférieur est jaune. La partie des

jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns : les doigts tirent cependant un peu sur le jaunâtre. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve sur les bords du *Danube*.

flava. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusci : digiti tamen nonnihil ad flavescentem inclinant colorem. Trium digitorum anticorum medius extimo digito membranâ, ad primum articulum usque protensâ, coadunatur. Juxta *Danubii* ripas versatur.

27. LE BUTOR RAYÉ.

Ardea lineolis fuscis, nigris & rufescentibus striata; collo inferiore & pectore albicantibus; rectricibus fusco, nigro & rufescente striatis; rostro superiùs fusco, infernè flavo; pedibus griseis, lineolis atris notatis . . . . . BOTAURUS STRIATUS.

Ardea fusca, Nova species. *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 24. *hujus icon satis accurata Tab.* 10.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, celles du dessus & du dessous de la queue, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont rayés de petites lignes brunes, noires & roussâtres, mêlées confusément ensemble. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. La gorge, la partie inférieure du col &

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes, caudæ tectrices superiores & inferiores, venter, crurum suprema pars & latera lineolis striantur fuscis, nigris & rufescentibus confusè mixtis. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute flavâ obtegitur. Guttur, pars colli inferior & pectus candicant. Re-

migis alarum iisdem variegantur coloribus ac dorsum ipsum tingitur. Corpori finitimæ maximam longitudinem obtinent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices lineolis fuscis, nigris & rufescentibus striatæ. Mandibula superior fusca; inferior flava. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque grisei: attamen digiti nonnihil ad flavescentem colorem inclinant. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. *Danubii* ripas frequentat.

la poitrine sont blanchâtres. Les plumes de l'aîle sont variées des mêmes couleurs que le dos. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes rayées de petites lignes brunes, noires & roussâtres. Le demi-bec supérieur est brun; l'inférieur est jaune. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont gris: les doigts tirent cependant un peu sur le jaunâtre. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve sur les bords du *Danube*.

28. Le grand Butor.

Ardea cristata, superne cinereo-fusca, infernè rufa; vertice & cristâ nigris; collo ad latera rufo, tæniâ longitudinali nigrâ notato, inferiore albo, maculis longitudinalibus nigris & albo-rufescentibus vario; pennis in colli inferioris ima parte longissimis; rectricibus cinereo-fuscis; rostro flavicante; pedibus fuscis . . . . Botaurus major.

Ardea maxima, lutescens, maculis nigris sagittatis densissimè aspersa. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 1.

Ardea cristata, maculosa, fusca. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 3.

Ardea Stellaris major. *Gesn. Avi. pag.* 218. *hujus icon minùs accurata pag.* 219.

Gesn. icon. Avi. pag. 119, *in qua eadem icon.*

Jonst. Avi. pag. 105. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 51.
Ardea Stellaris major Ornithologi. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 408. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 556.
Ardea Stellaris major, sive rubra cirrata. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 410. *hujus icon satis accurata pag.* 409.
Ardea Stellaris major, seu rubra Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 208. *Raj. Syn. Avi. pag.* 100. *N°.* 13.
Ardea cinerea alia. *Jonst. Avi. hujus icon minùs accurata Tab.* 50.
Les Catalans l'appellent Toru de Garriga. *Barr.*
Les Italiens aux environs du Lac Majeur, Russey. *Gesn. Aldrov.*
Les Allemands, Grosser Ror-Reigel. *Gesn.*

Il est beaucoup plus gros que le *Butor ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pieds six pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a pour le moins huit pouces de long; sa queue quatre ou cinq pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, environ deux pouces; son pied six pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq pouces : les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est le plus court de tous. Celui du milieu de trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusque vers le bout

Botaurum vulgarem multùm crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues quatuor pedes & sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octo saltem pollices longum est; cauda quatuor vel quinque pollices; pars crurum plumis denudata duos circiter pollices; pes sex pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque pollices : laterales paulò sunt breviores; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ versùs caudæ extremitatem usque protenduntur.

tenduntur. Vertex capitis eſt niger : ex pennis illum obtegentibus quædam ſunt longiſſimæ, elegantemque criſtam efficiunt. Pars colli ſuperior, dorſum, uropygium, ſuperioreſque caudæ tectrices ſunt cinereo-fuſcæ. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & cute flavâ ſolummodo obducitur. Collum ad latera rufum eſt, latâque tæniâ longitudinali nigrâ notatum. Guttur & collum inferius albicant, & longitudinalibus variegantur maculis, aliis nigris, alteris albo-rufeſcentibus. Pennæ quibus colli inferioris pars infima obſita eſt, maximam obtinent longitudinem, & ſupra pectus propendent. Pectus, ventrem, latera, inferiores caudæ tectrices & pennas alas ſubtus obtegentes tingit color rufus. Pennæ ſcapulares, quæ quidem longiſſimæ, ſtrictiſſimæque, eodem imbuuntur colore. Crurum ſuprema pars ex albo rufeſcit. Superiores alarum tectrices, ſicut & remiges, ſunt cinereo-fuſcæ. Ex remigibus autem corpori viciniores maximam longitudinem obtinent, & dum ala complicatur, ma-

de la queue. Le ſommet de la tête eſt noir : quelques-unes des plumes qui le couvrent, ſont fort longues, & forment une belle hupe. La partie ſupérieure du col, le dos, le croupion & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un cendré-brun. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau jaune. Les côtés du col ſont roux, & marqués d'une large bande longitudinale noire. La gorge & la partie inférieure du col ſont blanches, & variées de taches longitudinales, les unes noires & les autres d'un blanc-rouſſâtre. Les plumes du bas de la partie inférieure du col ſont très-longues, & pendent ſur la poitrine. La poitrine, le ventre, les couvertures du deſſous de la queue, celles du deſſous des aîles & les côtés ſont roux. Les plumes ſcapulaires, qui ſont très-longues & très-étroites, ſont de la même couleur. Le haut des jambes eſt d'un blanc-rouſſâtre. Les couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les plumes de l'aîle, ſont d'un cendré-brun. De ces dernieres, les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin

que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-brun. L'iris des yeux est jaune. Le bec est jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve dans les marais.

jorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereo-fuscis cauda conflatur. Oculorum irides luteæ. Rostrum flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusci. In paludibus habitat.

29. Le Butor roux.

Ardea superne nigricans, infernè rufescens; vertice nigro; collo ferrugineo; uropygio albo; rectricibus nigricantibus; rostro superne nigricante, infernè corneo colore tincto; pedibus fuscis . . . . Botaurus rufus.

Ardeæ Stellaris tertium genus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 410. *hujus icon satis accurata pag.* 411.

Ardeæ Stellaris tertium genus Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 100. *N°.* 12.

Ardea Stellaris, tertium genus. *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 18. *hujus icon non satis accurata Tab.* 7.

Ardea Stellaris, tertium genus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 208.

Ardea Stellaris altera. *Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 51.

Il est un peu plus gros que le *petit Butor*. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a environ quatre pouces de long; son col huit pouces. Sa queue est extrêmement courte. Ses jambes & ses pieds, pris ensemble, ont neuf pouces de longueur. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation,

Crassitie *Botaurum minorem* paululùm antecellit. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuor circiter pollices longum est; collum octo pollices. Cauda valdè brevis est. Crura, pedesque, simul commensurati, novem pollicum longitudinem obtinent. Trium digitorum anticorum medius extimo digito membranâ, ad primum articulum usque productâ,

coadunatur. Capitis vertex nigro imbuitur colore. Reliquum caput, guttur & collum tingit color ferrugineus. Dorsum, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt nigricantes. Uropygium albicat. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes rufescunt. Superiores alarum tectrices albo & ferrugineo variegantur. Remiges majores sunt nigrigantes : minores ferrugineo colore imbutæ. Ex minoribus autem remigibus, corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes. Oculorum irides luteæ. Mandibula superior nigricans; inferior corneo colore imbuta. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusci. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*. Paludes frequentat.

Le sommet de la tête est noir. Le reste de la tête, la gorge, & le col sont d'une couleur ferrugineuse. Le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres. Le croupion est blanc. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont roussâtres. Les couvertures du dessus des aîles sont variées de ferrugineux & de blanc. Les grandes plumes de l'aîle sont noirâtres : les moyennes sont d'une couleur ferrugineuse. De ces dernieres, les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noirâtres. L'iris des yeux est jaune. Le demi-bec supérieur est noirâtre; l'inférieur est de couleur de corne. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*. Il se tient dans les marais.

30. Le Butor du Brésil.

Ardea ſuperne fuſca, rufeſcente ſtriata, infernè alba, fuſco ſtriata, marginibus pennarum rufeſcentibus; capite & collo ſuperiore rufeſcentibus, nigro ſtriatis; rectricibus partim nigris, partim cinereis, albo tranſverſim ſtriatis; roſtro ſuperiùs fuſco, in exortu & infernè flavo-vireſcente; pedibus obſcurè griſeis . . . . Botaurus Brasiliensis.

Alia Ardeæ ſpecies. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 210. *Jonſt. Avi. pag.* 143.
Ardea Braſilienſis, roſtro ſerrato, Stellari ſimilis Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 209.
Ardea Braſilienſis, roſtro ſerrato, cinereæ ſimilis Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 101. *N°. 16.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du *petit Butor*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ deux pieds trois pouces, & juſqu'à celui des ongles de deux pieds neuf pouces. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a quatre pouces ſix lignes de long; ſa queue quatre pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, deux pouces trois lignes; ſon pied quatre pouces ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, environ trois pouces ſix lignes : les latéraux ſont un peu plus courts; & celui de derriere eſt le plus court de tous. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une mem-

Botaurum minorem craſſitie circiter æmulatur. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem duos pedes & tres circiter pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes & novem pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quatuor pollices & ſex lineas longum eſt; cauda quatuor pollices; pars crurum plumis denudata duos pollices & tres lineas; pes quatuor pollices cum ſex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & ſex circiter lineas : laterales paulò ſunt breviores; poſticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito

connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Caput & collum superius rufescunt, nigroque striantur. Dorsum & uropygium vestiunt pennæ fuscæ, rufescente striatæ. Scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ tectrices concolores. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute flavo-virescente tectum. Guttur album est & immaculatum. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars & inferiores caudæ tectrices albent & fusco striantur, marginibus pennarum in tota circumferentia rufescentibus. Remiges alarum sunt nigro & cinereo variæ, & apicibus albis præditæ. Corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices partim nigræ, partim cinereæ, albo transversim striatæ. Oculi sunt nigri: ipsorum irides aureo colore imbutæ. Mandibula superior fusca, attamen in

brane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont d'un roussâtre rayé de noir. Le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes, rayées de roussâtre. Les scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau d'un jaune-verdâtre. La gorge est blanche & sans taches. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc rayé de brun, chaque plume étant bordée de roussâtre dans toute sa circonférence. Les plumes de l'aîle sont variées de noir & de cendré, & terminées de blanc. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes en partie noires & en partie cendrées, & rayées transversalement de blanc. Les yeux sont noirs:

leur iris est de couleur d'or. Le demi-bec supérieur est brun, excepté son origine, *qui est* d'un jaune-verdâtre ; *l'inférieur* est de cette derniere couleur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un gris obscur. On le trouve au *Brésil*.

exortu flavo-virescens ; inferior ex flavo quoque virescit. *Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque obscurè grisei. Habitat in Brasilia.*

** 31. Le Butor tacheté ou le Pouacre.

Ardea fusca, superne saturatiùs, infernè dilutiùs, superne albo punctulata ; rectricibus fuscis ; spatio rostrum inter & oculos nudo virescente ; rostro superne fusco, infernè flavo-virescente ; pedibus fusco-virescentibus . . . . Botaurus nævius.

Il est à peu près de la grosseur d'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix-huit pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied huit pouces sept lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces de long ; sa queue deux pouces neuf lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix lignes ; son pied deux pouces six lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes, l'intérieur seize lignes ; & celui de derriere treize lignes. Celui

Cum *Cornice* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octodecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem octo pollices & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices longum est ; cauda duos pollices & novem lineas ; pars crurum plumis denudata decem lineas ; pes duos pollices cum sex lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas, extimus unum pollicem cum quinque lineis, intimus sexdecim li-

neas; posticus autem tredecim lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum quatuor pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, pars colli superior, sicut & dorsi suprema, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices fusco imbuuntur saturato, minutis asperso maculis albis, in extremitate pennarum positis. Dorsum infimum, uropygium, superioresque caudæ tectrices sunt saturatè fuscæ & immaculatæ. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes fusco quidem tinguntur colore, sed nonnihil dilutiore. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute virescente obtegitur. Remiges alarum sunt saturatè fuscæ, minutâ maculâ candidâ in apice donatæ. Corpori viciniores maximam obtinent

du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds quatre pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, le dessus du col, la partie supérieure du dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles son d'un brun foncé, tout parsemé de petites taches blanches, placées à l'extrémité des plumes. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun foncé & sans taches. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un brun un peu plus clair. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau verdâtre. Les plumes de l'aîle sont d'un brun foncé, & terminées chacune par une petite tache blanche. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle,

La queue est composée de douze plumes brunes. Le demi-bec supérieur est brun ; l'inférieur est d'un jaune-verdâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un brun-verdâtre ; & les ongles bruns. Il se tient dans les marais, & s'y nourrit de *Poissons*, de *Grenouilles*, &c. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus fuscis cauda constat. Mandibula superior fusca; inferior flavo-virescens. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusco-virescentes; ungues verò fusci. Paludes frequentat, ibique *Piscibus*, *Ranis*, &c. victitat. *Ex museo Realmuriano.*

32. Le Butor tacheté d'Amérique.

Ardea fusca, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; alis superne albo punctulatis ; rectricibus cinereo-cœrulescentibus ; spatio rostrum inter & oculos nudo, & rostro inferiore viridibus, rostro superiore nigro-virescente ; pedibus flavo-virescentibus . . . . Botaurus Americanus nævius.

Ardea minor subfusco-grisea, cruribus brevioribus. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag.* 478.

Ardea Stellaris minor. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 315. *N°.* 5. *hujus icon minùs accurata Tab.* 263. *fig.* 2.

Raj. Syn. Avi. pag. 189. *N°.* 4.

Ardea fusca. *Klein. Avi. pag.* 124. *N°.* 8.

Butor brun. *Catesb. Tom. I. pag.* 78 ; *avec une figure exacte Pl.* 78.

Les Anglois l'appellent Brown Bittern. *Catesb.*

Les Anglois de la Jamaïque, Small Bittern. *Sloane. Raj.* Crab-Catcher. *Browne.*

Il n'est pas si gros que le *petit Butor*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds un pouce. Son bec depuis sa

Botauro minori crassitie cedit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem unum pedem & octo circiter pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes cum pollice unico. Rostrum

ab

ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & novem lineas longum est; cauda tres circiter pollices; pars crurum plumis denudata decem lineas; pes quatuor ferè pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices, extimus duos pollices & sex lineas, intimus duos pollices cum tribus lineis; posticus autem octodecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt saturatè fuscæ. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crurum partem supremam, inferioresque caudæ tectrices tingit color fuscus quidem, sed nonnihil dilutior. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute viridi solummodo tectum. Superiores alarum tectrices eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur; majores autem minutâ maculâ candidâ in extremi-

pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces neuf lignes de long; sa queue environ trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix lignes; son pied près de quatre pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces, l'extérieur deux pouces six lignes, l'intérieur deux pouces trois lignes; & celui de derriere un pouce six lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plume scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun foncé. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun un peu plus clair. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau verte. Les couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur que le dos; mais les plus grandes sont terminées par une pe-

tite tache blanche. Les plumes de l'aîle sont aussi d'un brun foncé, & terminées de même par une petite tache blanche. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-bleuâtre. Les yeux sont grands : leur iris est de couleur d'or : & les paupieres sont vertes. Le demi-bec supérieur est d'un noir-verdâtre ; l'inférieur est verd. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune-verdâtre. On le trouve à *la Jamaïque*, à *la Caroline*, & en différens endroits de l'*Amérique Septentrionale*. Il se tient sur les bords des rivieres & des étangs.

tate præditæ sunt. Remiges sunt quoque saturatè fuscæ, & minutá maculá candida similiter terminatæ. Corpori viciniores longissimæ sunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereo-cœrulescentes. Oculi sunt magni : ipsorum irides aureo colore imbutæ : palpebræ verò virides. Mandibula superior nigro-virescens; inferior viridis. Pars crurum plumis denudata, pedesque flavo-virescentes. Habitat in *Jamaica*, *Carolina*, & in variis *Americæ Septentrionalis* regionibus. Juxta fluviorum & stagnorum ripas versatur.

33. Le Crabier.

Ardea cristata, castanea; pennis scapularibus in exortu albis; cristâ in medio albâ, ad latera nigrá, rectricibus castaneis; rostro luteo, apice nigricante; pedibus viridibus . . . . Cancrofagus.

Ardeæ alia species, quæ vulgò Squaiotta dicitur Malalbergi. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 401, *in qua hujus icon non satis accurata.*

Ardea vulgò Squaiotta dicta Malalbergi, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 207. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. L.*

Raj. Syn. Avi. pag. 99. *N°.* 9.

Squaiotta Italorum. *Jonst. Avi. pag.* 104. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 51, *sub titulo*, Ardea Quaiotta.

Charlet. Exer. pag. 110. *N°.* 6.

Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°. 6.*

Les Boulonnois l'appellent SQUAIOTTA. *Aldrov. Willugh. Raj. Charlet.*

Præcedenti craſſitie cedit. Summum caput obtegunt pennæ, quarum quæ medium locum tenent, ſunt candidæ, quæ verò ad latera poſitæ ſunt, nigræ. Ex iſtis autem pennis triginta reliquas longitudine ſuperant, & criſtam efficiunt. Reliquum caput, guttur, collum, univerſumque corpus pennis veſtiuntur eleganter caſtaneis. Scapulares, caudam ſuperne & infernè cooperientes, tectrices alarum ſuperiores & inferiores, ipſarumque remiges tingit idem color : ſcapulares tamen, quæ quidem longiſſimæ & ſtrictiſſimæ, ſunt in exortu candidæ. Remiges corpori viciniores maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda, quæ valdè brevis eſt, duodecim conflatur rectricibus eleganter caſtaneis. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis eſt denudatum, & ſolummodo cute luteâ coopertum. Roſtrum ſimiliter luteum, attamen in extremitate nigricans. Pars crurum plumis

Il eſt plus petit que le précédent. Le ſommet de la tête eſt couvert de plumes, dont celles qui occupent le milieu, ſont blanches, & celles qui ſont ſur les côtés, ſont noires. Trente de ces plumes ſont plus longues que les autres, & forment une hupe. Le reſte de la tête, la gorge, le col & tout le corps ſont couverts de plumes d'un beau marron. Les ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, celles du deſſus & du deſſous des aîles, & les plumes de l'aîle ſont de la même couleur : les ſcapulaires, qui ſont fort longues & fort étroites, ſont cependant blanches à leur origine. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont très-longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue, qui eſt très-courte, eſt compoſée de douze plumes d'un beau marron. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau jaune. Le bec eſt de la même couleur, excepté ſon extrémité, qui eſt noirâtre. La partie

des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verds. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

denudata, pedesque virides. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

34. Le Crabier marron.

Ardea superne castanea, infernè sordidè alba; tæniâ longitudinali candidâ à gutture ad ventrem usque productâ; tectricibus alarum superioribus ad cœruleum vergentibus; remigibus nigris; rectricibus castaneis; rostro fusco; pedibus rubris . . . . CANCROFAGUS CASTANEUS.

Ardea rubra. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 225.
Les Silésiens l'appellent RODTER REGER; SAND-REGER. *Schwenck.*

Il est à peu près de la grosseur d'une *Corneille*. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces de longueur. Sa tête est fort petite; & son col fort allongé. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de couleur de marron. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale; il y a cependant une bande longitudinale d'un beau blanc, qui part de la gorge,

Cum *Cornice* crassitie circiter convenit. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuor pollices longum est. Caput habet valdè exiguum; collum verò maximè elongatum. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices castaneo tinguntur colore. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices sordidè albent; tænia tamen extat longitudinalis candida, à gutture orta, per totam colli longitudinem & pectus me-

dium ducta, & ad ventrem usque protensa. Superiores alarum tectrices nonnihil ad cœruleum vergunt. Remiges sunt nigræ. Corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus castaneis cauda constat. Oculorum irides flavicantes. Rostrum fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedesque rubri. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. In arboribus excelsis nidificat. *Pisciculis* & *Insectorum aquaticorum* omni genere vescitur. Habitat in *Silesia*.

passe dans toute la longueur du col & par le milieu de la poitrine, & s'étend jusqu'au ventre. Les couvertures du dessus des aîles tirent un peu sur le bleuâtre. Les plumes de l'aîle sont noires. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes de couleur de marron. L'iris des yeux est jaunâtre. Le bec est brun. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il fait son nid dans les grands arbres. Il se nourrit de *petits Poissons* & de toutes sortes d'*Insectes aquatiques*. On le trouve en *Silésie*.

35. LE CRABIER ROUX.

Ardea cristata, ex croceo ad castaneum vergens, superne dilutiùs, infernè saturatiùs; capite superiore & cristâ lutescente & nigro variegatis; rectricibus ex croceo ad castaneum vergentibus; rostro viridi-cœruleo, apice nigro; pedibus saturatè rubris . . . . CANCROFAGUS RUFUS.

Ardea Hæmatopos, seu Cirris Virgilii, Scaligeri. *Aldrov. Avi. Tom. III, pag. 397. hujus icon satis accurata pag. 398.*

Ardea Hæmatopus, seu Cirris Virgilii Scaligero, Aldrovandi. Willughb. *Ornith. pag.* 206. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. L.* *Raj. Syn. Avi. pag.* 99. *N°.* 7.

Il eſt tout au plus de la groſſeur du *Butor tacheté*. La partie ſupérieure de la tête eſt couverte de plumes longues & fort étroites, variées de jaunâtre & de noir, qui pendent ſur le col, & forment une eſpece de hupe. Celles qui couvrent la gorge, le col & tout le corps, ſont d'une couleur de ſafran tirant ſur le marron : cette couleur eſt plus claire dans le deſſus du corps, & plus foncée dans le deſſous. Les plumes ſcapulaires, le couvertures du deſſus de la queue, celles du deſſus & du deſſous des aîles, & les plumes de l'aile ſont de la même couleur que le dos. Les couvertures du deſſous de la queue ſont de la même couleur que le ventre. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aile eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue, qui eſt extrêmement courte, eſt compoſée de douze plumes d'une couleur de ſafran tirant ſur le marron. Un cercle d'un rouge vif entoure l'iris des yeux, qui eſt jaune. Le bec eſt d'un verd tirant ſur le bleu depuis ſon origine juſque vers les

Botaurum nævium craſſitie circiter æquat, aut paululùm ei cedit. Partem capitis ſuperiorem veſtiunt pennæ longæ, ſtrictiſſimæ, luteſcente & nigro variegatæ, collo incumbentes, & criſtam quodammodo efficientes. Quæ guttur, collum, univerſumque corpus obtegunt, ex croceo ad caſtaneum vergunt : qui color in corpore ſuperiore dilutior eſt, in inferiore ſaturatior. Pennæ ſcapulares, quæ caudam ſuperne cooperiunt, tectrices alarum ſuperiores & inferiores, ipſarumque remiges eodem imbuuntur colore ac dorſum ipſum tingitur. Pennæ caudam ſubtus obtegentes ventri concolores. Remiges alarum corpori viciniores maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda, quæ valdè brevis eſt, duodecim conſtat rectricibus ex croceo ad caſtaneum vergentibus. Oculorum irides luteæ, circulo coccineo circumdatæ. Roſtrum ab ipſius exortu versùs duas tertias longitu-

dinis partes usque viridi-cœruleum, inde ad extremitatem nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque saturatè rubri; ungues verò nigri. Trium digitorum anticorum medius extimo digito membranâ, ad primum articulum usque protensâ, coadunatur. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

deux tiers de sa longueur; & de là jusqu'à son extrémité il est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un rouge foncé; & les ongles noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

36. Le Crabier roux tacheté.

Ardea cristata, ex croceo ad castaneum dilutum vergens; capite superiore & cristâ lutescente & nigro variegatis; collo ad latera maculis nigris asperso; rectricibus ex croceo ad castaneum dilutum vergentibus; rostro viridi-cœruleo, apice nigro; pedibus flavicantibus . . . . Cancrofagus rufus nævius.

Ardea castanei coloris alia. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 399, *in qua hujus icon satis accurata.*

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Illius instar, superior capitis pars pennis vestitur longis, strictissimis, lutescente & nigro variegatis, collo incumbentibus, & cristam quodammodo efficientibus. Dorsum, uropygium, guttur, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ scapulares, alas superne cooperientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores ex cro-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Comme lui, il a la partie supérieure de la tête couverte de plumes longues & fort étroites, variées de jaunâtre & de noir, qui pendent sur le col, & forment une espece de hupe. Le dos, le croupion, la gorge, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, & celles du dessus & du dessous de la

queue sont d'une couleur de safran tirant sur le marron clair. Le col est de la même couleur, mais il est varié sur ses cotés de taches noires. Les plumes de l'aile sont de la même couleur que le dos. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue, qui est extrêmement courte, est composée de douze plumes d'une couleur de safran tirant sur le marron clair. Un cercle d'un rouge vif entoure l'iris des yeux, qui est jaune. Le bec est d'un verd tirant sur le bleu depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur; le reste est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont jaunâtres; & les ongles noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

ceo ad castaneum dilutum vergunt. Collum eodem colore tingitur, sed maculis nigris ad latera aspergitur. Alarum remiges eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur. Corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda, quæ valdè brevis est, duodecim conflatur rectricibus ex croceo ad castaneum dilutum inclinantibus. Oculorum irides luteas ambit circulus coccineus. Rostrum ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque viridi-cœruleum, in reliqua longitudine nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque flavicantes; ungues verò nigri. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

37. Le Crabier jaune.

Ardea cristata, superne luteo-rufescens, infernè candicans; capite, cristâ & collo lutescente, albo & nigro variegatis; rectricibus candicantibus; rostro luteo-rufescente; pedibus virescentibus . . . . Cancrofagus luteus.

Ardeæ

Ardeæ aliud genus, quam Sguacco vocant. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. ... in qua hujus icon satis accurata.*

Ardea quam Squacco vocant in vallibus dictis Malalbergi, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 206.

Raj. Syn. Avi. pag. 99. *N°.* 8.

Les Boulonnois l'appellent Sguacco. *Aldrov.*

Præcedenti paululùm crassitie cedit; & rostro nonnihil breviori donatur. Caput, guttur, collumque vestiunt pennæ lutescente, albo & nigro variegatæ. Quæ caput superius obtegunt, longæ sunt, strictissimæ, collo incumbentes, & cristam quodammodo efficientes. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices ex luteo rufescunt. Pectus, venter, latera & pennæ caudam subtus cooperientes candicant. Crurum pars suprema flavicat. Superiores alarum tectrices minimæ, ab alæ exortu ad articulum carpo humano respondentem usque, sunt candicantes: reliquæ omnes luteo-rufescentes. Alarum remiges ex luteo quoque rufescunt: Corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda, quæ valdè brevis est, duodecim constat rectricibus candicantibus. Oculo-

Il est un peu plus petit que le précédent; & a le bec un peu plus court. La tête, la gorge & le col sont couverts de plumes variées de jaunâtre, de blanc & de noir. Celles qui couvrent la partie supérieure de la tête, sont longues & fort étroites, pendent sur le col, & forment une espece de hupe. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un jaune-roussâtre. La poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont blanchâtres. Le haut des jambes est jaunâtre. Les petites couvertures du dessus des aîles, depuis l'origine de l'aîle jusqu'au pli qui répond à celui du poignet, sont blanchâtres: toutes les autres sont d'un jaune-roussâtre. Les plumes de l'aîle sont de la même couleur. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue, qui est fort courte, est composée de douze

plumes blanchâtres. Un cercle noir entoure l'iris des yeux, qui est de couleur d'or. Le bec est d'un jaune-roussâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verdâtres. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

rum irides aureo colore imbutas ambit circulus niger. Rostrum luteo - rufescens. Pars crurum plumis denudata, pedesque virescentes. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

** 38. Le Crabier des Philippines.

Voyez Pl. XXXVII. Fig. 2.

Ardea superne castaneo & nigricante transversim & undatim striata, infernè griseo-rufescens; capite castaneo, in parte posteriore nigro variegato; collo superiore dilutè castaneo; collo inferiore & pectore griseis, ad castaneum vergentibus; rectricibus nigricantibus; rostro superiùs nigricante, infernè albo-flavicante; pedibus griseo-fuscis . . . . . Cancrofagus Philippensis.

Il n'est pas plus gros qu'un *petit Poulet.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a vingt - cinq lignes de long; sa queue un pouce neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lig-

Pullum Gallinaceum minorem crassitie non superat. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem decem pollices explet, & ad extremos ungues undecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos viginti quinque lineas longum est; cauda unum pollicem & novem lineas; pars crurum

plumis denudata tres lineas; pes unum pollicem & quinque lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quatuor lineas, extimus tredecim lineas; intimus duodecim cum semi lineas; posticus autem pollicis unius longitudinem obtinet. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis quinque pollicum & decem linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput anteriùs & ad latera eleganti castaneo tingitur. Capitis pars posterior castaneo & nigro variegatur. Collum superius est dilutè castaneum. Dorsum & uropygium variegant exiguæ tæniæ transversæ & undatæ, alternatim nigricantes & castaneæ. Pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices iisdem coloribus, eodemque modo variegantur. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute flavicante solummodo coopertum. Guttur, pars colli in-

nes; son pied un pouce cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce quatre lignes, l'extérieur treize lignes, l'intérieur douze lignes & demie; & celui de derriere un pouce. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied cinq pouces dix lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie antérieure & les côtés de la tête sont d'un beau marron. La partie postérieure de la tête est variée de marron & de noir. Le dessus du col est d'un marron clair. Le dos & le croupion sont variés de noirâtre & de marron, & cela par petites bandes transversales & en zigzags. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont variées de même & des mêmes couleurs. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un gris tirant un peu sur le marron. Le ventre, les côtés, le haut des jambes, les cou-

vertures du deſſous de la queue & celles du deſſous des aîles ſont d'un gris-rouſſâtre. Les *petites couvertures du deſſus des aîles*, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont de la même couleur que les plumes du dos : les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres, & bordées de gris-rouſſâtre par le bout. L'aîle eſt compoſée de vingt-cinq plumes : les vingt-une premieres ſont noirâtres; & de celles-là les ſeize premieres ſont bordées de gris par le bout : les cinq ſuivantes, ſçavoir depuis la dix-ſeptiéme juſqu'à la vingt-uniéme incluſivement, ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, un peu au-delà de l'extrémité des plus grandes plumes de l'aîle : les quatre autres, ſçavoir depuis la vingt-deuxiéme juſqu'à la vingt-cinquiéme incluſivement, ſont noirâtres, rayées tranſverſalement de marron du côté extérieur, & bordées de la même couleur par le bout. Toutes les plumes de l'aîle ſont de plus marquées d'un peu de blanchâtre à leur origine du côté intérieur ſeulement. La queue eſt compoſée de douze plumes noirâtres. Le demi-bec ſupérieur eſt de cette derniere couleur; l'inférieur eſt d'un

ferior & pectus ex griſeo-paululùm ad caſtaneum vergunt. Venter, latera, crurum ſuprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas ſubtus obtegentes ex griſeo rufeſcunt. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, pennis dorſum veſtientibus concolores : majores à corpore remotiores nigricantes, griſeo-rufeſcente in apice fimbriatæ. Alam componunt viginti quinque remiges : uno-viginti primores nigricant; ex iſtis autem ſexdecim priores griſeo ſunt in apice marginatæ : quinque proximè ſequentes, à decima ſeptima ſcilicet ad vigeſimam primam uſque incluſivè, maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, paululùm ultra majorum remigum extremitates extenduntur : quatuor reliquæ, à vigeſima ſecunda ſcilicet ad vigeſimam quintam uſque incluſivè, ſunt nigricantes, in latere exteriore caſtaneo tranſverſim ſtriatæ, eodemque colore in apice marginatæ. Omnes inſuper remiges pauco candicante ad ipſarum exortum in latere interiore tantùm inſigniuntur. Duodecim rectri-

cibus nigricantibus cauda conflatâ. Mandibula superior quoque nigricans; inferior albo-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque griseo-fusci. Habitat in *Philippensibus Insulis* unde in *museum D. Aubry* missus est.

blanc-jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. On le trouve aux *Isles Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

39. LE CRABIER D'AMÉRIQUE.

Ardea superne cinereo-cœrulescente, viridi obscuro & rufescente varia, infernè cinerea; vertice cinereo-cœrulescente; collo superiore fusco, xerampelino vario; collo inferiore & pectore candidis, maculis xerampelinis variegatis; rectricibus nigro-virescentibus; rostro superne nigro, infernè fusco-flavicante; pedibus flavis . . . . . CANCROFAGUS AMERICANUS.

Héron ou Ardea varia. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag.* 268. (*ed.* 1725).

Héron ou Ardea varia major Chiliensis. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag.* 57. (*ed.* 1725).

Les François de l'Amérique l'appellent CRA-CRA. *Feuillée.*

Les Caraïbes, JABOUTRA. *Feuillée.*

Præcedentem crassitie paululum antecellit. Vertex capitis ex cinereo cœrulescit. Caput posterius, collumque superius fusca sunt, xerampelino colore varia. Dorsum & uropygium cinereo-cœrulescente, viridi obscuro & rufescente eleganter variegata. Pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices iisdem coloribus variegan-

Il est un peu plus gros que le précédent. Le sommet de la tête est d'un cendré-bleuâtre. Le derriere de la tête & la partie supérieure du col sont d'un brun varié de couleur feuille-morte. Le dos & le croupion sont fort joliment variés de cendré-bleuâtre, de verd-obscur & de roussâtre. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue

ſont variées des mêmes couleurs. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau jaunâtre. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine ſont d'un blanc varié de quelques taches feuillemorte. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont cendrés. Les petites couvertures du deſſus des aîles ſont d'un verd obſcur, & bordées de rouſſâtre : les grandes ſont noires, & bordées de blanc. Toutes les plumes de l'aîle ſont pareillement noires, & bordées de blanc dans toute leur circonférence. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un noir-verdâtre. La prunelle des yeux eſt d'un bleu obſcur : leur iris eſt de couleur d'or. Le demi-bec ſupérieur eſt noir ; l'inférieur eſt d'un brun-jaunâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont jaunes ; & les ongles noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane,

tur. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & ſolummodo cute flavicante obtegitur. Guttur, pars colli inferior & pectus albent, & maculis quibuſdam xerampelinis variegantur. Ventrem, latera, crurum partem ſupremam & inferiores caudæ tectrices tingit color cinereus. Superiores alarum tectrices minores ſunt obſcurè virides, rufeſcente fimbriatæ : majores nigræ, albo marginatæ. Remiges omnes nigro ſimiliter imbuuntur, & in tota circumferentia albo marginantur. Corpori viciniores ſunt longiſſimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigro-vireſcentes. Oculorum pupilla obſcurè cœrulea : ipſorum irides aureo colore imbutæ. Mandibula ſuperior nigra ; inferior fuſco-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedeſque flavi ; ungues verò nigri. Trium digitorum anticorum medius extimo digito membranâ, ad primum articulum uſque protensâ, coadunatur. Habitat in *America*. Juxta rivulorum ripas,

haud procul à mare, versatur.

qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Amérique*. Il se tient le long des ruisseaux, assez près de la mer.

40. LE CRABIER DU BRÉSIL.

Ardea supernè nigro-chalybea, fusco & flavicante varia, infernè alba, cinereo & pallidè luteo variegata; capite superiore nigro-chalybeo, dilutè fusco notato; rectricibus virescentibus; spatio rostrum inter & oculos nudo, luteo; rostro superiùs fusco, infernè albo-flavicante; pedibus luteis. . . . . CANCROFAGUS BRASILIENSIS.

Ardeola. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 210, *in qua hujus icon non satis accurata.*

Jonst. Avi. pag. 144. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 61.

Ardeola Brasiliensis Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 210. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LI.*

Raj. Syn. Avi. pag. 101. *N°.* 18.

Cocoi primus. *Pison. Hist. Nat. pag.* 89, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*

Les Brasiliens l'appellent Cocoi. *Pison.*

Crassitie *Columbam* vix adæquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sexdecim pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues unum pedem octo pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata quindecim circiter lineas; pes duos pollices cum

Il est tout au plus de la grosseur d'un *Pigeon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ seize pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied huit pouces six lignes. Son bec depuis la pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long; sa queue deux pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, environ quinze lignes; son pied deux pouces six lignes; celui

du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces trois lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est le plus court de tous. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un noir tirant sur la couleur d'acier poli, marqué d'un peu de brun clair. La gorge, le col, la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un blanc varié de cendré & de jaune pâle. Le haut des jambes est varié de cendré & de jaunâtre. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir tirant sur la couleur d'acier poli, varié de brun & de jaunâtre. Les couvertures du dessus des aîles sont joliment variées de brun, de couleur d'acier poli, de jaunâtre & de cendré. Les plumes de l'aîle sont verdâtres, & marquées à leur extrémité d'une tache blanche. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presqu'aussi loin

sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & tres lineas : laterales paulo sunt breviores ; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Capitis superior pars est nigro-chalybea, pauco fusco diluto notata. Guttur, collum, pectus, venter, latera, inferiorésque caudæ tectrices albicant, & cinereo, luteóque pallido variegantur. Crurum suprema pars cinereo & flavicante variegata. Dorsum, uropygium, scapulares pennas & superiores caudæ tectrices tingit color nigro-chalybeus, fusco & flavicante varius. Superiores alarum tectrices fusco, chalybeo, flavescente & cinereo eleganter variegatæ. Alarum remiges virescentes, maculâ candidâ in extremitate insignitæ. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus virescentibus cauda constat.

constat. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute luteâ solummodo tectum. Oculorum pupilla nigra: ipsorum irides aureo colore imbutæ. Mandibula superior fusca; inferior albo-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedesque lutei; ungues verò grisei. Habitat in *Brasilia*.

que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes verdâtres. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. La prunelle des yeux est noire; leur iris est de couleur d'or. Le demi-bec supérieur est brun; l'inférieur est d'un blanc-jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont jaunes; & les ongles gris. On le trouve au *Brésil*.

41. LE CRABIER DE BAHAMA.

Ardea cristata, superne albo & nigro striata, infernè obscurè cœrulea; capite nigro-cœrulescente; vertice pallidè luteo; tæniâ longitudinali in genis, & pennis in occipite strictissimis longissimis candidis; spatio rostrum inter & oculos nudo viridi; rostro nigro; pedibus luteis. . . . CANCROFAGUS BAHAMENSIS.

Ardea crista flava, corpore nigro-cœrulescente, fascia temporali alba. Ardea violacea. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 12.
Ardea major grisea cristata, capite nigro, vertice & ciliis albicantibus. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag.* 478.
Ardea cœrulea. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 314. *hujus icon non satis accurata Tab.* 264. *fig.* 5.
Raj. Syn. Avi. pag. 189. *N°.* 2.
Ardea Stellaris cristata Americana. *Klein. Avi. pag.* 124. *N°.* 9.
Butor huppé. *Catesb. Tom. I. pag.* 79; *avec une figure pas assez exacte Pl.* 79.
Les Anglois l'appellent CRESTED BITTERN. *Catesb.*
Les Anglois de la Jamaïque, GREY CRESTED GAULDING. *Browne.*

Cum *Botauro nævio* crassitie circiter convenit. Ipsius

Il est à peu près de la grosseur du *Butor tacheté*. Sa lon-

gueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quinze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces huit lignes de long; sa queue deux pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce; son pied trois pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur un pouce huit lignes, l'intérieur un pouce six lignes; & celui de derriere quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est couvert de plumes d'un jaune pâle, parmi lesquelles il y en a quelques-unes de blanches: ces dernieres, qui sont fort étroites & fort longues, quelques-unes ayant jusqu'à six pouces de longueur, forment une belle hupe, que l'Oiseau redresse ou abaisse à volonté. Le reste de la tête est d'un noir tirant sur

longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem septem pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & octo lineas longum est; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes tres pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas, extimus unum pollicem cum octo lineis, intimus unum pollicem & sex lineas; posticus autem quatuordecim lineas. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alæ complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Capitis verticem obtegunt pennæ pallidè luteæ, inter quas quædam oriuntur candidæ: quæ novissimæ dictæ sunt strictissimæ, maximam longitudinem obtinent, quædam enim sex pollicum longitudine pollent, & elegantem efficiunt cristam, quam Avis ad libitum erigere aut

contrahere poteſt. Reliquum caput ex nigro cœruleſcit. In utroque tamen capitis latere tænia extat longitudinalis candida, ab oris angulis orta, & versùs occipitium uſque protenſa. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & tantummodo cute viridi obtegitur. Dorſum eſt albo & nigro ſtriatum. Guttur, collum, pectus, ventrem, latera, crurum partem ſupremam, uropygium, pennas caudam ſuperne & infernè cooperientes, ſuperioreſque alarum tectrices tingit color obſcurè cœruleus. Pennæ ſcapulares concolores : ex iſtis autem quædam ſunt ſtrictiſſimæ, ſeptem pollices longæ, & ultra caudam extremam protenduntur. Remiges alarum ſunt fuſcæ, cœruleo adumbratæ. Corpori finitimæ maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices obſcurè cœruleæ. Oculorum irides rubræ. Roſtrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque lutei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Ca-*

le bleu. Il y a cependant de chaque côté de la tête une bande longitudinale blanche, qui part des coins de la bouche, & s'étend juſque vers l'occiput. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau verte. Le dos eſt rayé de noir & de blanc. La gorge, le côl, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, le croupion, les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, & celles du deſſus des aîles ſont d'un bleu obſcur. Les plumes ſcapulaires ſont de la même couleur : quelques-unes de celles-là ſont très-étroites, ont juſqu'à ſept pouces de longueur, & s'étendent au-delà du bout de la queue. Les plumes de l'aîle ſont d'un brun nuancé de bleu. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un bleu obſcur. L'iris des yeux eſt rouge. Le bec eſt noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont jaunes; & les ongles noirâtres. On le trouve à *la Caroline*, à *la Jamaïque* & dans l'*Iſle Bahama*.

Il fait son nid dans les buissons qui croissent parmi les rochers.

rolina, *Jamaica* & *Bahamensi Insula*. In sepibus inter rupes provenientibus nidificat.

42 Le Crabier bleu.

Ardea cristata, cœrulea; capite, cristâ & collo ad violaceum vergentibus; pennis in colli inferioris ima parte strictissimis longissimis; spatio rostrum & oculos nudo, rostroque cœruleis; pedibus viridibus. . . . Cancrofagus cœruleus.

Ardea occipite cristato, corpore cœruleo. Ardea cœrulea *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 13.
Ardea plumbea cristata, capite nigro, vertice albo. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag* 478.
Ardea cœruleo-nigra. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 315. *N°. IV. hujus icon non satis accurata Tab.* 263. *fig.* 3.
Raj. Syn. Avi pag. 189. *N°.* 3.
Ardea cyanea. *Klein. Avi. pag.* 124. *N°.* 7.
Héron bleu. *Catesb. Tom. I pag.* 76; *avec une figure exacte Pl.* 76.
Les Anglois l'appellent Blew Heron. *Catesb.*
Les Anglois de la Jamaïque, Black Gaulding *ou* Blew Gaulding. *Sloane. Raj.* Blue Gaulding. *Browne.*

Il n'est pas tout-à-fait si gros qu'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces de long; sa queue deux pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces trois lignes; son pied trois pouces quatre lignes; celui du milieu des trois doigts

Cornici paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem quinque pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem undecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices longum est; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata duos pollices & tres lineas; pes tres pollices cum quatuor lineis;

trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & quatuor lineas, extimus duos pollices, intimus unum pollicem cum decem lineis; posticus autem unum pollicem & quinque lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alæ complicatæ nonnihil ultra caudam extremam protenduntur. Caput, guttur & collum ex cœruleo ad violaceum vergunt. Ab occipitio longæ oriuntur pennæ concolores, strictissimæ, elegantem cristam efficientes. Colli inferioris pars infima pennis obsita est longis similiter & strictissimis, pectori incumbentibus. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ caudam superne & infernè cooperientes, alarumque tectrices superiores & inferiores cœruleo tinguntur colore. Ex scapularibus quædam sunt valdè strictæ, pedem longitudine adæquant, & ad quatuor usque pollices ultra caudam extremam protenduntur. Alarum remiges eodem imbuuntur cœruleo ac dorsum ipsum tingitur.

antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces quatre lignes, l'extérieur deux pouces, l'intérieur un pouce dix lignes; & celui de derriere un pouce cinq lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. La tête, la gorge & le col sont d'un bleu tirant sur le violet. Il part de l'occiput de longues plumes de la même couleur, fort étroites, qui forment une jolie hupe. Le bas de la partie inférieure du col est garni de pareilles plumes, qui retombent sur la poitrine. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessus & du dessous des aîles, & les côtés sont bleus. Quelques-unes des plumes scapulaires sont extrêmement étroites, ont un pied de longueur, & s'étendent jusqu'à quatre pouces au-delà du bout de la queue. Les plumes de l'aîle sont du même bleu que le dos. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin

que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes bleues. L'iris des yeux est jaune. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau bleue. Le bec est de la même couleur; mais elle devient un peu plus foncée vers l'extrémité du bec. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verds; & les ongles noirâtres. On le trouve à la *Caroline* & à *la Jamaïque*.

Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cœruleæ. Oculorum irides luteæ. Spatium rostrum inter & oculum contentum plumis est denudatum, & cute cœruleâ solummodo tectum. Rostrum similiter cœruleum, attamen nonnihil saturatiùs versùs extremitatem. Pars crurum plumis denudata, pedesque virides; ungues verò nigricantes. Habitat in *Carolina* & *Jamaica*.

** 43. Le Crabier verd.

Voyez Pl. XXXVIII. Fig. 1.

Ardea superne viridi-aurea, cupri puri colore varians, infernè fusco-castanea; gutture albo, maculis fuscis vario; collo castaneo, albido in parte inferiore variegato; pennis in colli inferioris ima parte strictissimis & longissimis; marginibus alarum griseo-fulvis; rectricibus viridi-aureis, cupri puri colore variantibus; rostro superiùs fusco, inferiùs flavicante; pedibus griseo-fuscis . . . . Cancrofagus viridis.

Ardea occipite subcristato, dorso viridi, pectore rufescente. Ardea virescens. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 15.
Ardea Stellaris minima. *Klein. Avi. pag.* 123. *N°.* 6.
Petit Butor. *Catesb. Tom. I. pag.* 80; *avec une figure exacte Pl.* 80.
Les Anglois l'appellent Small Bittern. *Catesb.*

Il n'est guères plus gros qu'un *Poulet*. Sa longueur depuis le

Crassitie *Pullum Gallinaceum* non multùm excedit.

Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem quinque pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem septem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & decem lineas longum est ; cauda duos pollices cum novem lineis ; pars crurum plumis denudata unum pollicem ; pes unum pollicem & novem lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem longitudine pollet ; extimus octodecim lineas longus, intimus unum pollicem & quatuor lineas ; posticus autem quatuordecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum ; alæ verò complicatæ ad sex linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Capitis superior pars est obscurè viridi aurea, cupri puri colore varians. Guttur albicat, & maculis quibusdam variegatur fuscis. Collum castaneo colore imbutum,

bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces dix lignes de long ; sa queue deux pouces neuf lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce ; son pied un pouce neuf lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a aussi un pouce neuf lignes de long ; l'extérieur dix-huit lignes, l'intérieur un pouce quatre lignes ; & celui de derriere quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un verd-doré sombre & changeant en couleur de cuivre de rosette. La gorge est d'un blanc varié de quelques taches brunes. Le col est de couleur de marron, sa partie inférieure étant variée de blanchâtre. Le bas de cette même partie est garni de plumes très-longues & très-étroites, qui retombent

ſur la poitrine. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de roſette. Les plumes qui couvrent la partie ſupérieure du dos, ainſi que les ſcapulaires, ſont très-longues & fort étroites. La poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un brun tirant un peu ſur le marron. Le haut des jambes tire ſur le fauve. Les couvertures du deſſous des aîles ſont cendrées, chaque plume étant bordée de fauve. Le bord de l'aîle, au-deſſous du pli qui répond à celui du poignet, eſt d'un gris-fauve. Toutes les couvertures du deſſus des aîles ſont d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de roſette; les plus petites ſont bordées de marron: les moyennes, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont bordées de fauve: les grandes les plus éloignées du corps ſont bordées de la même couleur, mais ſeulement par le bout. L'aîle eſt composée de vingt-quatre plumes d'un verd-doré ſombre & changeant en couleur de cuivre de roſette: les ſept premieres n'ont aucune bordure: les quatre ſuivantes, ſçavoir depuis la huitiéme juſ-

albido in parte inferiore variegatum. Colli autem inferioris pars infima pennis obſita eſt longiſſimis & ſtrictiſſimis, pectori incumbentibus. Dorſum, uropygium, ſcapulares pennas & ſuperiores caudæ tectrices tingit color viridi-aureus, cupri puri colore varians. Pennæ dorſum ſupremum veſtientes, ſicut & ſcapulares, longiſſimæ ſunt & ſtrictiſſimæ. Pectus, venter, latera, inferioreſque caudæ tectrices ex fuſco nonnihil ad caſtaneum vergunt. Crurum ſuprema pars ad fulvum inclinat. Pennæ alas ſubtus obtegentes ſunt cinereæ, fulvo fimbriatæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano reſpondentem, ſunt griſeo-fulvæ. Superiores alarum tectrices omnes viridi-aureæ, cupri puri colore variantes; minimæ caſtaneo marginantur: mediæ, ſicut & majores corpori viciniores, ſunt fulvo fimbriatæ: majores à corpore remotiores eodem colore marginatæ quidem, ſed in apice tantùm. Alam componunt viginti quatuor remiges obſcurè viridi-aureæ, cupri puri colore variantes: ſeptem primores nullâ margine donantur;

donantur : quatuor proximè sequentes, ab octava scilicet ad undecimam usque inclusivè, sunt fulvo in apice fimbriatæ : tredecim reliquæ, à duodecima scilicet ad vigesimam quartam usque inclusivè, fulvo similiter marginatæ per totam lateris exterioris longitudinem, sicut & in apice. Sex remiges corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, in acumen desinunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus viridi-aureis, cupri puri colore variantibus. Oculorum irides luteæ. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute luteâ obducitur. Mandibula superior fusca ; inferior flavicans, præsertim versùs exortum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque griseo-fusci. *Ranis*, *Cancris* & *Pisciculis* victitat. Habitat in *Carolina*, *Virginia*, *Martinica* & *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Artur*.

qu'à l'onziéme inclusivement, sont bordées de fauve par le bout : les treize autres, sçavoir depuis la douziéme jusqu'à la vingt-quatriéme inclusivement, sont bordées pareillement de fauve dans toute la longueur du côté extérieur & par le bout. Les six plumes de l'aîle les plus proches du corps sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de rosette. L'iris des yeux est jaune. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. Le demi-bec supérieur est brun ; l'inférieur est jaunâtre, sur-tout vers son origine. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. Il se nourrit de *Grenouilles*, de *Crabes* & de *petit Poissons*. On le trouve à *la Caroline*, en *Virginie*, à *la Martinique* & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

** 44. Le Crabier verd tacheté.

Voyez Pl. XXXVIII. Fig. 2.

Ardea ſuperne viridi-aurea, cupri puri colore varians, infernè griſea; gutture albo, maculis fuſcis vario; collo caſtaneo, albido in parte inferiore variegato; pennis in colli inferioris ima parte ſtrictiſſimis & longiſſimis; marginibus alarum allidis; alis ſuperne albo punctulatis; rectricibus obſcurè viridi-aureis, cupri puri colore variantibus, lateralibus apice griſeo-fuſcis; roſtro ſuperiùs nigricante, infernè albo-flavicante; pedibus fuſcis . . . . . Cancrofagus viridis nævius.

Il n'eſt pas tout-à-fait ſi gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'un pied trois pouces neuf lignes, & juſqu'à celui des ongles d'un pied cinq pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a deux pouces neuf lignes de long; ſa queue deux pouces trois lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, huit lignes; ſon pied un pouce ſept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur ſeize lignes & demie, l'intérieur un pouce quatre lignes; & celui de derriere quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une mem-

Præcedenti nonnihil craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam unum pedem tres pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues unum pedem quinque pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque duos pollices & novem lineas longum eſt; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes unum pollicem & ſeptem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum novem lineis, extimus ſexdecim cum ſemi lineas, intimus unum pollicem & quatuor lineas; poſticus autem quatuordecim lineas. Trium

digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & decem pollicûm intervallo distant; alæ verò complicatæ ad sex linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Capitis pars superior est obscurè viridi-aurea, cupri puri colore varians. Guttur albicat, & maculis fuscis variegatur. Collum castaneo colore tinctum, albido in parte inferiore variegatum. Colli autem inferioris pars infima pennis obsita est longissimis & strictissimis, pectori incumbentibus : quæ pennæ sunt griseæ, & latâ tæniâ candicante, secundùm scapi longitudinem ductâ, insignitæ. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt viridi-aureæ, cupri puri colore variantes. Pennæ dorsi partem supremam vestientes, sicut & scapulares, longissimæ sunt & strictissimæ. Pectus, ventrem & latera tingit color griseus. Crurum suprema pars ex griseo ad fulvum nonnihil inclinat. Pennæ caudam subtus obte-

brane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied dix pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un verd-doré sombre & changeant en couleur de cuivre de rosette. La gorge est d'un blanc varié de taches brunes. Le col est de couleur de marron, sa partie inférieure étant variée de blanchâtre. Le bas de cette même partie est garni de plumes très-longues & très-étroites, qui retombent sur la poitrine : ces plumes sont grises, & marquées chacune d'une large bande blanchâtre, qui s'étend selon la longueur de la tige. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de rosette. Les plumes qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont très-longues & très-étroites. La poitrine, le ventre & les côtés sont gris. Le haut des jambes est d'un gris tirant un peu sur le fauve. Les couvertures du dessous de la queue sont grises, & variées de blanchâtre. Les petites du dessous des aîles sont d'un gris-brun, & marquées chacune

d'une tache blanchâtre, placée vers leur extrémité, & qui s'étend ſelon la longueur de leur tige : les grandes ſont cendrées. Le bord de l'aile, au-deſſous du pli qui répond à celui du poignet, eſt blanchâtre. Les couvertures du deſſus des aîles ſont d'un brun nuancé de verd-doré & de couleur de cuivre de roſette : les plus petites ſont bordées de marron : les moyennes, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont bordées extérieurement de fauve, & marquées d'une tache blanche, placée à l'extrémité du côté extérieur, tout auprès de la tige : les grandes les plus éloignées du corps ſont marquées d'une pareille tache blanche, mais elles n'ont point de bordure. L'aîle eſt compoſée de vingt-quatre plumes d'un brun foncé, & dont le côté extérieur eſt nuancé de verd-doré changeant en couleur de cuivre de roſette : de plus les dix-huit premieres ſont marquées à leur extrémité d'une tache blanche, qui devient d'autant plus petite, que la plume eſt plus proche du corps : les ſix autres ſont terminées de gris-brun. Ces ſix dernieres plumes ſont fort longues, ſe terminent en pointe, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, auſſi loin que les plus

gentes griſeæ, albido variegatæ. Inferiores alarum tectrices minores griſeo-fuſcæ, maculâ candicante, versùs ipſarum extremitatem poſitâ, & ſecundùm ſcapi longitudinem ductâ, notatæ : majores cinereæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano reſpondentem, albidæ. Superiores alarum tectrices fuſcæ, viridi-aureo & cupri puri colore adumbratæ : ex ipſis minimæ caſtaneo marginatæ : mediæ, ſicut & majores corpori finitimæ, exteriùs fulvo fimbriatæ, & maculâ albâ, in lateris exterioris extremitate prope ſcapum poſitâ, inſignitæ : majores à corpore remotiores pari maculâ candidâ notantur, ſed margine deſtituuntur. Alam componunt viginti quatuor remiges ſaturatè fuſcæ, in latere exteriore viridi-aureo cupri puri colore variante adumbratæ : octodecim primores maculâ inſuper albâ in extremitate notantur; quæ macula eò minor eſt, quò remix ſit corpori vicinior : ſex reliquæ griſeo-fuſco terminantur. Quæ ſex noviſſimè dictæ remiges maximâ longitudine pollent, in acumen deſinunt, & dum ala com-

plicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Cauda duodecim constat rectricibus obscurè viridi-aureis, cupri puri colore variantibus, lateralibus omnibus griseo-fusco terminatis. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute flavicante tectum. Mandibula superior nigricat; inferior ex albo flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusci. Habitat in *Martinica*, unde in *museum D. Aubry* missus est.

grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un verd-doré sombre, & changeant en couleur de cuivre de rosette : toutes les latérales sont terminées de gris-brun. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. Le demi-bec supérieur est noirâtre; l'inférieur est d'un blanc-jaunâtre. La partie des jambes, qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve à *la Martinique*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son *cabinet*.

** 45. LE BIHOREAU.

Voyez Pl. XXXIX.

Ardea superne obscurè viridis, infernè alba; vertice nigro-viridescente; tæniâ in syncipite & supra oculos candidâ; pennis tribus in occipite strictissimis longissimis candidis; collo superiore albo-cinerascente; uropygio dilutè cinereo; remigibus, rectricibusque cinereis; rostro nigricante; pedibus viridi-flavicantibus . . . . NYCTICORAX.

Ardea crista occipitis tripenni dependente, dorso nigro, abdomine flavescente. Nycticorax. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 9.
Ardea cirrata, alba, dorso nigro. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 7.
Ardea varia. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 226.
Ardea varia Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 123. *N°.* 5.
Ardea cinerea altera, seu minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 380. *hujus icon satis accurata pag.* 381.
Ardea cinerea minor. *Jonst. Avi. pag.* 103. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 50.
Raj. Syn. Avi. pag. 99. *N°.* 3.

Charlet. Exer. pag. 109. *N°.* 1.
Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 364.
Marsil. Danub. Tom. V. pag. 10. *hujus icon pessima Tab.* 3.
Ardea cinerea minor, Germanis Nycticorax. *Willugh. Ornith. pag.* 204. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XLIX.*
Nycticorax. *Gesn. Avi. pag.* 627. *hujus icon pessima pag.* 628.
Gesn. icon. Avi. pag. 18, *in qua eadem icon.*
Charlet. Exer. pag. 79. *N°.* 9.
Charlet. Onomazt. pag. 71. *N°.* 9.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.
Nycticorax Ornithologi. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 271. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 272.
Nicticorax Gesneri. *Jonst. Avi. pag.* 95. *hujus icon à Gesnero mutuata Tab. XX.*
Corvus Nocturnus Agric. *Klein.*
Héron ou Ardea cinerea rostro crassiori. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag.* 411. (*ed.* 1725).
Bihoreau ou Roupeau, Espece de Héron. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag.* 197; *avec une mauvaise figure pag.* 198.
Bihoreau, Roupeau. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 44 *a, dans laquelle est la même figure.*
Corbeau de nuit. *Alb. Tom. II. pag.* 43; *avec une figure mal coloriée Pl.* 67.
Les Boulonnois l'appellent SGUACCO. *Aldrov.*
Les Allemands, NACHT-RABE. *Gesn. Aldrov. Schwenck.* NACHT-RAB. *Willugh.* BUNDTER REGER; SCHILD REGER. *Schwenck.*
Les Allemands aux environs de Strasbourg, NACHT-RAM. *Gesn. Aldrov. Schwenck.*
Les Siléfiens, FOCKER; FOCKE. *Schwenck.*
Les Hollandois, QUACK. *Charlet.*
Les Flamands, QUACK. *Willugh.*
Les Anglois, NIGHT-RAVEN. *Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb.* LESSER ASH COLOURED HERON. *Raj.*

Il est à peu près de la grosseur d'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied huit pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied dix pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins

Cum *Cornice* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem unum pedem & octo pollices æquat, & ad extremos ungues unum pedem decem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius

apice ad oris angulos usque tres pollices & novem lineas longum est; cauda tres pollices cum decem lineis; pars crurum plumis denudata tredecim lineas; pes duos pollices & septem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & undecim lineas, extimus duos pollices & totidem cum semi lineas, intimus duos pollices cum sesquilinea; posticus autem unum pollicem & octo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum & duorum pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Supra mandibulæ superioris exortum sive in syncipite exigua extat tænia candida, utrinque supra oculos ducta. Vertex capitis nigro-viridescente tingitur colore: qui color supra collum superius extenditur, & in acumen desinit. Ab occipitio tres oriuntur pennæ quinque circiter pollices longæ, strictissimæ, niveo candore nitentes. Collum superiùs & ad

de la bouche a trois pouces neuf lignes de long; sa queue trois pouces dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, treize lignes; son pied deux pouces sept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces onze lignes, l'extérieur deux pouces deux lignes & demie, l'intérieur deux pouces une ligne & demie; & celui de derriere un pouce huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a trois pieds deux pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Au-dessus de l'origine du demi-bec supérieur ou sur le synciput est une petite bande blanche, qui s'étend de chaque côté jusqu'au dessus des yeux. Le dessus de la tête est d'un noir changeant en verd: cette couleur s'étend en pointe sur la partie supérieure du col. De l'occiput partent trois plumes longues d'environ cinq pouces, très-étroites & d'un très-beau blanc. La partie supérieure & les côtés du col sont d'un blanc tirant un peu sur le cendré. La partie supérieure du dos & les

plumes ſcapulaires ſont d'un verd foncé & obſcur. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un cendré clair; quelques-unes des couvertures du deſſus de la queue ſont cependant d'un cendré plus foncé. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau d'un verd-jaunâtre. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un beau blanc. Les côtés ſont d'un blanc tirant un peu ſur le cendré. Les couvertures du deſſous des aîles ſont d'un cendré très-clair. Le bord de l'aîle, au-deſſous du pli qui répond à celui du poignet, eſt blanc. Les couvertures du deſſus des aîles ſont cendrées. Les plumes de l'aîle ſont de la même couleur. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes cendrées. L'iris des yeux eſt d'un jaune-orangé. Le bec eſt d'un verd-jaunâtre à ſon origine, & noirâtre dans le reſte de ſa longueur. La partie des jambes qui

latera ex albo nonnihil ad cinereum vergit. Dorſi ſuprema pars & ſcapulares pennæ ſunt obſcurè ſaturatè virides. Dorſum infimum, uropygium & ſuperiores caudæ tectrices dilutè cinereæ; quædam tamen ex ſuperioribus caudæ tectricibus cinereo imbuuntur ſaturatiore. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & ſolummodo cute viridi-flavicante obtegitur. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, crurum ſuprema pars, inferioreſque caudæ tectrices candore nitent. Latera ex albo nonnihil ad cinereum inclinant. Pennæ alas ſubtus obtegentes ſunt dilutiſſimè cinereæ. Margines alarum, infra articulum carpo humano reſpondentem, albæ. Superiores alarum tectrices cinereæ. Remiges concolores. Corpori finitimæ maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Duodecim rectricibus cinereis cauda conſtat. Oculorum irides flavo-aurantiæ. Roſtrum in exortu viridi-flavicans, in reliqua longitudine nigricans. Pars crurum plumis denudata,

pedeſque

pedesque viridi-flavicantes; ungues verò nigricantes. Paludes frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un verd-jaunâtre; & les ongles noirâtres. On le trouve dans les marais. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 46. Le Blongios.

Voyez Pl. XL. Fig. 1.

Ardea superne nigro-viridescens, infernè dilutè fulva; collo superiore griseo-fulvo, ad castaneum vergente; pennis in colli inferioris ima parte longissimis; pectore maculis longitudinalibus nigricantibus vario; rectricibus nigro-virescentibus; rostro viridi-flavicante, superiùs apice nigricante; pedibus virescentibus . . . . Ardeola.

Petit Butor. *Edwards. Glanur. Part. II. Chap. LXV. pag.* 136; *avec une figure peu exacte Pl.* 275.
On l'appelle en Barbarie Boo-onk. *Edwards.*

Turdum crassitie non multùm superat. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem tredecim pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues quindecim pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex cum semi lineas longum est; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata lineas binas; pes unum pollicem cum septem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & decem lineas, ex-

Il n'est guères plus gros qu'une *Grive*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes & demie de long; sa queue deux pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux lignes; son pied un pouce sept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce dix lignes, l'extérieur un pouce six lignes; l'intérieur

eſt de la même longueur; & celui de derriere a treize lignes de long. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a un pied ſept pouces ſix lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un noir-verd brillant & un peu doré. La partie ſupérieure du col eſt d'un gris-fauve, tirant un peu ſur le marron. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau jaunâtre. Les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure du col, le haut du ventre, le haut des jambes & les côtés ſont d'un fauve clair. Le bas de la partie inférieure du col eſt garni de plumes très-longues, qui retombent ſur la poitrine. Celles qui couvrent la poitrine, ſont noirâtres, & bordées de fauve clair. Le bas-ventre, les couvertures du deſſous de la queue & celles du deſſous des aîles ſont d'un blanc mêlé d'une légere teinte de fauve. Les petites & les moyennes

timus ſeſquipollicem; intimus eamdem longitudinem obtinet; poſticus autem tredecim lineas longus eſt. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membraná ad primum articulum uſque protensâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum unius pedis ſeptem pollicum & ſex linearum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Capitis ſuperior pars, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, ſuperioreſque caudæ tectrices ſunt ſplendidè nigro-virideſcentes, nonnihil aureo colore adumbratæ. Pars colli ſuperior ex griſeo-fulvo nonnihil ad caſtaneum vergit. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis eſt denudatum, & ſolummodo cute flavicante obſitum. Caput ad latera, guttur, partem colli inferiorem, ventrem ſupremum, crurum partem ſupremam & latera veſtiunt pennæ dilutè fulvæ. Colli inferioris pars infima pennis obſita eſt longiſſimis, pectori incumbentibus. Quæ pectus obtegunt, nigricant, & fulvo marginantur diluto. Venter imus, inferiores caudæ

tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albent, & aliquid fulvi admixtum habent. Superiores alarum tectrices minores & mediæ sunt dilutè fulvæ : majores à corpore remotiores nigro-viridescentes : majores corpori finitimæ ex albo ad griseum vergentes ; ex istis tamen excipiendæ sunt binæ corpori viciniores, sicut & proximè sequentis interius latus, dorso concolores. Viginti duabus remigibus ala conflatur : novemdecim primores sunt superne nigræ, exterius ad viridescentem inclinantes colorem, subtus verò cinereæ : tres corpori viciniores fuscæ, fulvo fimbriatæ. Quinque corpori finitimæ maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigro-virescentes. Mandibula superior ex viridi flavicat, attamen in apice nigricat ; inferior per totam longitudinem viridi-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedesque virescentes ; ungues verò grisei. Paludes frequentat. In *museum Realmurianum* ab *Helvetia* missa est à *D. Gannebin.*

couvertures du dessus des aîles sont d'un fauve clair : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un noir-verdâtre : les grandes les plus proches du corps sont d'un blanc tirant sur le gris ; il faut cependant en excepter les deux plus proches du corps & le côté intérieur de la suivante, qui sont de la même couleur que le dos. L'aîle est composée de vingt-deux plumes : les dix-neuf premieres sont noires en-dessus, leur côté extérieur tirant sur le verdâtre ; mais en-dessous elles sont cendrées : les trois plus proches du corps sont brunes, & bordées de fauve. Les cinq plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un noir-verd. Le demi-bec supérieur est d'un verd-jaunâtre, excepté son bout qui est noirâtre ; l'inférieur est d'un verd-jaunâtre dans toute sa longueur. La partie des jambes, qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verdâtres ; & les ongles gris. On le trouve dans les marais. Il a été envoyé de *Suisse* à *M. de Reaumur* par *M. Gannebin.*

** 47. Le Blongios tacheté.

Voyez Pl. XL. Fig. 2.

Ardea ſuperne fuſca, marginibus pennarum rufeſcentibus, infernè rufeſcens, pennis in medio fuſcis; vertice nigro-vireſcente, pennis in fronte caſtaneo marginatis; pennis in colli inferioris ima parte longiſſimis; imo ventre albo; rectricibus nigro-vireſcentibus, fulvo in apice marginatis; roſtro ſuperiùs fuſco, infernè viridi-flavicante; pedibus vireſcentibus . . . . Ardeola nævia.

Petit Butor brun. *Edwards. Glanur. Part. II. Chap. LXV. pag.* 135; *avec une figure aſſez exacte Pl.* 275.
Les Anglois l'appellent Little Brown Bittern. *Edwards.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'onze pouces neuf lignes, & juſqu'à celui des ongles de treize pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a deux pouces deux lignes & demie de long; ſa queue un pouce huit lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, deux lignes; ſon pied un pouce ſept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes; l'intérieur eſt de la même longueur; & celui de derriere a treize lignes de long. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt

Cum præcedente craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam undecim pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues tredecim pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque duos pollices & totidem cum ſemi lineas longum eſt; cauda unum pollicem & octo lineas; pars crurum plumis denudata lineas binas; pes unum pollicem & ſeptem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas, extimus unum pollicem cum quinque lineis; intimus eâdem longitudine pollet; poſticus autem tre-

decim lineas longus eſt. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt octodecim pollicum & ſex linearum ; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Vertex capitis ex nigro vireſcit : in fronte autem pennæ caſtaneo marginantur. Partem colli ſuperiorem veſtiunt pennæ rufæ, in medio nonnihil fuſceſcentes. Quæ dorſum ſupremum obtegunt, ſicut & ſcapulares, fuſcæ ſunt, marginibus ipſarum rufeſcentibus. Quæ dorſum infimum & uropygium cooperiunt, griſeo-fuſcæ, griſeo-fulvo fimbriatæ. Superiores caudæ tectrices nigricant, & griſeo-fulvo ſimiliter marginantur. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis eſt denudatum, & ſolummodo cute flavicante tectum. Caput ad latera, guttur, pars colli inferior, pectus, venter ſupremus, crurum ſuprema pars & latera pennis veſtiuntur rufeſcentibus, maculâ fuſcâ, ſecundùm ipſarum ſcapi longitu-

réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a dix-huit pouces ſix lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt d'un noir-verdâtre : ſur le front les plumes ſont bordées de marron. La partie ſupérieure du col eſt couverte de plumes rouſſes, dont le milieu eſt un peu rembruni. Celles qui couvrent la partie ſupérieure du dos, ainſi que les ſcapulaires, ſont brunes & bordées de rouſſâtre. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, ſont d'un gris-brun, bordées de gris-fauve. Les couvertures du deſſus de la queue ſont noirâtres, & bordées pareillement de gris-fauve. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau jaunâtre. Les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre, le haut des jambes & les côtés ſont couverts de plumes rouſſâtres, marquées dans leur milieu d'une tache brune, qui s'étend ſelon la longueur de leur tige. Celles qui garniſſent le bas de la partie inférieure du col, ſont fort longues, & retombent ſur

la poitrine. Le bas-ventre est blanc, ainsi que les couvertures du dessous de la queue. Les petites couvertures du dessous des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un fauve très-clair; les grandes les plus éloignées du corps sont blanches. Les plus petites du dessus sont brunes & bordées de roussâtre : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes dans leur milieu, & fauves sur leurs bords : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un noir-verdâtre. L'aile est composée de vingt-deux plumes. Les dix-neuf premieres sont noires en-dessus, leur côté extérieur tirant sur le verdâtre; mais en-dessous elles sont cendrées : les trois plus proches du corps sont brunes, & bordées de fauve. Les cinq plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un noir-verdâtre, bordées de fauve par le bout. Le demi-bec supérieur est brun; l'inférieur est d'un verd-jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes; & les pieds sont verdâtres; & les ongles gris. On le trouve dans les marais. Il

dinem ductâ, in medio insignitis. Pennæ autem quibus obsita est colli inferioris pars infima, maximâ longitudine pollent, & pectori incumbunt. Venter imus & pennæ caudam subtus obtegentes albicant. Tectrices alarum inferiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt dilutissimè fulvæ : majores à corpore remotiores candidæ. Superiores minimæ fuscæ, rufescente fimbriatæ: mediæ, sicut & majores corpori viciniores, in medio fuscæ, ad margines fulvæ : majores à corpore remotiores nigro-virescentes. Viginti duabus remigibus ala constat : novemdecim primores sunt superne nigræ, exteriùs ad virescentem vergentes colorem, subtus cinereæ : tres corpori finitimæ fuscæ, fulvo fimbriatæ. Quinque corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigro-virescentes, fulvo in apice marginatæ. Mandibula superior fusca; inferior viridi-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedesque virescentes; ungues vero grisei.



Dessiné et Gravé par Martinet.

Héron.

Dessiné et Gravé par Martinet.

Héron hupé.



Dessiné et Gravé par Martinet

1. Héron gris.

2. Héron pourpré hupé.



1. Butor. 2. Crabier des Philippines.



1. Crabier verd.

2. Crabier verd-tacheté.



Bihoreau.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1 *Blongios.* 2 *Blongios tacheté.*

Paludes frequentat. In *museum Realmurianum* ab *Helvetia* missa est à *D. Gannebin*.

a été envoyé de *Suisse* à *M. de Reaumur* par *M. Gannebin*.

. Forsan hæc est præcedentis fœmina.

Celui-ci pourroit bien être la femelle du précédent.

LXXXII.

Genus Scopi. (1)

Hujus character est

Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus :

Crura in parte inferiore plumis denudata :

Rostrum crassum, longum, rectum, lateraliter planum :

Mandibulæ superioris apex aduncus.

LXXXII.

Le genre de l'Ombrette. (1)

Son caractere est d'avoir

Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere :

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :

Le bec gros, long, droit, applati par les côtés :

Le bout de la mandibule supérieure crochu.

(1) *Scopus à* Σκία, id est, *umbra* : ab umbræ colore; unde nomen.

(1) *Ombrette.* Je l'ai ainsi nommée, à cause de la couleur d'*ombre*, dont toutes ses plumes sont teintes.

** 1. L'OMBRETTE.

Scopus fuscus, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; tectricibus caudæ inferioribus, rectricibusque dilutè fuscis, fusco saturatiore transversim striatis . . . . SCOPUS.

Cum *Egretta* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem & novem pollices explet, & ad extremos ungues unum pedem undecim pol-

Elle est à peu près de la grosseur de l'*Aigrette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces trois lignes. Son bec depuis

ſon crochet juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces ſix lignes de long; ſa queue ſix pouces ſix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, deux pouces trois lignes; ſon pied quatre pouces ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces, l'extérieur un pouce neuf lignes, l'intérieur un pouce ſept lignes & demie; & celui de derriere treize lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec les deux doigts latéraux par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Elle a trois pieds ſix pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La tête, la partie ſupérieure du col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus des aîles & celles du deſſus de la queue ſont d'un brun foncé ou de couleur de *terre d'ombre*. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du deſſous des aîles ſont de la même couleur, mais plus claire. Les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un brun clair, rayé tranſverſalement de brun très-foncé. Toutes les

lices & tres lineas. Roſtrum ab ipſius unco ad oris angulos uſque tres pollices & ſex lineas longum eſt; cauda ſex pollices & totidem lineas.; pars crurum plumis denudata duos pollices cum tribus lineis; pes quatuor pollices & ſex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices, extimus unum pollicem & novem lineas, intimus unum pollicem & ſeptem cum ſemi lineas; poſticus autem tredecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum duobus digitis lateralibus connectitur membranâ ad primum articulum uſque protensâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum trium pedum & ſex pollicum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput pars colli ſuperior, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, alas ſuperne veſtientes & ſuperiores caudæ tectrices ſunt ſaturatè fuſcæ ſive *umbræ* colore imbutæ. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crurum partem ſupremam & tectrices alarum inferiores tingit idem color, ſed dilutior. Pennæ caudam

ſubtus

subtus obtegentes, sunt dilutè fuscæ, fusco saturatissimo transversim striatæ. Omnes alarum remiges in latere exteriore & apice eodem imbuuntur fusco ac dorsum ipsum tingitur, in latere verò interiore fusco dilutiore tinguntur. Corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices dilutè fuscæ, saturatissimo fusco transversim striatæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigricant. Mandibula superior pluribus partibus inter se coadunatis conflata videtur. Habitat in *Senegalensi* regione, unde in *museum Realmurianum* missus est à *D. Adanson.*

plumes de l'aîle sont du même brun que le dos du côté extérieur & à leur extrémité; leur côté intérieur est d'un brun plus clair. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un brun clair, rayé transversalement de brun très-foncé. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirâtres. Le demi-bec supérieur semble être composé de plusieurs pièces articulées les unes avec les autres. On la trouve au *Sénégal*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Adanson.*

SECTIO IX.

Eæ quæ rostrum habent crassum & breve; ipsius mandibulâ superiore cochleariformi, apice unguiculatâ.

UNico genere, *Cochlearii* scilicet, constituitur hæc sectio.

SECTION IX.

Ceux qui ont le bec gros & court; la mandibule supérieure en forme de cuilliere, & onguiculée à son bout.

IL n'y a dans cette section qu'un seul genre, sçavoir celui de la *Cuilliere.*

LXXXIII.

Le genre de la Cuilliere.

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec gros, court :
La mandibule supérieure en forme de cuilliere, & onguiculée à son bout.

LXXXIII.

Genus Cochlearii.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti ; tres scilicet antici, posticus unus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Rostrum crassum, breve :
Mandibula superior cochleariformis, apice unguiculata.

** 1. LA CUILLIERE.

Cochlearius superne cinereo-albus, infernè fusco-rufescens ; capite superiore nigro ; syncipite, genis & collo inferiore albis ; dorso supremo saturatè cinereo ; rectricibus cinereo-albis . . . . COCHLEARIUS.

Onocrotalus Americanus, cinereus, non maculosus. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XI. sp.* 1.
Les François de la Guiane l'appellent SAOUAKOU.

Elle est un peu moins grosse que le *Courly*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied dix pouces six lignes. Son bec, qui a un pouce six lignes de largeur, a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche deux pouces neuf lignes de long ; sa queue deux pouces six lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de

Numenio paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem quinque pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem decem pollices & sex lineas. Rostrum, quod sesquipollicis latitudinem obtinet, ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & novem lineas longum est ; cauda

duos pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum novem lineis; pes tres pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas, extimus duos pollices cum tôtidem lineis, intimus duos pollices; posticus autem quindecim lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & undecim pollicum; alæ verò complicatæ ad unius pollicis distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput superius nigro tingitur colore. Synciput, caput ad latera sive genæ, collumque inferiùs & ad latera albicant. Pars colli superior, dorsum infimum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ tectrices ex cinereo albent. Dorsi partem supremam tingit color saturatè cinereus. Pectus, venter, latera, inferioresque caudæ tectrices sunt fusco-rufes-

plumes, un pouce neuf lignes; son pied trois pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur deux pouces deux lignes, l'intérieur deux pouces; & celui de derriere quinze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a deux pieds onze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à un pouce au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête est noire. Le synciput, les côtés de la tête ou les joues, la partie inférieure & les côtés du col sont blancs. Le dessus du col, la partie inférieure du dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un gris-blanc. La partie supérieure du dos est d'un cendré foncé. La poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun-roussâtre. Le haut des jambes est d'un gris-blanc. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches. Le bord de l'aîle, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est

de la même couleur. Toutes les plumes de l'aîle ſont d'un gris-blanc. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un gris-blanc. Le demi-bec ſupérieur eſt d'un cendré foncé, excepté ſes bords, qui ſont blanchâtres; le demi-bec inférieur eſt entiérement blanchâtre, & garni en-deſſous d'une membrane de la même couleur, capable d'une très-grande extenſion. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un verd-jaunâtre; & les ongles gris. On la trouve dans *la Guiane*. Elle a été envoyée de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

centes. Crurum ſuprema pars ex cinereo albicat. Inferiores alarum tectrices ſunt candidæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano reſpondentem, concolôres. Remiges omnes cinereo-albæ. Corpori finitimæ maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereo-albis cauda conſtat. Mandibula ſuperior ſaturatè cinerea, attamen ad margines candicans; inferior penitùs albida, & ſubtus membranâ concolore, valdè inflabili, inſtructa. Pars crurum plumis denudata, pedeſque viridi-flavicantes; ungues verò griſei. Habitat in *Guiana*. A *Cayana* in *muſeum Realmurianum* miſſus à *D. Artur*.

A. *LA CUILLIERE TACHETÉE.*

Cochlearius nævius.

Onocrotalus Americanus, cinereus, maculatus. *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen. XI. ſp.* 2.

Les Indiens de la Guiane l'appellent ARAPAPA. *Barr.*

Elle eſt de la grandeur & de la groſſeur de la précédente. Elle en différe ſeulement en ce qu'elle eſt variée de taches brunes. On la trouve auſſi dans la *Guiane*.

Magnitudine & craſſitie cum præcedente convenit. Ab illo tantùm diſcrepat maculis fuſcis quibus variegatus eſt. In *Guiana* ſimiliter habitat.

2. La Cuilliere brune.

Cochlearius fuscus; capite nigro; ventre candicante variegato; rectricibus fuscis . . . . Cochlearius fuscus.

Cancrofagus major, rostro cochlearis instar excavato, ingluvie magnâ extuberante. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 128.

Tamatia Brasiliensibus dicta. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 208. *hujus icon non satis accurata pag.* 209.

Jonst. Avi. pag. 143. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 59, *sub titulo*, Tamatia alia.

Gallinula aquatica, Tamatia Brasiliensibus dicta Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 238.

Gallinula aquatica, Tamatia Brasiliensibus Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 116. *N°.* 12.

Les François de la Guiane l'appellent Saouakou des bois. *Barr.*

Les Brasiliens, Tamatia. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Barr.*

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Rostrum, quod quindecim circiter linearum latitudinem obtinet, ab ipsius extremitate ad oris angulos usque duos pollices & ampliùs longum est. Caudam habet valdè brevem; pedes eâdem circiter longitudine pollentes ac pedes præcedentis. Caput ipsius obtegunt pennæ nigræ. Quæ guttur, collum, universumque corpus vestiunt, sicut & scapulares, alas superne & infernè cooperientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores, fusco tinguntur colore; in ventre tamen candicantis aliquid admiscetur. Remiges alarum eodem im-

Elle est à peu près de la grandeur de la précédente. Son bec, qui a environ quinze lignes de largeur, a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche plus de deux pouces de long. Sa queue est fort courte. Ses pieds sont à peu près aussi longs que ceux de la précédente. Sa tête est couverte de plumes noires. Celles qui couvrent la gorge, le col & tout le corps, ainsi que les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue, sont brunes; le ventre est cependant varié d'un peu de blanchâtre. Les plumes de l'aîle sont du même brun que le dos. Les plus proches du corps sont

fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes brunes. Les yeux ſont noirs. Le demi-bec ſupérieur eſt de la même couleur; l'inférieur eſt jaunâtre, & garni en-deſſous, comme celui de la précédente, d'une membrane capable d'une grande extenſion. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un verd-jaunâtre; & les ongles noirâtres. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. On la trouve dans *la Guiane* & au *Bréſil.*

buuntur fuſco ac dorſum ipſum tingitur. Corpori viciniores ſunt longiſſimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus fuſcis cauda conflatur. Oculi ſunt nigri. Mandibula ſuperior ſimiliter nigra; inferior flavicans, & præcedentis inſtar, membranâ maximè inflabili ſubtus inſtructa. Pars crurum plumis denudata, pedeſque viridi-flavicantes; ungues verò nigricantes. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque productâ. Habitat in *Guiana* & *Braſilia.*

SECTION X.

Ceux qui ont le bec court, droit & conique vers le bout.

CETTE ſection ne contient encore qu'un ſeul genre, ſçavoir celui de l'*Oiſeau-royal.*

Tous les Oiſeaux de cette ſection ont la tête ornée d'une hupe compoſée de plumes reſſemblantes à des racines de Chiendent.

SECTIO X.

Eæ quæ roſtrum habent breve, rectum, apice conicum.

IN illa ſectione unicum quoque continetur genus, ſcilicet *Balearicæ.*

Omnes hujus ſectionis Alites in capite ornantur corollâ plumis, Graminis radicum æmulis, conflatâ.

LXXXIV.

Genus Balearicæ.

Hujus character est

Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:

Crura in parte inferiore plumis denudata:

Rostrum breve, rectum, apice conicum:

Caput ornatum corollâ plumis, Graminis radicum æmulis, conflatâ.

LXXXIV.

Le genre de l'Oiseau-royal.

Son caractere est d'avoir

Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:

Le bec court, droit & conique vers le bout:

La tête ornée d'une hupe composée de plumes ressemblantes à des racines de Chiendent.

** 1. L'OISEAU-ROYAL.

Voyez la femelle Pl. XLI.

Balearica cinereo-cœrulescens (*mas*) nigricans, ad viride vergens (*fœmina*); vertice splendidè nigro; capite ad latera nudo, candido, rubro adumbrato; tectricibus alarum albis; remigibus minoribus castaneis, majoribus, rectricibusque nigricantibus . . . . BALEARICA.

Grus Balearica. *Jonst. Avi. pag.* 116. *maris & fœminæ icones ab Aldrovando mutuatæ Tab.* 54.

Charlet. Exer. pag. 114. *N°.* 1. *hujus icon satis accurata* (*rostro excepto*) *pag.* 115.

Charlet. Onomazt. pag. 110. *N°.* 1.

Grus Balearica Plinii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 361. *icones non satis accuratæ, maris pag.* 362, *& fœminæ pag.* 363.

Grus Balearica Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 201. *hujus icon satis accurata Tab. XLVIII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 95. *N°.* 3.

Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 314. *N°. I.*

Grus Balearica vel Japonica. *Muf. Besl. pag.* 36. *N°.* 5. *capitis icon minùs accurata Tab. IX. N°.* 5.

Grus Balearia, Aldrovandi, Willughbeji. *Klein. Avi. pag.* 121. *N°.* 3.

Grus Capensis fusca, capite aureo galeato. *Petiv. Gaz. Nat. hujus icon pessima Tab. LXXVI. fig.* 9.

Ciconia. *Moehr. Avi. Gen.* 83.

Ardea crista setosa erecta, temporibus palearibusque binis nudis. Ardea pavonina. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 1.

Struthio ex China, Vischer. *Klein.*

Pavo ex cinereo fuscus, pappo deaurato coronatus. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XII. sp.* 4.

Pavo nigricans, brevicaudus, pappo rariori coronatus. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. XII. sp.* 5. (*fœmina*).

Pavo sine cauda Chinensis. *Jonst. Avi. hujus icon satis accurata* (*exceptis capite & corollâ*) *Tab. XXI.*

Pavo Chinensis sine cauda. *Charlet. Exer. pag.* 80. *N°.* 3. *Charlet. Onomazt. pag.* 72. *N°.* 3.

Pavo cauda brevi. *Linn. Systh. Nat. ed.* 6. *Gen.* 65. *sp.* 2.

Pavo marinus. *Clus. exot. Lib. V. cap. XI. pag.* 105, *in qua capitis icon minùs accurata.*

Oiseau-royal. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. III. pag.* 201; *avec une assez bonne figure Pl.* 28.

Grue panachée de l'Afrique. *Edwards. Tom. IV. pag. CXCII*; *avec des figures assez exactes du mâle & de la femelle Pl.* 192.

Paon. *Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag.* 145; *avec une figure tirée de Jonston pag.* 164. *N°.* 2.

Les Anglois l'appellent CROWNED AFRICAN CRANE. *Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur du *Héron hupé*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds huit pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long; sa queue cinq pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre pouces six lignes; son pied huit pouces dix lignes; celui du milieu des trois doigts

Cum *Ardea cristata* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & novem pollices æquat, & ad extremos ungues tres pedes & octo pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est; cauda quinque pollices; pars crurum plumis denudata quatuor pollices & sex lineas; pes octo pollices & decem lineas; trium digito-

rum

rum anticorum medius cum ungue tres pollices & ſex lineas, extimus duos pollices cum ſeptem lineis, intimus duos pollices & quatuor lineas; poſticus autem unum tantùm pollicem. Alis expanſis, extremitates majorum remigum quinque pedum & ſex pollicum intervallo diſtant, alæ verò complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Capitis verticem, à ſyncipite versùs occipitium uſque, cooperiunt pennæ tactu molliſſimæ, nigræ, holoſerici villoſi inſtar ſplendentes: nigredo autem utrinque ducitur, & ponè utramque genam ſtrictam efficit tæniam, ſub gutture protenſam. Caput ad latera plumis denudatur, & cute ſolummodo obducitur candidâ, in utraque extremitate aliquo rubore adumbratâ. Sub gutture quædam extat membrana carnoſa, rugoſa, eleganti rubedine tincta: quæ in quibuſdam individuis ſatis amplam obtinet craſſitiem, dum eſt in aliis valdè exigua. Ab occipitio copioſus oritur faſcis pennarum, Graminis radices ſatis benè referentium: quæ pennæ quatuor pollicum lon-

antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces ſix lignes, l'extérieur deux pouces ſept lignes, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derriere un pouce ſeulement. Il a cinq pieds ſix pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent environ juſqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Le ſommet de la tête eſt couvert, depuis le ſynciput juſque vers l'occiput, de plumes très-douces au toucher & d'un noir de velours: cette couleur deſcend de chaque côté, & forme derriere chaque joue une bande aſſez étroite, qui s'étend juſque ſous la gorge. Les côtés de la tête ſont dégarnis de plumes, & couverts ſeulement d'une peau blanche, nuancée d'une légere teinte de rouge aux deux extrémités. Sous la gorge eſt une eſpece de membrane charnue, raboteuſe & d'un beau rouge: cette membrane eſt aſſez conſidérablement groſſe dans quelques individus, & fort petite dans d'autres. De l'occiput part un gros faiſceau de plumes, qui reſſemblent aſſez bien à des racines de Chiendent: elles ont juſqu'à quatre pouces de longueur, & forment une belle hupe. Chacune de ces plumes n'eſt autre choſe qu'une tige

roussâtre, fort applatie, contournée en forme de viz, & garnie de quelques barbes très-clair-semées, lesquelles sont blanches vers l'origine de la plume, & noires dans le reste de sa longueur. Le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un cendré-bleuâtre dans le *mâle*, & d'un noirâtre tirant sur le verd dans la *femelle*. Les plumes qui couvrent le col, surtout celles dont il est garni dans le bas de sa partie inférieure, sont très-longues, très-étroites, se terminent en pointe, & retombent sur la poitrine : car quelques-unes ont jusqu'à sept pouces de longueur. Toutes les couvertures du dessous des aîles, ainsi que les petites du dessus, sont blanches : les grandes du dessus les plus proches du corps sont roussâtres : & les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur : les moyennes sont de couleur de marron. De ces dernieres, les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plu-

gitudinem obtinent, elegantemque cristam efformant. Ex istis autem pennis quælibet scapo constat rufescente, valdè plano, spiræ in modum intorto, & quibusdam pinnulis rarissimis, versùs pennæ exortum candidis, in reliqua longitudine nigris, obsito. Collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, tectricesque caudæ superiores & inferiores in *mare* ex cinereo cœrulescunt, in *fœmina* verò nigricant, & ad viride vergunt. Pennæ collum obtegentes, istæ præsertim quibus obsita est colli inferioris pars infima, sunt longissimæ, strictissimæ, in acumen desinentes & pectori incumbentes : quædam enim septem pollicum longitudine pollent. Tectrices alarum inferiores omnes, sicut & superiores minores, albent : superiores majores corpori finitimæ rufescunt : majores à corpore remotiores nigricant. Remiges majores sunt quoque nigricantes : minores castaneo imbutæ colore. Ex minoribus autem corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complica-

Dessiné et Gravé par Martinet

Oiseau-Royal, femelle.

tur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus nigricantibus cauda conflatur. Oculorum irides eleganter cinereo-albæ. Roſtrum griſeo-fuſcum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque cinereo-nigricantes; ungues verè penitùs nigricant. Habitat in *Africa* & *Balearibus Inſulis. Ex Muſeo Reaumuriano.*

mes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes noirâtres. L'iris des yeux eſt d'un joli gris-blanc. Le bec eſt d'un gris-brun. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un cendré-noirâtre; & les ongles noirâtres. On le trouve en *Afrique* & dans les *Iſles Baléares. Du cabinet de M. de Reaumur.*

SECTIO XI.

Eæ quæ roſtrum habent conico-incurvum.

HÆC ſectio binis conflatur generibus Avium, alis à ſe invicem diſcrepantium. Aliæ enim alis donantur inermibus, ut *Cariama*: aliæ alis corniculis ſive calcaribus binis in parte anteriore armatis præditæ ſunt, ut *Anhima.*

Hujus noviſſimi generis Aves corniculum cylindraceum antrorſum arcuatum in fronte gerunt.

SECTION XI.

Ceux qui ont le bec en cone courbé.

IL y a dans cette ſection deux genres d'Oiſeaux, qui ſe diſtinguent entr'eux par leurs aîles. Les uns ont les aîles ſans armes, comme le *Cariama*: & les autres ont les aîles armées de deux eſpeces de cornes ou d'éperons placés dans la partie antérieure, comme le *Kamichy.*

Les Oiſeaux de ce dernier genre portent ſur le front une petite corne cylindrique & courbée en arc en-avant.

LXXXV.

Le genre du Cariama. (1).

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec en cone courbé :
Les aîles point armées.

(1) *Cariama*, nom que les *Brasiliens* donnent à l'espece de ce genre.

LXXXV.

Genus Cariamæ. (1).

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti ; tres scilicet antici, posticus unus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Rostrum conico-incurvum :
Alæ inermes.

(1) *Cariama*, nomen hujus generis speciei à *Brasiliensibus* inditum.

1. Le Cariama.

Cariama cristata, grisea, fusco & rufescente varia; cristâ nigrâ, cinereo variegatâ ; remigibus majoribus, rectricibusque fuscis, grisco & rufescente variegatis . . . . . . Cariama.

Cariama *Pison. Hist. Nat. pag.* 81, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata*

Cariama Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 203, *in qua hujus icon non satis accurata.*

Jonst. Avi. pag. 138. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 59.

Cariama Brasiliensibus Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 202. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LI.*

Raj. Syn. Avi. pag. 96. *N°.* 6.

Les Brasiliens l'appellent Cariama. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Il est à peu près de la grandeur du *Héron*. Son bec est court : ses jambes & ses pieds sont fort longs, ainsi que ses doigts ; il faut cependant en excepter celui de derriere, qui est court & placé plus haut que

Ardeam magnitudine circiter adæquat. Rostrum habet breve : crura & pedes, sicut & digitos, longissimos; attamen excipiendus est posticus digitus, qui brevis est, & altiùs quàm in *Ardeis*

collocatus; ita ut, ambulando, tribus tantùm digitis anterioribus incedat. Crura sunt per mediam ipsarum longitudinem plumis denudata. Trium digitorum anticorum medius duobus digitis lateralibus coadunatur membranâ ad primum circiter articulum usque productâ. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non multùm protenduntur. In syncipite, immediatè supra rostri exortum, erigitur crista pennis conflata nigris, cinereo variis. Caput, guttur, collum, universumque corpus obtegunt pennæ griseæ, fusco & pauco rufescente variegatæ. Scapulares, quæ alas superne & infernè cooperiunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Alarum remiges majores tingit color fuscus, rufescente & griseo variegatus: minores eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur. Ex minoribus autem corpori viciniores maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt rectrices fuscæ, griseo & rufescente variegatæ. Oculorum pupilla nigra: ipsorum

dans les *Hérons*; de façon qu'en marchant il ne s'appuye que sur les trois doigts de devant. Les jambes sont dégarnies de plumes dans la moitié de leur longueur. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec les deux latéraux par une membrane, qui s'étend environ jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origne de la queue. Sur le synciput, immédiatement au-dessus de l'origine du bec, s'éleve une hupe composée de plumes noires, variées de cendré. La tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes grises, variées de brun & d'un peu de roussâtre. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un brun varié de roussâtre & de gris: les moyennes sont de la même couleur que le dos. De ces dernieres, les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de plumes brunes, variées de gris & de

roussâtre. La prunelle des yeux est noire : leur iris est de couleur d'or. Le bec est d'un jaunâtre rembruni. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune obscur ; & les ongles bruns. On le trouve au *Bresil*.

irides aureo colore imbutæ. Rostrum ex flavicante fuscescit. Pars crurum plumis denudata, pedesque sunt obscurè flavi ; ungues verò fusci. Habitat in *Brasilia*.

LXXXVI.

Le Genre du Kamichy. (1).

Son caractere est d'avoir

Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere :

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :

Le bec en cone courbé :

Une petite corne cylindrique & courbée en arc en-avant sur le front :

Les aîles armées de deux especes de cornes ou d'éperons dans la partie antérieure.

(1) *Kamichy*, nom que les habitans de *la Guiane* donnent à l'espece de ce genre.

LXXXVI.

Genus Anhimæ. (1).

Hujus character est

Digiti quatuor, membranis destituti ; tres scilicet antici, posticus unus :

Crura in parte inferiore plumis denudata :

Rostrum conico-incurvum :

Corniculum cylindraceum antrorsum arcuatum in fronte :

Alæ corniculis sive calcaribus binis in parte anteriore armatæ.

(1) *Anhima*, nomen hujus generis speciei à *Brasiliensibus* inditum.

** 1. LE KAMICHY.

Anhima nigricans, albo variegata ; vertice ex albo & nigro vario ; collo infimo & pectore cinereo, albo & nigro variegatis ; ventre albo ; remigibus, rectricibusque nigricantibus . . . . ANHIMA.

Anhima Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 215, *in qua hujus icon satis accurata* (*rostro excepto*).
Jonst. Avi. pag. 147. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 61.

Anhima Brasiliensium Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 202. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XLVII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 96. N°. 7.

Anhyma. *Pison. Hist. Nat. pag.* 91, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*

Aquila Americana, nigra, aquatica, maxima, cornuta. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. IV. sp.* 4.

Aquila aquatica, cornuta. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 124.

Avis quædam ex rapacibus. *Jonst. Avi. pag.* 125.

Palamedæa. *Moehr. Avi. Gen.* 111.

Bambiaya. *Joan. de Laët. Nov. orb. pag.* 13.

Cahuitahu. *Comdam. Voy. des Amazo. pag.* 174.

Les Habitans de la Guiane l'appellent KAMICHY. *Barr.*

Les Brasiliens ANHIMA. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.* CAHUITAHU. *Comdam.*

Cignum crassitie paululùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes duos pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues tres pedes & quatuor pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & tres lineas longum est; cauda decem pollices; pars crurum plumis denudata duos pollices; pes quinque pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & sex lineas, extimus tres pollices cum sex lineis, intimus tres pollices & quatuor lineas; posticus autem unum pollicem cum decem lineis. Alis expansis, extremitates majorum remigum quinque pedum & decem pollicum in-

Il est un peu plus gros qu'un *Cigne*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds deux pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds quatre pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces trois lignes de long; sa queue dix pouces; la partie de ses jambes, qui est dégarnie de plumes, deux pouces; son pied cinq pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces six lignes, l'extérieur trois pouces six lignes, l'intérieur trois pouces quatre lignes; & celui de derriere un pouce dix lignes. Il a cinq pieds dix pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur

de la queue. Sur le bord de chaque aile, un peu au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, sont deux especes de cornes ou d'éperons, gros comme le bout du petit doigt, dont le supérieur est long d'un pouce, & l'inférieur de neuf lignes seulement : ils ont à peu près la figure d'une pyramide triangulaire, dont le sommet est un peu obtus ; & sont d'un gris-brun. La petite corne cylindrique qu'il porte sur le front, a deux pouces trois lignes de longueur, environ deux lignes de diametre, & est blanchâtre. Le sommet de la tête est varié de blanc & de noir. Le reste de la tête, la partie du col qui en est la plus voisine, & la gorge sont noirâtres. La partie du col qui est la plus proche du corps, & la poitrine sont variées de cendré, de blanc & de noir. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, celles du dessus de la queue, le haut des jambes & les côtés sont noirâtres, & variés d'un peu de blanc. Le ventre est entiérement blanc, ainsi que les couvertures du dessous de la queue. Le bord de l'aîle, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est varié de blanc-roussâtre. Les plumes de

tervallo distant ; alæ verò complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem extenduntur. In utriusque alæ margine, paulò infra articulum carpo humano respondentem, bina extant cornicula sive calcaria, minimi digiti extremitatis crassitie æmula, quorum superius pollicis unius longitudinem æquat, inferius verò novem tantùm lineas longum est : quæ calcaria figuram pyramidalem triangularem, apice nonnihil obtuso donatam, circiter æmulantur ; & grisco-fusco colore imbuuntur. Corniculum cylindraceum quod in fronte gerit, duos pollices & tres lineas longum est, ipsiusque diameter binas circiter lineas æquat : candicante imbuitur colore. Summum caput albo & nigro variegatur. Reliquum caput, pars colli ipsi finitima, gutturque nigricant. Pars colli corpori vicinior & pectus cinereo, albo & nigro variegantur. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne & infernè cooperientes, superiores caudæ tectrices, crurum suprema pars & latera nigricant, & pauco albo variegantur. Venter & inferio-

res caudæ tectrices penitùs albicant. Alarum margines, infra articulum carpo humano respondentem, sunt albo-rufescente variæ. Remiges nigricantes. Duodecim rectricibus concoloribus cauda conflatur. Palpebræ, oculorumque pupilla nigræ: ipsorum irides aureo colore imbutæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusci; ungues verò nigricantes. Semper mas & fœmina junctim incedunt. E luto nidum construunt, illumque ad caudices arborum super terram ædificant. Habitant in *Brasilia* & *Guiana*. Una à *Cayana* in *museum Realmurianum* missa est à *D. Artur.*

l'aile sont noirâtres. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Les paupieres & la prunelle des yeux sont noires: leur iris est de couleur d'or. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont bruns; & les ongles noirâtres. On trouve toujours le mâle & la femelle ensemble. Ils construisent leur nid avec de la boue, & le placent par terre au pied des arbres. On les trouve au *Brésil* & dans *la Guiane*. *M. de Reaumur* en a reçu un de *Cayenne*, qui lui a été envoyé par *M. Artur.*

SECTIO XII.

Eæ quæ rostrum habent conicum, lateraliter compressum.

IN illa sectione unicum continetur genus, scilicet *Porphyrionis.*

Omnes hujus generis Aves calvitio in fronte donantur.

SECTION XII.

Ceux qui ont le bec en cone applati par les côtés.

CETTE section ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui de la *Poule-sultane.*

Tous les Oiseaux de ce genre ont le front chauve.

LXXXVII.

Le genre de la Poule-Sultane.

Son caractere est d'avoir

Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere :

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :

Le bec en cone applati par les côtés :

Le front chauve.

LXXXVII.

Genus Porphyrionis.

Hujus character est

Digiti quatuor, membranis destituti ; tres scilicet antici, posticus unus :

Crura in parte inferiore plumis denudata :

Rostrum conicum, lateraliter compressum :

Calvitium in fronte.

** 1. La Poule-Sultane.

Voyez Pl. XLII. Fig. 1.

Porphyrio superne obscurè viridis, infernè splendidè violaceus ; calvitio in fronte saturatè rubro ; capite & collo superioribus splendidè violaceis ; genis, gutture & collo inferiore cœruleo-violaceis ; tectricibus caudæ inferioribus albis ; rectricibus obscurè viridibus . . . . Porphyrio.

Porphyrio cœsius, pedibus & rostro sanguineis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXIV. sp.* 3.

Porphyrio. *Gesn. Avi. pag.* 716. *hujus icon satis accurata* (*exceptis pedibus*) *pag.* 717.

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 437. *hujus icones minimè accuratæ pag.* 439 & 440.

Clus. Exot. Auctuar. pag. 370.

Willugh. Ornith. pag. 238.

Raj. Syn. Avi. pag. 116. *N°.* 13.

Porphyrion. *Gesn. icon. Avi. pag.* 126, *in qua hujus icon satis accurata* (*exceptis pedibus*).

Jonst. Avi. pag. 106. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 52.

Charlet. Exer. pag. 110. *N°. VI.*

Charlet. Onomazt. pag. 104. *N°. VI.*

Rallus aquaticus, rostro, fronte, pedibusque rubris ; reliquo corpore cyaneo, sub cauda plumis albis. *Klein. Avi. pag.* 104. *N°.* 6.

Fulica fronte calva, corpore violaceo, digitis simplicibus. Porphyrio. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 82. *sp.* 3.

Quachilton. *Eus. Nieremb. pag.* 217.

Quachilton, seu Avis siliquastrini capitis. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag.* 20. *cap. XXVI.*

Quachilto, seu Avis siliquastrini capitis. *Jonst. Avi. pag.* 127.

Quachilto, sive Porphyrio Americanus Nierembergii. *Willugh. Ornith. pag.* 238.

Quachilto, sive Porphyrio Americanus Hernandezii, Nierembergii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 116. *N°.* 14.

Porphyrio. *Bel. Hist. Nat. des Ois. pag.* 226.

Bel. Portr. d'Ois. pag. 52 *a, dans laquelle il y a une mauvaise figure.*

Oiseau pourpré ou Porphyrion. *Alb. Tom. III. pag.* 35; *avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl.* 84.

Poule-Sultane. *Hist. de l'Acad. Tom III. Part. III. pag.* 51; *avec une figure assez exacte Pl.* 11[illegible]

Poule-Sultane ou Bluet. *Edwards. Tom. II. pag. LXXXVII*; *avec une figure exacte Pl.* 87.

Les Grecs l'appellent Πορφυρίων. *Bel. Aldrov.*

Les Espagnols, TELAMON. *Gesn. Aldrov. Jonst.* CALAMON. *Aldrov.*

Les Catalans, PORC MARI. *Barr.*

Les Allemands, PURPUR-VOGEL; FREMBDER-VOGEL. *Gesn.*

Les Mexiquains, QUACHILTON. *Fern. & quelques-uns*, YACACINTLI. *Nieremb. Fern. Jonst. Willugh.*

Cum *Gallina* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem quinque pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem undecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & septem lineas longum est; cauda tres pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum septem lineis; pes tres polli-

Elle est à peu près de la grosseur d'une *Poule*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long; sa queue trois pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce sept lignes; son pied trois pouces cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec

l'ongle, quatre pouces cinq lignes, l'extérieur trois pouces sept lignes, l'intérieur trois pouces quatre lignes & demie; & celui de derriere deux pouces trois lignes. Tous ses doigts sont entiérement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a deux pieds quatre pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le front, depuis l'origine du bec jusqu'au milieu du sommet de la tête, est chauve, & couvert d'une membrane épaisse d'un rouge foncé. Le reste du dessus de la tête & la partie supérieure du col sont d'un violet brillant. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd sombre, mais brillant. Les côtés de la tête ou les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un bleu-violet. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont d'un violet éclatant. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Les petites du dessous des aîles sont d'un violet brillant: les grandes sont d'un cendré-noirâtre. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un

ces & quinque lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices cum quinque lineis, extimus tres pollices & septem lineas, intimus tres pollices & quatuor cum semi lineas; posticus autem duos pollices cum tribus lineis. Omnes digiti sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum quatuor pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Frons, ab exortu rostri ad capitis medium verticem usque, calva est, & membranâ crassâ saturatè rubrâ obducitur. Reliquum caput superius, collumque superius sunt splendidè violacea. Dorsum, uropygium, scapulares pennas & superiores caudæ tectrices tingit color viridis obscurus quidem, sed splendens. Caput ad latera sive genæ, guttur & pars colli inferior sunt cœruleo-violaceæ. Pectus, venter, crurum suprema pars & latera violaceo imbuuntur splendido. Pennæ caudam subtus obtegentes albæ. Inferiores alarum tectrices mi-

nores splendidè violaceæ : majores cinereo-nigricantes. Superiores alarum minores, sicut & majores corpori viciniores, splendidè violaceæ : majores à corpore remotiores in latere exteriore & apice concolores, in latere interiore fusco-nigricantes : ex majoribus corpori finitimis quædam insuper eodem imbuuntur viridi ac dorsum ipsum tingitur. Alam componunt viginti tres remiges, omnes subtus cinereo-nigricantes ; superne verò septemdecim primores sunt in latere exteriore splendidè violaceæ, in interiore fusco-nigricantes : decima octava & decima nona concolores, sed exteriùs aliquâ viridis tincturâ adumbratæ : quatuor corpori finitimæ virides obscurè quidem, sed, dorsi instar, splendentes. Duodecim rectricibus valdè obscurè viridibus cauda conflatur. Binæ intermediæ lateralium longitudinem nonnihil excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. Oculi sunt nigri : ipsorum irides fulvæ. Rostrum saturatè rubrum. Pars cru-

violet éclatant : les grandes les plus éloignées du corps sont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & d'un brun-noirâtre du côté intérieur : de plus quelques-unes des grandes les plus proches du corps sont du même verd que le dos. L'aile est composée de vingt-trois plumes, toutes d'un cendré-noirâtre en-dessous ; mais en-dessus les dix-sept premieres sont d'un violet éclatant du côté extérieur, & d'un brun-noirâtre du côté intérieur : la dix-huitiéme & la dix-neuviéme sont de la même couleur ; mais leur côté extérieur est nuancé d'une légere teinte de verd : les quatre plus proches du corps sont d'un verd sombre, mais brillant, comme celui du dos. La queue est composée de douze plumes d'un verd très-sombre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les yeux sont noirs : & leur iris est fauve. Le bec est d'un rouge foncé. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont rouges. On la trouve dans les *Indes Orientales*, & en différens endroits

de l'*Amérique*, sous la Zone torride. Elle a été envoyée de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. Artur.*

rum plumis denudata, pedes, unguesque rubri. Habitat in *India Orientali* & variis *Americæ* regionibus sub Zona torrida positis. A *Cayana* in *museum Realmurianum* missus à *D. Artur.*

A. *LA POULE-SULTANE A TÊSTE NOIRE.*

Porphyrio melanocephalos.

Poule ou Gallinula palustris. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag.* 288. (*ed.* 1725).

Elle est de la même grandeur & de la même grosseur que la précédente. Elle lui ressemble aussi par sa couleur; & n'en différe que parce qu'elle a la tête noire. On la trouve en *Amérique.*

Magnitudine & crassitie præcedentem æmulatur. Cum illo colore quoque convenit; & ab eo non discrepat nisi capite nigro. Habitat in *America.*

** 2. LA PETITE POULE-SULTANE.

Voyez Pl. XLII. Fig. 2.

Porphyrio superne obscurè viridis, infernè splendidè violaceus; calvitio in fronte rubro; capite splendidè violaceo; collo superiore viridi-cœruleo; tectricibus caudæ inferioribus albis; rectricibus obscurè viridibus.... PORPHYRIO MINOR.

Elle est à peu près de la grosseur de la *Barge.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de qua-

Crassitie *Limosam* circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & decem lineas explet, & ad extremos ungues qua-

tuordecim pollices & undecim lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tredecim cum ſemi lineas longum eſt; cauda duos pollices & undecim lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & novem lineas, extimus duos pollices cum tribus lineis, intimus viginti quinque lineas; poſticus autem unum pollicem & ſeptem lineas. Omnes digiti ſunt à ſe invicem ad exortum uſque diſcreti. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt unius pedis & ſeptem pollicum ; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Frons, ab exortu roſtri ad capitis medium verticem uſque, calva eſt, & membranâ craſſiſſimâ rubrâ obducta. Reliquum caput, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, crurum ſuprema pars & latera ſplendido imbuuntur violaceo. Collum ſuperiùs & ad latera viride, ſplendidiſſimo cœruleo adumbratum. Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, ſuperioreſque caudæ tectrices obſcurè quidem , ſed

torze pouces onze lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; ſa queue deux pouces onze lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes , quinze lignes; ſon pied deux pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes, l'extérieur deux pouces trois lignes, l'intérieur deux pouces une ligne; & celui de derriere un pouce ſept lignes. Tous ſes doigts ſont entiérement ſéparés les uns des autres *juſqu'à* leur origine. Elle a un pied ſept pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Le front, depuis l'origine du bec juſqu'au milieu du ſommet de la tête, eſt chauve, & couvert d'une membrane rouge fort épaiſſe. Le reſte de la tête, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés ſont d'un violet éclatant. La partie ſupérieure & les côtés du col ſont d'un verd nuancé de bleu fort brillant. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un verd ſombre, mais brillant. Les couvertures du deſſous de la

queue ſont blanches. Les petites du deſſous des aîles ſont d'un bleu-violet, nuancé de verd : les grandes ſont cendrées ; & dans quelques individus elles ſont bordées de blanchâtre par le bout. Les plus petites couvertures du deſſus des aîles ſont d'un verd-bleu : les moyennes, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont d'un verd ſombre, mais brillant ; les grandes les plus éloignées du corps ſont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & brunes du côté intérieur. L'aîle eſt compoſée de vingt-trois plumes, toutes cendrées en-deſſous ; mais en-deſſus les dix-huit premieres ſont d'un verd nuancé de bleu du côté extérieur, & brunes du côté intérieur : les cinq plus proches du corps ſont d'un verd ſombre, mais brillant, comme celui du dos. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un verd ſombre. Les deux du milieu ſont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés juſqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui eſt la plus courte. Le bec eſt rouge depuis ſon origine juſque vers les deux tiers de ſa longueur ; le reſte eſt jaune. La partie des jambes

ſplendidè virides. Pennæ caudam ſubtus obtegentes albæ. Tectrices alarum inferiores minores cœruleo-violaceæ, viridi adumbratæ : majores cinereæ, & in quibuſdam individuis candicante in apice marginatæ. Superiores alarum minimæ viridi-cœruleæ : mediæ, ſicut & majores corpori viciniores, obſcurè quidem, ſed ſplendidè virides : majores à corpore remotiores in latere exteriore & apice concolores, in latere interiore fuſcæ. Alam componunt viginti tres remiges, omnes ſubtus cinereæ ; ſuperne verò octodecim primores ſunt in latere exteriore virides, cœruleo adumbratæ, in interiore fuſcæ : quinque corpori finitimæ obſcurè virides ; ſed, dorſi inſtar, ſplendentes. Duodecim rectricibus obſcurè viridibus cauda conſtat. Binæ intermediæ lateralium longitudinem nonnihil antecellunt ; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam uſque breviorem. Roſtrum ab ipſius exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes uſque rubrum, inde ad apicem luteum. Pars crurum plumis denudata, pedes,

pedes, unguesque rubri. Præcedentis instar, in *India Orientali* & *America* habitat. A *Cayana* in *museum Realmurianum* missus est à *D. Artur.*

qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont rouges. On la trouve, comme la précédente, dans les *Indes Orientales* & en *Amérique*. Elle a été envoyée de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

3. LA POULE-SULTANE VERTE.

Porphyrio superne obscurè viridis, infernè albus; calvitio in fronte viridi-flavicante; genis candidis; rectricibus obscurè viridibus . . . PORPHYRIO VIRIDIS.

An Porphyrio olivarius, pedibus leucophæis? *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXIV. sp. 7.*

Les Catalans l'appellent RASCLET. *Barr.*

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & quinque lineas longum est; cauda duos pollices & novem lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & novem lineas, extimus duos pollices cum quatuor lineis, intimus duos pollices & tres lineas; posticus autem oc-

Elle n'est pas tout-à-fait si grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; sa queue deux pouces neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes; son pied deux pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes, l'extérieur deux pouces quatre lignes, l'intérieur deux pouces trois lignes; & celui de derriere un pouce six lignes.

Tous ſes doigts ſont entiérement ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. Elle a un pied ſix pouces de vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Le front, depuis l'origine du bec juſque vers le milieu du ſommet de la tête, eſt chauve, & couvert d'une membrane épaiſſe d'un verd-jaunâtre. Le reſte du deſſus de la tête, la partie ſupérieure du col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un verd ſombre, mais brillant. Les côtés de la tête ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue, celles du deſſous des aîles & les côtés ſont blancs. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont du même verd que le dos : les grandes les plus éloignées du corps ſont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & d'un cendré-brun du côté intérieur. L'aîle eſt compoſée de vingt-trois plumes, toutes cendrées en-deſſous ; mais en-deſſus les dix-huit premieres ſont d'un verd ſombre, mais brillant, du

todecim lineas. Omnes digiti ſunt à ſe invicem ad exortum uſque diſcreti. Alis expanſis, extremitates majorum remigum unius pedis & ſex pollicum intervallo diſtant, alæ verò complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. Frons, ab exortu roſtri ad capitis medium verticem uſque, calva eſt, & membranâ craſſâ viridi-flavicante obducta. Reliquum caput ſuperius, pars colli ſuperior, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares & ſuperiores caudæ tectrices ſunt obſcurè quidem, ſed ſplendidè virides. Caput ad latera ſive genæ, guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas ſubtus obtegentes albent. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur viridi ac dorſum ipſum tingitur : majores à corpore remotiores ſunt in latere exteriore & apice eodem colore imbutæ, interiùs verò cinereo-fuſcæ. Alam componunt viginti tres remiges, omnes ſubtus cinereæ ; ſuperne verò octodecim primores ſunt in la-

tere exteriore obscurè quidem, sed splendidè virides, in interiore cinereo-fuscæ: quinque corpori finitimæ in utroque latere eodem viridi imbutæ ac dorsum ipsum tingitur. Caudam componunt duodecim rectrices obscurè virides. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. Rostrum ex viridi flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedesque griseo-flavescentes; ungues verò grisei. Habitat in *India Orientali*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Bourgine.*

côté extérieur, & d'un cendré-brun du côté intérieur : les cinq plus proches du corps sont des deux côtés du même verd que le dos. La queue est composée de douze plumes d'un verd sombre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un verd-jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes & les pieds sont d'un gris-jaunâtre; & les ongles gris. On la trouve dans les *Indes Orientales*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Bourgine.*

4. LA POULE-SULTANE BRUNE.

Porphyrio superne fuscus, infernè albus; calvitio in fronte viridi-flavicante; genis candidis; rectricibus fuscis . . . . PORPHYRIO FUSCUS.

Glottis. *Gesn. icon. Avi. pag.* 105, *in qua hujus icon pessima.*
Gallinulæ aquaticæ secundum genus, quod Glutt nominant, quasi Glottidem. *Gesn. Avi. pag.* 505, *in qua eadem icon.*
Gallinula Chloropos Ornithologi, quam apud Germanos Glutt, quasi Glottidem vocari ait. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 452, *in qua hujus icon à Gesnero mutuata.*
Gallinula Chloropus tertia. *Jonst. Avi. pag.* 110.
Porphyrio olivarius, pedibus & rostro viridibus. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXIV. sp.* 1.
Les Catalans l'appellent GALLINA SEGA; PULLA D'AIGUA. *Barr.*
Les Allemands aux environs de Strasbourg, GLUTT. *Gesn. Aldrov. Jonst.*

Elle eſt à peu près de la groſſeur & de la grandeur de la précédente. Son front eſt chauve, & couvert d'une membrane épaiſſe d'un verd-jaunâtre. Le reſte du deſſus de la tête, la partie ſupérieure du col, le dos & le croupion ſont couverts de plumes brunes. Les ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur. Les côtés de la tête ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont blancs. Les couvertures du deſſus des aîles ſont brunes, & variées à leur extrémité d'un peu de blanc. Les plumes de l'aîle ſont entiérement brunes. La queue eſt compoſée de douze plumes de la même couleur. Le bec eſt noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un verd-jaunâtre ; & les ongles gris. Tous les doigts ſont entiérement ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. On la trouve en *Allemagne* ſur les bords des lacs & des étangs.

Magnitudine & craſſitie præcedentem circiter æquat. Frons ipſius calva eſt, & membranâ craſſâ viridi-flavicante obducta. Reliquum caput ſuperius, partem colli ſuperiorem, dorſum & uropygium veſtiunt pennæ fuſcæ. Scapulares & ſuperiores caudæ tectrices concolores. Caput ad latus, ſive genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars & pennæ caudam ſubtus obtegentes albicant. Superiores alarum tectrices ſunt fuſcæ, pauco albo in extremitate variegatæ. Remiges penitùs fuſcæ. Duodecim rectricibus concoloribus cauda conflatur. Roſtrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque viridi-flavicantes ; ungues verò griſei. Omnes digiti ſunt à ſe invicem ad exortum uſque directi. Habitat in *Germania*, ibique lacuum & piſcinarum ripas frequentat.

5. La Poule-Sultane roussatre.

Porphyrio superne fuscus, marginibus pennarum rufescentibus, infernè rufescens; calvitio in fronte viridi-flavicante; rectricibus fuscis, exterius & apice rufescente marginatis....

Porphyrio rufescens.

Gallinula terrestris. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 495, *in qua hujus icon à Gesnero mutuata.*
Jonst. Avi. pag. 111. *hujus icon à Gesnero mutuata Tab.* 31.
Gallinula terrestris Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 236.
Gallinula terrestris, quæ vulgò Germanis Hegeschara dicitur. *Gesn. Avi pag.* 496. *hujus icon non satis accurata pag.* 497.
Trochilus terrestris, vel Rallus terrenus. *Gesn. icon. Avi. pag.* 68, *in qua eadem icon.*
Les Italiens aux environs du Lac Majeur l'appellent Polle. *Gesn. Aldrov. Jonst. Willugh.*
Les Allemands, Heggeschaer *ou* Heggschaer; Eggenschaer. *Gesn.* Heggeschar; Hegesar; Eggenschar. *Aldrov. Willugh. & quelques-uns*, Grosz Wasser Heunle. *Gesn.* Grosse Wasser Hunle. *Aldrov. Willugh.*

Præcedentes magnitudine & crassitie circiter æmulatur. Frons ipsius calva est, & membranâ crassâ viridiflavicante obducta. Reliquum caput, collum superius, dorsum & uropygium pennis vestiuntur fuscis, rufescente marginatis. Scapulares, alas superne coopetientes & superiores caudæ tectrices concolores. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crurum partem supremam, inferioresque caudæ tectrices tingit color rufes-

Elle est à peu près de la grosseur & de la grandeur des précédentes. Son front est chauve, & couvert d'une membrane épaisse d'un verd jaunâtre. Le reste de la tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes, bordées de roussâtre. Les scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la

queue ſont rouſſâtres. Les plumes de l'aîle ſont brunes, & bordées extérieurement de rouſſâtre. La queue eſt compoſée de douze plumes brunes, bordées pareillement de rouſſâtre extérieurement & par le bout. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un verd-jaunâtre; & les ongles gris. Tous les doigts, qui ſont extrêmement longs, ſont entiérement ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. On la trouve en *Allemagne*.

cens. Alarum remiges ſunt fuſcæ, exteriùs rufeſcente fimbriatæ. Cauda duodecim conſtat rectricibus fuſcis, rufeſcente ſimiliter in latere exteriore & inſuper apice marginatis. Roſtrum, [illegible] crurum plumis denudata, pedeſque ex viridi flaveſcant; ungues vero ſunt griſei. Digiti omnes, qui quidem longiſſimi, ſunt à ſe invicem ad exortum uſque diſcreti. Habitat in *Germania*.

6. La Poule-Sultane rousse.

Porphyrio ſuperne rufus, maculis nigricantibus varius, infernè albus; calvitio in fronte pallidè flavo; palpebris croceis; pennis baſim roſtri ambientibus, & genis candidis; rectricibus rufis, nigricante maculatis . . . . Porphyrio rufus.

Ochropus magnus. *Geſn. icon. Avi. pag.* 103, *in qua hujus icon peſſima.*
Gallinulæ aquaticæ quartum genus, Schmirring dictum, nobis Ochropus magnus. *Geſn. Avi. pag.* 507, *in qua eadem icon.*
Gallinula Ochropus major. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 461. *hujus icon à Geſnero mutuata pag.* 462.
Jonſt. Avi. pag. 110.
Gallinula Ochropus major Geſnero, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 236.
Raj. Syn. Avi. pag. 115. *N°.* 6.
Gallinula aquatica Ornithologis; Trochilus junio; aliis Glareola. *Rzac. Hiſt. nat. Pol. pag.* 281.
Gallinula aquatica quarta Geſneri; Ochropus magnus ejuſdem; Glareola tertia Schwenckfeldii. *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag.* 380.
Glareola tertia. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 281.
Glareola tertia Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 2.
Les Allemands l'appellent Wasser-hun. *Rzac.* Geel-feussel. *Schwenck.*

Les Allemands aux environs de Strasbourg, SCHMIRRING. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Willugh. Rzac.*

Les Polonois, KOKOSZKA WODNA. *Rzac.*

Præcedenti multùm crassitie cedit. Frons ipsius calva est, & membranâ crassâ pallidè luteâ obducta. Reliquum caput superius, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt rufæ, maculis nigricantibus variæ. Pennæ basim rostri ambientes, caput ad latera seu genæ, guttur, pectus, venter, latera, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes albent. Superiores alarum tectrices minores sunt rufæ, maculis nigricantibus, pauco cinereo-fusco admixto, variegatæ, & rubricæ fabrilis colore in apice fimbriatæ : majores à corpore remotiores concolores : majores corpori finitimæ candidæ. Remiges alarum nigræ. Caudam componunt duodecim rectrices rufæ, nigricante maculatæ. Palpebræ sunt croceo colore imbutæ. Rostrum ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque pallidè luteum, in reliqua longitudine nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque pallidè lutei ; un-

Elle est beaucoup plus petite que la précédente. Son front est chauve, & couvert d'une membrane épaisse d'un jaune pâle. Le reste du dessus de la tête, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un roux varié de taches noirâtres. Les plumes qui entourent la base du bec, les côtés de la tête ou les joues, la gorge, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus des aîles sont rousses, variées de taches noirâtres & d'un peu de cendré-brun, & bordées d'un rouge de brique par le bout : les grandes les plus éloignées du corps sont de la même couleur : les grandes les plus proches du corps sont blanches. Les plumes de l'aîle sont noires. La queue est composée de douze plumes rousses, tachetées de noirâtre. Les paupieres sont de couleur de safran. Le bec est d'un jaune pâle depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur ; le reste est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un

jaune pâle ; & les ongles noirâtres. Tout ses doigts sont entiérement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. On la trouve en *Allemagne*.

gues verò nigricantes. Digiti omnes sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Habitat in *Germania*.

7. La Poule-Sultane mouchetée.

Porphyrio superne fusco-rufescens, maculis partim nigris partim candidis aspersus, infernè fuscus, calvitio in fronte obscurè flavo ; pennis basim rostri ambientibus, genis, gutture & collo inferiore albis ; rectricibus binis intermediis nigris, albo terminatis ; lateralibus fuscis . . . . PORPHYRIO PUNCTULATUS.

Glareola nona. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 284.
Glareola nona Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 8.
Erythra. *Gesn. icon. Avi. pag.* 108, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Erythra, quam Germani Mattkern dicunt. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 466. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 467.
Gallinulæ aquaticæ nonum genus quod Erythram nuncupo : vulgus Mattkern. *Gesn. Avi. pag.* 512, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Gallinula Erythra. *Jonst. Avi. pag.* 110. *hujus icon à Gesnero mutuata Tab.* 31.
Gallinula Erythra Gesneri, quam Germani Matkern vocant. *Raj. Syn. Avi. pag.* 109. *N°.* 10.
Gallinula novalis minor. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 281.
Matkneltzell Leonardi Baltneri. *Willugh. Ornith. pag.* 226. *hujus icon minimè accurata Tab. LVI.*
Cenchramus nonnullis. *Schwenck.*
Les Allemands l'appellent REIN-VOGEL. *Gesn. Aldrov.* BRACH-VOGEL. *Rzac.* KLEIN BRACH-VOGEL. *Schwenck.*
Les Allemands aux environs de Strasbourg, MATTKERN. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Willugh.*
Les Polonois, SIEWNICZKA ; SIEWKA ; SIEYKA. *Rzac.*

Elle est à peu près de la grosseur du *Râle de Genet*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces. La partie de ses jambes qui est dégarnie de plu-

Cum *Rallo Genistarum* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices æquat. Pars crurum plumis denudata, pedesque,

pedesque, simul commensurati, septem pollicum longitudinem obtinent. Digiti, qui longiusculi, sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Frons calva est, & membranâ crassâ obscurè flavâ obducta. Reliquum caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne vestiunt, superioresque caudæ tectrices sunt fusco-rufescentes: qui color in dorso & alis maculis partim nigris partim candidis aspergitur. Pennæ basin rostri ambientes, caput ad latera sive genæ, guttur & collum inferius albicant. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices fusco tinguntur colore. Remiges alarum majores sunt nigræ: minores nigricantes. Duodecim rectricibus cauda conflatur: binæ intermediæ nigræ, albo terminatæ: laterales omnes fuscæ. Rostrum obscurè flavum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque grisei. Habitat in *Germania*, ibique paludes frequentat.

mes, & les pieds, joints ensemble, ont sept pouces de long. Ses doigts, qui sont assez longs, sont entiérement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Le front est chauve, & couvert d'une membrane épaisse d'un jaune obscur. Le reste de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun-roussâtre: cette couleur est variée sur le dos & les aîles de taches en partie noires & en partie blanches. Les plumes qui entourent la bâse du bec, les côtés de la tête ou les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un beau blanc. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont bruns. Les grandes plumes de l'aîle sont noires: les moyennes sont noirâtres. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont noires, & terminées de blanc: toutes les latérales sont brunes. Le bec est d'un jaune obscur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont gris. On la trouve en *Allemagne*, où elle se tient dans les marais.

8. La Poule-Sultane tachetée.

Porphyrio superne pennis in medio nigris, ad margines sordidè rufis, albo fimbriatis, vestitus, infernè rufescens, lateribus fusco & albo transversim striatis; calvitio in fronte croceo; tæniâ utrinque supra oculos cinereo-albâ; gutture cinereo-cœrulescente; collo inferiore & pectore maculis nigris asperfis; marginibus alarum candidis; rectricibus fusco-nigricantibus, rufo adumbratis, binis intermediis albo utrinque fimbriatis. . . . Porphyrio nævius.

Gallinulæ aquaticæ tertium genus, quod Deffyt nominatur vulgò, à nobis Poliopus. *Gesn. Avi. pag.* 506, *in qua hujus icon pessima.*

Poliopus. *Gesn. icon. Avi. pag.* 104, *in qua eadem icon.*

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 465. *hujus icon minùs accurata pag.* 466.

Poliopus Gallinula minor Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 114. *N°.* 5.

Grinetta, Mediolani Gillerdine, Poliopus Gallinula minor Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 235. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LVIII.*

Petite Poule d'eau. *Alb. Tom. II. pag.* 47; *avec une figure mal coloriée. Pl.* 73.

Les Italiens l'appellent Grinetta. *Raj.*

Les Florentins, Tordo Gelsemino. *Willugh.*

Les Boulonnois, Porcellana. *Aldrov.*

Les habitans de Mantouë, Porzana; Scorzana. *Aldrov.*

Les Milanois, Gillerdine. *Willugh. Raj.* Grugnetto; *& ailleurs*, Girardella Columba. *Aldrov.*

Les Allemands, Deffyt. *Gesn. Aldrov.*

Les Anglois, Small Water-Hen. *Alb.*

Elle n'est pas tout-à-fait si grosse que le *Râle d'eau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a environ dix lignes de long; sa queue un

Rallo aquatico nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem novem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem circiter lineas longum

est; cauda unum pollicem & decem lineas; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes quatuordecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quinque lineas : laterales paulò sunt breviores; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Omnes digiti sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Alis expansis, extremitates majorum remigum quindecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Frons, ab exortu rostri ad capitis medium verticem usque, calva est, & membranâ crassâ croceo colore imbutâ obducta. Reliquum caput & partem colli superiorem obtegunt pennæ in medio nigræ, ad margines rufæ. Quæ dorsum cooperiunt, sicut & scapulares, sunt quoque in medio nigræ, ad margines sordidè rufæ, albo fimbriatæ. Quæ uropygium vestiunt, superioresque caudæ tectrices nigricantes, rufo marginatæ. In utroque capitis latere tænia extat cinereo-alba, prope rostri exortum orta, & supra oculos producta.

pouce dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes; son pied quatorze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes : les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est le plus court de tous. Tous ses doigts sont entiérement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a quinze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le front, depuis l'origine du bec jusque vers le milieu du sommet de la tête, est chauve, & couvert d'une membrane épaisse d'un jaune de safran. Le reste de la tête & le dessus du col sont couverts de plumes noires dans leur milieu, & rousses sur leurs bords. Celles qui couvrent le dos, ainsi que les scapulaires, sont pareillement noires dans leur milieu, ensuite d'un roux sale, & bordées de blanc. Celles qui couvrent le croupion, & les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres, & bordées de roux. De chaque côté de la tête est une bande d'un gris-blanc, qui part d'auprès de l'origine du bec, & s'étend au dessus des yeux.

La gorge eſt d'un cendré-bleuâtre. La partie inférieure du col & la poitrine ſont d'un cendré tirant ſur l'olivâtre, tout parſemé de taches noires. Le ventre, le haut des jambes & les couvertures du deſſous de la queue ſont rouſſâtres. Les côtés ſont rayés tranſverſalement de brun & de blanc. Le bord de l'aîle, depuis ſon origine juſqu'à ſon extrémité, eſt blanc. Les couvertures du deſſus des aîles ſont rouſſes, & variées de bandes blanches tranſverſales & en zigzags. Les plumes de l'aîle ſont d'un brun-noirâtre, nuancé de roux : la premiere eſt bordée extérieurement de blanc. La queue eſt compoſée de douze plumes de la même couleur que celles des aîles, les deux du milieu ſeulement étant bordées de blanc des deux côtés. Ces deux dernieres ſont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés juſqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui eſt la plus courte. Les yeux ſont petits : leur iris eſt d'un verd-jaunâtre. Le bec eſt de la même couleur, laquelle s'obſcurcit un peu à l'origine & à l'extrémité du demi-bec ſupérieur. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les

Guttur ex cinereo cœruleſcit. Pars colli inferior & pectus ex cinereo ad olivaceum vergunt, & maculis aſperguntur nigris. Venter, crurum ſuprema pars, inferioreſque caudæ tectrices ſunt rufeſcentes. Latera fuſco & albo tranſverſim ſtriata. Alarum margines ab ipſarum exortu ad extremitatem uſque candidæ. Superiores alarum tectrices rufæ, tæniis tranſverſis & undatis albis variegatæ. Remiges fuſco nigricantes, rufo adumbratæ : ex iſtis autem prior exteriùs albo marginatur. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores, binis tantummodo intermediis albo in utroque latere fimbriatis. Quæ binæ noviſſimè dictæ lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales verò ſenſim atque ſenſim longitudine minuuntur ad utrinque extimam uſque breviorem. Oculi exigui : ipſorum irides viridi-flavicantes. Roſtrum quoque viridi-flavicans, obſcuriùs tamen in exortu & apice mandibulæ ſuperioris. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque ſordidè virides. Juxta fluviorum & piſcinarum ripas verſatur.

paludes frequentat.

pieds & les ongles sont d'un verd sale. On la trouve sur le bords des rivieres & des étangs, & dans les marais.

9. LA POULE-SULTANE DE LA BAYE DE HUDSON.

Porphyrio superne fuscus, pennis in medio obscurioribus, infernè albo-rufescens, lateribus nigro transversim striatis; calvitio in fronte luteo; pennis basim rostri ambientibus, & gutture nigris; genis, collo inferiore & pectore cinereo-cœrulescentibus; marginibus earum candidis; rectricibus saturatè fuscis, exteriùs fusco dilutiore marginatis . . . .
PORPHYRIO FRETI HUDSONIS.

Rallus grisea, fronte nigra, pectore plumbeo, rostro flavo, pedibus virescentibus. Rallus Carolinus. *Linn. Systh. Nat. ed.* 10. *Gen.* 83. *sp.* 5.
Petite Foulque d'eau de l'Amérique. *Edwards. Tom. III. pag. CXLIV; avec une figure exacte Pl.* 144.
Les Anglois l'appellent LITTLE AMERICAN WATER HEN. *Edwards.*

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem octo circiter pollices explet, & ad extremos ungues decem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda sesquipollicem; pars crurum plumis denudata sex cum semi lineas; pes unum pollicem cum quinque lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue eamdem obtinet longitudinem; extimus quatuordecim

Elle est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue un pouce six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes & demie; son pied un pouce cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a aussi un pouce cinq lignes de longueur; l'extérieur quatorze

lignes, l'intérieur treize lignes; & celui de derriere sept lignes & demie. Tous ses doigts sont entiérement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Le front est chauve, & couvert d'une membrane jaune fort épaisse. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes, dont le milieu est d'une couleur un peu plus obscure. Les scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. Les plumes qui entourent la bâse du bec, & la gorge sont noires : cette couleur s'étend un peu sur la partie inférieure du col. Les côtés de la tête ou les joues, la partie inférieure & les côtés du col, & la poitrine sont d'un cendré-bleuâtre. Le ventre, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-roussâtre. Les côtés sont de la même couleur, & rayés transversalement de noir. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches, & marquées de rayes transversales brunâtres peu apparentes. Le bord de l'aile, depuis son origine jusqu'à son extrémité, est blanc. Les petites

lineas longus, intimus tredecim lineas; posticus autem septem cum semi lineas. Digiti omnes sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Alæ complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Frons calva est, membranâque crassâ luteâ obducta. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ fuscæ, in medio obscuriore colore imbutæ. Scapulares, superioresque caudæ tectrices concolores. Pennæ basim rostri ambientes, sicut & guttur, nigræ sunt : quæ nigredo in collo inferiore paululum protenditur. Caput ad latera sive genæ, collum inferiùs & ad latera, pectusque ex cinereo cœrulescunt. Venter, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes ex albo rufescunt. Latera eodem colore tinguntur, nigroque transversim sunt striata. Inferiores alarum tectrices albicant, tæniisque transversis fuscescentibus parùm conspicuis insigniuntur. Alarum margines ab ipsarum exortu ad extremitatem usque candidæ. Tectrices alarum superiores minores rufescentes : majores

scapularibus concolores. Ex majoribus autem, quæ medium locum occupant, exteriùs candicante marginantur. Remiges sunt saturatè fuscæ, oris exterioribus fusco dilutiore imbutis : in illis tamen quæ medium locum tenent, oræ exteriores sunt candicantes. Caudam componunt duodecim rectrices saturatè fuscæ, exteriùs fusco dilutiore marginatæ. Rostrum luteum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque viridescentes. Habitat in *Freto Hudsonis*.

couvertures du dessus des aîles sont roussâtres : les grandes sont de la même couleur que les scapulaires. Parmi ces dernieres, celles qui occupent le milieu, sont bordées extérieurement de blanchâtre. Les plumes de l'aîle sont d'un brun foncé, & bordées extérieurement de brun plus clair : il faut cependant en excepter celles qui occupent le milieu, qui sont bordées extérieurement de blanchâtre. La queue est composée de douze plumes d'un brun foncé, & bordées extérieurement de brun plus clair. Le bec est jaune. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont verdâtres. On la trouve à la *Baye de Hudson*.

10. LA POULE-SULTANE DE MADRAST.

Porphyrio superne cinereus, infernè albus ; calvitio in fronte & genis candidis ; collo inferiore & pectore maculis lunulatis nigris aspersis ; rectricibus cinereis .... PORPHYRIO MADERASPATANUS.

Crex Indica ex albo cinerea, nigroque mixta. *Raj. Syn. Avi. pag.* 194. *N°. 6. hujus icon pessima Tab. I. fig.* 4.
Les Anglois l'appellent MADERAS RAIL-HEN. *Raj.*
Les Habitans de Malabar, CAUNANGOLY. *Raj.*
Les Gentils, BOOLLU CORY. *Raj.*

Magnitudine *Anatem* circiter æquat. Caudam habet brevissimam ; rostrum & digitos longiusculos. Digiti au-

Elle est à peu près de la grandeur d'un *Canard*. Sa queue est fort courte. Son bec & ses doigts sont assez longs. Ces

derniers font entiérement féparés les uns des autres jufqu'à leur origine. Son front eft chauve, & couvert d'une membrane blanche fort épaiffe. Le refte du deffus de la tête, la partie fupérieure du col, le dos, le croupion, les plumes fcapulaires, les couvertures du deffus des aîles & celles du deffus de la queue font d'un joli cendré. Les côtés de fa tête ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deffous de la queue & les côtés font blancs : cette couleur eft variée à la partie inférieure du col & fur la poitrine de taches noires en forme de croiffant. Les plumes de l'aîle font cendrées, & bordées extérieurement de noir. La queue eft compofée de douze plumes cendrées. J'ignore la couleur du bec & des pieds. On la trouve aux environs de *Madraft*.

tem funt à fe invicem ad exortum ufque difcreti. Frons calva eft, membranâque craffiffimâ candidâ obducta. Reliquum caput fuperius, pars colli fuperior, dorfum, uropygium, pennæ fcapulares, alas fuperne cooperientes, fuperiorefque caudæ tectrices eleganti cinereo tinguntur. Caput ad latera five genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum fuprema pars & inferiores caudæ tectrices albent: in collo inferiore autem & pectore albedinem variegant maculæ lunulatæ nigræ. Remiges alarum cinereæ, exteriùs nigro fimbriatæ. Duodecim rectricibus cinereis cauda conftat. Cujus coloris fint roftrum, pedefque, penitùs me latet. Circa *Maderafpatanum* habitat.

Fin du Tome cinquiéme.

Gravé par Martinet

1. Poule-Sultane. 2. Petite Poule-Sultane.

INDEX

Avium in quinto volumine contentarum, secundùm ordinem in quo disponuntur.

ORDO XV.

SECTIO I.

LXII. *Genus Struthionis.*

1. Struthio.

SECTIO II.

LXIII. *Genus Rheæ.*

1. Rhea.

LXIV. *Genus Casuarii.*

1. Casuarius.

SECTIO III.

LXV. *Genus Raphi.*

1. Raphus.

ORDO XVI.

SECTIO I.

LXVI. *Genus Otidis.*

1. Otis.
2. Otis minor, Anas campestris vulgò dicta.
3. Otis Arabica.

TABLE

Des Oiseaux contenus dans le cinquiéme volume, selon l'ordre dans lequel ils sont rangés.

ORDRE XV.

SECTION I.

LXII. *Genre de l'Autruche.*

1. L'Autruche.

SECTION II.

LXIII. *Genre du Thouyou.*

1. Le Thouyou.

LXIV. *Genre du Casoar.*

1. Le Casoar.

SECTION III.

LXV. *Genre du Dronte.*

1. Le Dronte.

ORDRE XVI.

SECTION I.

LXVI. *Genre de l'Outarde.*

1. L'Outarde.
2. La petite Outarde, appellée vulgairement Cannepetiere.
3. L'Outarde d'Arabie.

SECTION II.

LXVII. *Genre de l'Echasse.*

1. L'Echasse.
2. L'Echasse du Mexique.

LXVIII. *Genre de l'Huitrier.*

1. L'Huitrier, appellé vulgairement Pie de Mer.

SECTION III.

LXIX. *Genre du Pluvier.*

1. Le Pluvier doré.
2. Le petit Pluvier doré.
3. Le Pluvier doré de S. Domingue.
4. Le Pluvier doré de la Baye de Hudson.
5. Le petit Pluvier ou le Guignard.
6. Le Guignard d'Angleterre.
7. Le Pluvier à collier.
8. Le petit Pluvier à collier.
9. Le Pluvier à collier de Virginie.
10. Le Pluvier à collier de S. Domingue.
11. Le Pluvier à collier de la Jamaïque.
12. Le grand Pluvier, appellé vulgairement Courly de terre.
13. Le grand Pluvier de Bengale.
14. Le Pluvier hupé de Perse.
15. Le Pluvier armé du Sénégal.

SECTIO II.

LXVII. *Genus Himantopi.*

1. Himantopus.
2. Himantopus Mexicanus.

LXVIII. *Genus Ostralegæ.*

1. Ostralega, Pica marina vulgò dicta.

SECTIO III.

LXIX. *Genus Pluvialis.*

1. Pluvialis aurea.
2. Pluvialis aurea minor.
3. Pluvialis Dominicensis aurea.
4. Pluvialis aurea Freti Hudsonis.
5. Pluvialis minor sive Morinellus.
6. Morinellus Anglicanus.
7. Pluvialis torquata.
8. Pluvialis torquata minor.
9. Pluvialis Virginiana torquata.
10. Pluvialis Dominicensis torquata.
11. Pluvialis Jamaicensis torquata.
12. Pluvialis major, Oedicnemus vulgò dicta.
13. Pluvialis Bengalensis major.
14. Pluvialis Persica cristata.
15. Pluvialis Senegalensis armata.

ORDO XVII.

SECTIO I.

LXX. *Genus Vanelli.*

1. Vanellus.
2. Vanellus griseus.
3. Vanellus varius.
4. Vanellus Helveticus.
5. Vanellus Bononiensis major.
6. Vanellus Senegalensis armatus.
7. Vanellus Ludovicianus armatus.
8. Vanellus Dominicensis armatus.

LXXI. *Genus Jacanæ.*

1. Jacana.
2. Jacana armata.
3. Jacana armata nigra.
4. Jacana armata fusca.
5. Jacana armata varia.

SECTIO II.

LXXII. *Genus Arenariæ.*

1. Arenaria.
2. Arenaria cinerea.

SECTIO III.

LXXIII. *Genus Glareolæ.*

1. Glareola.
2. Glareola torquata.
3. Glareola nævia.

ORDRE XVII.

SECTION I.

LXX. *Genre du Vanneau.*

1. Le Vanneau.
2. Le Vanneau gris.
3. Le Vanneau varié.
4. Le Vanneau de Suisse.
5. Le grand Vanneau de Bologne.
6. Le Vanneau armé du Sénégal.
7. Le Vanneau armé de la Louisiane.
8. Le Vanneau armé de S. Domingue.

LXXI. *Genre du Jacana.*

1. Le Jacana.
2. Le Jacana armé ou le Chirurgien.
3. Le Chirurgien noir.
4. Le Chirurgien brun.
5. Le Chirurgien varié.

SECTION II.

LXXII. *Genre du Coulon-chaud.*

1. Le Coulon-chaud.
2. Le Coulon-chaud cendré.

SECTION III.

LXXIII. *Genre de la Perdrix-de-mer.*

1. La Perdrix-de-mer.
2. La Perdrix-de-mer à collier.
3. La Perdrix-de-mer tachetée.

4. La Perdrix-de-mer du Sénégal.	4. Glareola Senegalensis.
SECTION IV.	**SECTIO IV.**
LXXIV. *Genre du Râle.*	LXXIV. *Genus Ralli.*
1. Le Râle d'eau.	1. Rallus aquaticus.
2. Le petit Râle d'eau ou la Maroüette.	2. Rallus aquaticus minor sive Maruetta.
3. Le Râle de Genet ou Roi de Cailles.	3. Rallus Genistarum sive Ortygometra.
4. Le Râle des Philippines.	4. Rallus Philippensis.
5. Le Râle rayé des Philippines.	5. Rallus Philippensis striatus.
6. Le Râle à collier des Philippines.	6. Rallus Philippensis torquatus.
7. Le Râle brun des Philippines.	7. Rallus Philippensis fuscus.
8. Le Râle de Virginie.	8. Rallus Virginianus.
SECTION V.	**SECTIO V.**
LXXV. *Genre du Beccasseau.*	LXXV. *Genus Tringæ.*
1. Le Beccasseau, appellé vulgairement Cul-blanc.	1. Tringa.
2. La Guignette.	2. Guinetta.
3. Le Chevalier.	3. Totanus.
4. Le Chevalier rouge.	4. Totanus ruber.
5. Le Chevalier rayé.	5. Totanus striatus.
6. Le Chevalier tacheté.	6. Totanus nævius.
7. Le Chevalier cendré.	7. Totanus cinereus.
8. Le Chevalier blanc.	8. Totanus candidus.
9. Le Chevalier de Bengale.	9. Totanus Bengalensis.
10. L'Alouette-de-mer.	10. Cinclus.
A. *La petite Alouette-de-mer.*	A. *Cinclus minor.*
11. L'Alouette-de-mer à collier.	11. Cinclus torquatus.
12. L'Alouette-de-mer de S. Domingue.	12. Cinclus Dominicensis.
13. La petite Alouette-de-mer de S. Domingue.	13. Cinclus Dominicensis minor.
14. La Maubéche.	14. Calidris.
15. La Maubéche tachetée.	15. Calidris nævia.

16. Calidris grisea.
17. Calidris grisea minor.
18. Pugnax.
19. Merula aquatica.
20. Turdus aquaticus.
21. Canutus.

LXXVI. *Genus Limosæ.*

1. Limosa.
2. Limosa grisea.
3. Limosa grisea major.
4. Limosa fusca.
5. Limosa rufa.
6. Limosa rufa major.
7. Limosa Americana rufa.
8. Limosa candida.

LXXVII. *Genus Scolopacis.*

1. Scolopax.
   A. *Scolopax candida.*
2. Gallinago.
3. Gallinago minor.
4. Gallinago Maderaspatana.
5. Gallinago Anglicana.

SECTIO VI.

LXXVIII. *Genus Numenii.*

1. Numenius.
   A. *Numenius candidus.*
2. Numenius minor.
3. Numenius Madagascariensis.
4. Numenius viridis.
5. Numenius castaneus.
6. Numenius Americanus fuscus.
7. Numenius Mexicanus varius.

16. La Maubéche grise.
17. La petite Maubéche grise.
18. Le Combattant ou Paon-de-mer.
19. Le Merle-d'eau.
20. La Grive-d'eau.
21. Le Canut.

LXXVI. *Genre de la Barge.*

1. La Barge.
2. La Barge grise.
3. La grande Barge grise.
4. La Barge brune.
5. La Barge rousse.
6. La grande Barge rousse.
7. La Barge rousse d'Amérique.
8. La Barge blanche.

LXXVII. *Genre de la Beccasse.*

1. La Beccasse.
   A. *La Beccasse blanche.*
2. La Beccassine.
3. La petite Beccassine.
4. La Beccassine de Madrast.
5. La Beccassine d'Angleterre.

SECTION VI.

LXXVIII. *Genre du Courly.*

1. Le Courly.
   A. *Le Courly blanc.*
2. Le petit Courly ou le Corlieu.
3. Le Courly de Madagascar.
4. Le Courly verd.
5. Le Courly marron.
6. Le Courly brun d'Amérique.
7. Le Courly varié du Mexique.

8. Le grand Courly d'Amérique.	8. Numenius Americanus major.
9. Le petit Courly d'Amérique.	9. Numenius Americanus minor.
10. Le Courly blanc du Brésil.	10. Numenius Brasiliensis candidus.
11. Le Courly brun du Brésil.	11. Numenius Brasiliensis fuscus.
12. Le Courly rouge du Brésil.	12. Numenius Brasiliensis coccineus.
13. L'Ibis.	13. Ibis.
14. L'Ibis blanc.	14. Ibis candida.
SECTION VII.	**SECTIO VII.**
LXXIX. *Genre de la Spatule.*	LXXIX. *Genus Plateæ.*
1. La Spatule.	1. Platea.
2. La Spatule couleur de rose.	2. Platea rosea.
3. La Spatule rouge.	3. Platea coccinea.
SECTION VIII.	**SECTIO VIII.**
LXXX. *Genre de la Cigogne.*	LXXX. *Genus Ciconiæ.*
1. La Cigogne brune.	1. Ciconia fusca.
2. La Cigogne blanche.	2. Ciconia alba.
3. La Cigogne d'Amérique.	3. Ciconia Americana.
4. La Cigogne du Brésil.	4. Ciconia Brasiliensis.
5. La Cigogne de la Guiane.	5. Ciconia Guianensis.
6. La Grue.	6. Grus.
7. La Grue des Indes Orientales.	7. Grus Orientalis Indica.
8. La Grue du Mexique.	8. Grus Mexicana.
9. La Grue du Japon.	9. Grus Japonensis.
10. La Grue d'Amérique.	10. Grus Americana.
11. La Grue de la Baye de Hudson.	11. Grus Freti Hudsonis.
12. La Grue de Numidie, appellée vulgairement Demoiselle de Numidie.	12. Grus Numidica, Virgo Numidica vulgò dicta.
LXXXI. *Genre du Héron.*	LXXXI. *Genus Ardeæ.*
1. Le Héron.	1. Ardea.

2. Ardea criſtata.	2. Le Héron hupé.
3. Ardea Cayanenſis criſtata.	3. Le Héron hupé de Cayenne.
4. Ardea cinerea.	4. Le Héron cendré.
5. Ardea Mexicana cinerea.	5. Le Héron cendré du Mexique.
6. Ardea Americana cinerea.	6. Le Héron cendré d'Amérique.
7. Ardea Freti Hudſonis.	7. Le Héron de la Baye de Hudſon.
8. Ardea nævia.	8. Le Héron tacheté.
9. Ardea griſea.	9. Le Héron gris.
10. Ardea Virginiana criſtata.	10. Le Héron hupé de Virginie.
11. Ardea Mexicana criſtata.	11. Le Héron hupé du Mexique.
12. Ardea purpuraſcens.	12. Le Héron pourpré.
13. Ardea Mexicana purpuraſcens.	13. Le Héron pourpré du Mexique.
14. Ardea criſtata purpuraſcens.	14. Le Héron pourpré hupé.
15. Ardea candida.	15. Le Héron blanc.
16. Egretta.	16. L'Aigrette.
17. Ardea Braſilienſis candida.	17. Le Héron blanc du Bréſil.
18. Ardea Carolinenſis candida.	18. Le Héron blanc de la Caroline.
19. Ardea Mexicana candida.	19. Le Héron blanc du Mexique.
20. Ardea candida minor.	20. Le petit Héron blanc.
21. Ardea nigra.	21. Le Héron noir.
22. Ardea nigra torquata.	22. Le Héron noir à collier.
23. Ardea Braſilienſis.	23. Le Héron du Bréſil.
24. Botaurus.	24. Le Butor.
25. Botaurus Freti Hudſonis.	25. Le Butor de la Baye de Hudſon.
26. Botaurus minor.	26. Le petit Butor.
27. Botaurus ſtriatus.	27. Le Butor rayé.
28. Botaurus major.	28. Le grand Butor.
29. Botaurus rufus.	29. Le Butor roux.
30. Botaurus Braſilienſis.	30. Le Butor du Bréſil.
31. Botaurus nævius.	31. Le Butor tacheté ou le Pouacre.
32. Botaurus Americanus nævius.	32. Le Butor tacheté d'Amérique.
33. Cancroſagus.	33. Le Crabier.
34. Cancroſagus caſtaneus.	34. Le Crabier marron.

35. Le Crabier roux.	35. Cancrofagus rufus.
36. Le Crabier roux	36. Cancrofagus rufus nævius.
37. Le Crabier jaune.	37. Cancrofagus luteus.
38. Le Crabier des Philippines.	38. Cancrofagus Philippensis.
39. Le Crabier d'Amérique.	39. Cancrofagus Americanus.
40. Le Crabier du Brésil.	40. Cancrofagus Brasiliensis.
41. Le Crabier de Bahama.	41. Cancrofagus Bahamensis.
42. Le Crabier bleu.	42. Cancrofagus cœruleus.
43. Le Crabier verd.	43. Cancrofagus viridis.
44. Le Crabier verd tacheté.	44. Cancrofagus viridis nævius.
45. Le Bihoreau.	45. Nictycorax.
46. Le Blongios.	46. Ardeola.
47. Le Blongios tacheté.	47. Ardeola nævia.
LXXXII. *Genre de l'Ombrette.*	LXXXII. *Genus Scopi.*
1. L'Ombrette.	1. Scopus.
SECTION IX.	SECTIO IX.
LXXXIII. *Genre de la Cuilliere.*	LXXXIII. *Genus Cochlearii.*
1. La Cuilliere.	1. Cochlearius.
A. *La Cuilliere tachetée.*	A. *Cochlearius nævius.*
2. La Cuilliere brune.	2. Cochlearius fuscus.
SECTION X.	SECTIO X.
LXXXIV. *Genre de l'Oiseau-royal.*	LXXXIV. *Genus Balearicæ.*
1. L'Oiseau-royal.	1. Balearica.
SECTION XI.	SECTIO XI.
LXXXV. *Genre du Cariama.*	LXXXV. *Genus Cariamæ.*
1. Le Cariama.	1. Cariama.
LXXXVI. *Genre du Kamichy.*	LXXXVI. *Genus Anhimæ.*
1. Le Kamichy.	1. Anhima.
SECTION XII.	SECTIO XII.
LXXXVII. *Genre de la Poule-Sultane.*	LXXXVII. *Genus Porphyrionis.*
1. La Poule-Sultane.	1. Porphyrio.
	A. *Porphyrio*

A. *Porphyrio melanocephalos.*	A. *La Poule-Sultane à tête noire.*
2. Porphyrio minor.	2. La petite Poule-Sultane.
3. Porphyrio viridis.	3. La Poule-Sultane verte.
4. Porphyrio fuſcus.	4. La Poule-Sultane brune.
5. Porphyrio rufeſcens.	5. La Poule-Sultane rouſſâtre.
6. Porphyrio rufus.	6. La Poule-Sultane rouſſe.
7. Porphyrio punctulatus.	7. La Poule-Sultane mouchetée.
8. Porphyrio nævius.	8. La Poule-Sultane tachetée.
9. Porphyrio Freti Hudſonis.	9. La Poule-Sultane de la Baye de Hudſon.
10. Porphyrio Maderaſpatanus.	10. La Poule-Sultane de Ma-dras.

TABLE INDEX

Des Genres. *Generum.*

LXII	Genre	page 3		LXII	Genus	pagina 3
LXIII	Genre	. . . 8		LXIII	Genus	. . . 8
LXIV	Genre	. . . 10		LXIV	Genus	. . . 10
LXV	Genre	. . . 14		LXV	Genus	. . . 14
LXVI	Genre	. . . 18		LXVI	Genus	. . . 18
LXVII	Genre	. . . 33		LXVII	Genus	. . . 33
LXVIII	Genre	. . . 38		LXVIII	Genus	. . . 38
LXIX	Genre	. . . 42		LXIX	Genus	. . . 42
LXX	Genre	. . . 94		LXX	Genus	. . . 94
LXXI	Genre	. . . 121		LXXI	Genus	. . . 121
LXXII	Genre	. . . 132		LXXII	Genus	. . . 132
LXXIII	Genre	. . . 141		LXXIII	Genus	. . . 141
LXXIV	Genre	. . . 151		LXXIV	Genus	. . . 151
LXXV	Genre	. . . 177		LXXV	Genus	. . . 177
LXXVI	Genre	. . . 261		LXXVI	Genus	. . . 261
LXXVII	Genre	. . . 292		LXXVII	Genus	. . . 292
LXXVIII	Genre	. . . 311		LXXVIII	Genus	. . . 311
LXXIX	Genre	. . . 351		LXXIX	Genus	. . . 351
LXXX	Genre	. . . 361		LXXX	Genus	. . . 361
LXXXI	Genre	. . . 391		LXXXI	Genus	. . . 391
LXXXII	Genre	. . . 503		LXXXII	Genus	. . . 503
LXXXIII	Genre	. . . 506		LXXXIII	Genus	. . . 506
LXXXIV	Genre	. . . 511		LXXXIV	Genus	. . . 511
LXXXV	Genre	. . . 516		LXXXV	Genus	. . . 516
LXXXVI	Genre	. . . 518		LXXXVI	Genus	. . . 518
LXXXVII	Genre	. . . 522		LXXXVII	Genus	. . . 522

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS FRANÇOIS.

La lettre G indique le genre : la lettre V, la variété ; & la lettre E, l'espece.

A.

	G.	V.	E.
ABoyeur des Anglois,	76		2
Aigrette,	81		16
Allouette de mer,	72		2
Alouette de mer,	69		8
— -de-mer,	75		10
— -de-mer à collier,	75		11
— -de-mer de S. Domingue,	75		12
— -de-mer de S. Domingue, (Petite)	75		13
— -de-mer, (Petite)	75	A.	10
Autre Beccassine,	75		1
Autruche,	62		
—	62		1
— de Guiane,	63		1

B.

	G.	E.
BArge,	76	
—	76	1
— blanche,	76	8
— brune,	76	4
— grise,	76	2
— grise, (Grande)	76	3
— rousse,	76	5
— rousse d'Amérique,	76	7
— rousse, (Grande)	76	6
Bec à Cuiller,	79	1
Bécasse,	77	1
— grande,	77	1
— petite,	77	2
Bécasseau,	77	2
Bécassine,	77	2

	G.	V.	E.
Bécassine d'Etang,	75		3
— (Plus petite espece de)	77		3
Bécasson,	77		2
Beccasse,	77		
—	77		1
— blanche,	77	A.	1
— de mer,	68		1
Beccasseau,	75		
—	75		1
Beccassine,	77		2
— (Autre)	75		1
— blanche,	75		8
— d'Angleterre,	77		5
— de Madrast,	77		4
— (Mâle de la)	77		3
— (Petite)	77		3
Béquasse,	77		1
Bergeronette,	75		10
Bihoreau,	81		45
Bistarde,	66		1
Bitarde,	69		12
Blongios,	81		46
— tacheté,	81		47
Bluet,	87		1
Butor,	81		24
— brun,	81		32
— brun, (Petit)	81		47
— de la Baye de Hudson,	81		25
— du Brésil,	81		30
— (Grand)	81		28
— huppé,	81		41

	G.	E.
Butor, (Petit)	81	26
—	81	43
—	81	46
— rayé,	81	27
— roux,	81	29
— tacheté,	81	31
— tacheté d'Amérique,	81	32

C.

	G.	E.
CAilles, (Mere des)	74	1
—	74	3
— (Roi de)	74	3
— (Roy des)	74	1
—	74	3
Canard de pré de France,	66	2
Canne-petiere,	66	2
Canut,	75	21
Cariama,	85	
—	85	1
Casoar,	64	
—	64	1
Cassowary,	64	1
Chevalier,	75	3
—	75	4
— aux pieds rouges,	75	4
— aux pieds rouges, (Femelle du)	76	3
— blanc,	75	8
— cendré,	75	7
— d'Italie, (Grand)	67	1
— de Bengale,	75	9
— noir,	75	7
— rayé,	75	5
— rouge,	75	3
—	75	4
— tacheté,	75	6
Chirurgien,	71	2
— brun,	71	4
— noir,	71	3
— varié,	71	5
Cigogne,	80	
—	80	2

	G.	E.
Cigogne blanche,	80	2
— brune,	80	1
— d'Amérique,	80	3
— de la Guiane,	80	5
— du Brésil,	80	4
— noire,	80	1
— noire, (Espece de)	78	13
— ordinaire,	80	2
Cocoüan,	74	2
Combattant,	75	18
Corbeau de nuit,	81	45
Corlieu,	78	1
—	78	2
— blanc,	78	10
— brun,	78	11
— (Petit)	76	2
—	78	2
— rouge,	78	12
Corlis,	78	1
Coulon-chaud,	72	
—	72	1
— -chaud cendré,	72	2
Courly,	78	
—	78	1
— blanc,	78 A.	1
— blanc du Brésil,	78	10
— brun d'Amérique,	78	6
— brun du Brésil,	78	11
— d'Amérique, (Grand)	78	8
— d'Amérique, (Petit)	78	9
— de Madagascar,	78	3
— de terre,	79	12
— marron,	78	5
— (Petit)	78	2
— rouge du Brésil,	78	12
— varié du Mexique,	78	7
— verd,	78	4
Cra-cra,	81	39
Crabier,	81	33
— bleu,	81	42
— d'Amérique,	81	39
— de Bahama,	81	41
— des Philippines,	81	38

	G.	V.	E.
Crabier du Bréſil,	81		40
— jaune,	81		37
— marron,	81		34
— roux,	[illegible]		35
— roux tacheté,	81		36
— (Second)	81		3
— verd,	81		43
— verd tacheté,	81		44
Crex, (Oiſeau nommé)	76		2
Cueiller, (Bec à)	79		1
Cuiller, (Bec à)	79		1
Cuilliere,	83		
—	83		1
— brune,	83		2
— tachetée,	83	A.	1
Cul-blanc,	75		1
Curiaca,	78		8

D.

	G.	E.
Demoiſelle de Numidie,	80	12
Deux-pour-un,	77	3
Dixhuit,	70	1
Dotralle de la Province de Lincoln,	69	6
— des Anglois,	69	5
Dronte,	65	
—	65	1

E.

	G.	E.
Echaſſe,	67	
—	67	1
— du Mexique,	67	2
Eſpatule,	79	2
— rouge,	79	3
Eſpece de Cigogne noire,	78	13
— de Héron,	81	45

F.

	G.	E.
Femelle du Chevalier aux pieds rouges,	76	3
Flamant gris,	78	11
— rouge,	78	12
Foulque d'eau de l'Amérique, (Petite)	87	9
Fouton,	77	3
Francolin,	76	6
— à poitrine rouge,	76	5
— blanc de la Baye de Hudſon,	76	8
— de l'Amérique, (Grand)	76	7

G.

	G.	E.
Galerand,	81	24
Grand Butor,	81	28
— Chevalier d'Italie,	67	1
— Courly d'Amérique,	78	8
— Francolin de l'Amérique,	76	7
— Héron hupé,	81	10
— Pluvier,	69	12
— Pluvier de Bengale,	69	13
— Vanneau de Bologne,	70	5
Grande Barge griſe,	76	3
— Barge rouſſe,	76	6
— Grue de la Baye de Hudſon,	80	10
— Grue des Indes,	80	7
Grive-d'eau,	75	20
Grue,	80	6
— blanche de l'Amérique,	80	10
— brune & cendrée,	80	11
— d'Amérique,	80	10
— de la Baye de Hudſon,	80	11
— de la Baye de Hudſon, (Grande)	80	10
— de Numidie,	80	12
— des Indes, (Grande)	80	7
— des Indes Orientales,	80	7
— du Japon,	80	9

	G.	E.
Grue du Mexique,	80	8
Guignard,	69	5
— d'Angleterre,	69	6
Guignette,	75	2

H.

	G.	E.
HÉron,	81	
—	81	1
—	81	2
—	81	6
—	81	39
—	81	45
— blanc,	75	18
—	81	15
— blanc de la Caroline,	81	18
— blanc de M. Oldham,	75	7
— blanc du Bréſil,	81	17
— blanc du Mexique,	81	19
— blanc, (Petit)	81	18
—	81	20
— bleu,	81	3
—	81	42
— cendré,	81	1
—	81	4
— cendré d'Amérique,	81	6
— cendré de l'Amérique Septentrionale,	81	7
— cendré du Mexique,	81	5
— de la Baye de Hudſon,	81	7
— du Bréſil,	81	23
— (Eſpece de)	81	45
— étoilé,	75	18
— gris,	81	9
— hupé,	81	2
— hupé de Cayenne,	81	3
— hupé de Virginie,	81	10
— hupé du Mexique,	81	11
— hupé, (Grand)	81	10
— noir,	81	21
— noir à collier,	81	22
Héron ordinaire,	81	1
— (Petit)	79	1
— pourpré,	81	12
— pourpré du Mexique,	81	13
— pourpré hupé,	81	14
— tacheté,	81	8
Houtarde,	66	1
Huitres, (Preneur d')	68	1
Huitrier,	68	
—	68	1

I.

	G.	E.
JAcana,	71	1
—	71	2
— armé,	71	13
Ibis,	78	14
— blanc,	78	

K.

	G.	E.
KAmichy,	86	
—	86	1

M.

	G.	E.
MAle de la Beccaſſine,	77	3
Maroüette,	74	2
Maubéche,	75	14
— griſe,	75	16
— griſe, (Petite)	75	17
— tachetée,	75	15
Mere des Cailles,	74	1
—	74	3
Merle-d'eau	75	19

O.

	G.	E.
OIſeau appellé Hæmatopus marinus,	68	1
— de Riviere,	78	8
— nommé Crex,	76	2
— pourpré,	87	1
— Royal,	84	
—	84	1
Olive,	66	2

	G.	E.
Ombrette,	82	
—	82	1
Onouré des bois,	81	23
Ostarde,	66	1
—	69	12
Ostardeau,	69	12
Otarde,	66	1
Outarde,	66	
—	66	1
—	69	12
— d'Arabie,	66	3
— des Indes,	69	13
— (Petite)	66	2

P.

	G.	E.
Pale,	79	1
Pallette,	79	1
Paon,	84	1
— -de-mer,	75	18
Papechieu,	70	1
Pélican,	79	1
— Américain,	78	8
Perdrix-de-mer,	73	
—	73	1
— -de-mer à collier,	73	2
— -de-mer du Sénégal,	73	4
— -de-mer tachetée,	73	3
Petit Butor,	81	26
—	81	43
—	81	46
— Butor brun,	81	47
— Corlieu,	76	2
—	78	2
— Courly,	78	2
— Courly d'Amérique,	78	9
— Héron,	79	1
— Héron blanc,	81	18
—	81	20
— Pluvier,	69	5
— Pluvier à collier,	69	8
— Pluvier doré,	69	2
— Râle d'eau,	74	2

	G.	V.	E.
Petite Alouette-de-mer,	75	A.	10
— Alouette-de-mer de S. Domingue,	75		13
— Beccassine,	77		3
— Espece de Beccassine, (Plus)	77		3
— Foulque d'eau de l'Amérique,	87		9
— Maubéche grise,	75		17
— Outarde,	66		2
— Poule d'eau,	87		8
— Poule Sultane,	87		2
Pie de mer,	68		1
Pittouër,	81		24
Plus petite Espece de Beccassine,	77		3
Pluvier,	69		
—	69		1
—	69		8
— à collier,	69		7
— à collier de la Jamaïque,	69		11
— à collier de S. Domingue,	69		10
— à collier de Virginie,	69		9
— à collier, (Petit)	69		8
— armé du Sénégal,	69		15
— criard,	69		9
— de Bengale, (Grand)	69		13
— des Indes à la gorge noire,	69		14
— doré,	69		1
— doré de la Baye de Hudson,	69		4
— doré de S. Domingue,	69		3
— doré, (Petit)	69		2
— (Grand)	69		12
— gris,	70		2
— hupé de Perse,	69		14
— moucheté,	69		4
— (Petit)	69		5
— verd,	69		1
Poche,	79		1

	G.	V.	E.
Porphyrio,	87		1
Porphyrion,	87		1
Pouacre,	81		31
Poule,	87	A.	1
—-d'eau,	71		2
—-d'eau aux aîles éperonnées,	71		5
— d'eau, (Petite)	87		8
—-Sultane,	87		
—	87		1
—-Sultane à tête noire,	87	A.	1
—-Sultane brune,	87		4
—-Sultane de la Baye de Hudson,	87		9
—-Sultane de Madraſt,	87		10
—-Sultane mouchetée,	87		7
—-Sultane, (Petite)	87		2
—-Sultane rouſſâtre,	87		5
—-Sultane rouſſe,	87		6
—-Sultane tachetée,	87		8
—-Sultane verte,	87		3
Preneur d'Huitres,	68		1

R.

	G.	E.
RAle,	74	
— à collier des Philippines,	74	6
— brun des Philippines,	74	7
— d'eau,	74	1
— d'eau de Bengale,	75	9
— d'eau, (Petit)	74	2
— de Genet,	74	3
— de l'Amérique,	74	8
— de Virginie,	74	8
— des Philippines,	74	4
— rayé des Philippines,	74	5
Ralle,	74	1
Raſle,	74	1
— de Genet,	74	3
— noir,	74	1
— rouge,	74	3
Roi de Cailles,	74	3
Roupeau,	81	45
Roy des Cailles,	74	1
—	74	3

S.

	G.	E.
SAnderling d'Arbres,	75	10
— de Cornouaille,	75	17
Saouakou,	83	1
—des bois,	83	2
Second Crabier,	81	3
Spatule,	79	
—	79	1
—	79	2
— couleur de roſe,	79	2
— rouge,	79	3

T.

	G.	E.
THouyou,	63	
—	63	1
Tourne pierre de la Baye de Hudſon,	72	1
Tringa tacheté,	75	20
Truble,	79	1

V.

	G.	E.
VAneau,	70	1
Vanneau,	70	
—	70	1
— armé de la Louiſiane,	70	7
— armé de S. Domingue,	70	8
— armé du Sénégal,	70	6
— de Bologne, (Grand)	70	5
— de Suiſſe,	70	4
— gris,	70	2
— varié,	70	3
Vidcocq,	77	1
Vidcoq,	77	1
Wimbrel,	78	2

INDEX

INDEX ALPHABETICUS

Nominum Gallicorum, Latinorum, Hebraicorum, Græcorum, &c.

Littera G Genus designat; Littera V, varietatem; & Littera S, Speciem.

A

	G.	S.
ABastrus,	62	1
Aboyeur des Anglois,	76	2
Acacalotl,	78	7
— Hernandezii,	78	7
— Nierembergii,	78	7
Acceggia,	77	1
Acker-Trapp,	66	1
— Trappe,	66	1
Adebar,	80	2
Ægocephala,	76	6
Ægocephalus Bellonii,	76	1
—	76	6
— (Glareola)	76	6
Aengsnaerpa,	74	3
Aers, (Dod-)	65	1
Aesch-Heunlein,	74	1
— Heunlin,	74	1
Agro,	81	1
— blanc,	81	15
Agroti,	81	16
Aguapecaca,	71	2
— dicta, (Gallinula Brasiliensis)	71	2
— dicta, (Jacanæ alia species, Brasiliensibus)	71	2
Aiaia,	79	3
Ajaia,	79	2
— Brasiliensibus,	79	2
— dicta Marcgravii, (Platea Brasiliensis)	79	2

	G.	V.	S.
Ajaja,	79		2
Aigeron,	81		24
Αἰγοκέφαλος,	76		1
Aigrette,	81		16
— Gallorum,	81		16
Αἱματόπους,	68		1
Airon,	81		1
— bianco,	81		15
— negro,	81		1
Αἴξ,	70		1
Albardeola,	79		1
—	81		15
— Willughbeii,	79		1
Alfwargrim,	69		4
Alhabari,	66		1
Alia Ardeæ species,	81		2
—	81		17
—	81		30
— quædam Ardea,	81		2
— quædam Ardea ex Ornithologo,	81		2
Aliis Butio,	81		24
— Glareola,	87		6
Allouette de mer,	72		2
Alouette de mer,	69		8
Alouette-de-mer,	75		10
— -de-mer à collier,	75		11
— -de-mer de S. Domingue,	75		12
— -de-mer de S. Domingue, (Petite)	75		13
— -de-mer, (Petite)	75	A.	10

	G.	V.	S.
Alte Knechte,	74		3
Alwargrim,	69		4
American Godwit, (Greater)	76		7
— Scarlet Pelecan,	79		3
— Scarlet Spoon-bill,	79		3
— Water Hen, (Little)	87		9
Amſel, (Bach-)	75		19
— (Brach-)	70		2
— (See-)	75		19
— (Waſſer-)	75		19
Anas campeſtris,	66		2
— roſtro plano, &c.	79		1
Andugoacu,	63		1
Anghiron,	81		1
Anhima,	86		
—	86		1
— Braſilienſibus,	86		1
— Braſilienſium Marcgravii,	86		1
Anhyma,	86		1
Anſer Chilenſis,	71		4
— Cochlearius,	79		1
— platorynchos,	79		1
— Trappa,	66		1
Ανθρωποειδὴς,	80		12
Antigone,	80		7
Aokerhoena,	69		1
Aokerhoens,	69		1
—	69		4
Aouarou,	80		5
Apoa, (Nhandu)	80		4
— Tupinambis Marcgravii, (Nhandu)	80		4
— Tupinambis, (Nhandu)	80		4
Aquila Americana, &c.	86		1
— aquatica, cornuta,	86		1
Arapapa,	83	A.	1
Arcaſe,	78		1
Arcia,	77		1
Arcuata,	78		1
— Coſmii,	78		1

	G.	S.
Arcuata major,	78	1
— minor, &c.	78	5
Arcuato,	78	1
Ardea,	80	2
—	81	
—	81	1
—	81	2
—	81	24
— æquinoctialis,	78	14
— alba,	79	1
—	81	15
— alba, &c.	80	2
— alba cirrata Jonſtoni,	81	15
— alba major,	81	15
— alba major criſtâ carens,	81	15
— alba major Willughbeji,	81	15
— alba maxima,	81	15
—	81	16
— alba minor,	81	16
— alba minor Aldrovandi,	81	16
— alba minor alia,	81	16
— alba minor Carolinienſis,	81	18
— alba minor criſtata,	81	16
— alba minor Geſneri,	81	16
— alba minor ſecunda, Aldrovandi,	81	16
— alba minor tertia Aldrovandi,	81	20
— alba tota, &c.	81	15
— alia alba,	81	15
— (Alia quædam)	81	2
— Americana, &c.	63	1
—	75	18
— Americana, alba maxima Sloan.	81	16
— Americana cinerea,	81	6
— Americana, ſylvatica, &c.	81	23
— Arundinum,	81	24

	G.	S.
Ardea Aſterias,	81	24
— Braſilienſis,	81	23
— Braſilienſis candida,	81	17
— Braſilienſis Cocoi dicta Marcgravio,	81	3
— Braſilienſis, roſtro ſerrato, cinereæ ſimilis Marcgravii,	81	30
— Braſilienſis, roſtro ſerrato, ſtellari ſimilis Marcgravii,	81	30
— Canadenſis,	80	11
— candens,	81	15
— candida,	81	15
— candida minor,	81	20
— capite lævi, &c.	78	13
—	78	14
—	81	15
— capite læviuſculo, &c.	81	24
— capite nudo, &c.	80	7
— Carolinenſis candida,	81	18
— caſtanei coloris alia,	81	36
— Cayanenſis criſtata,	81	3
— cinerea,	81	1
—	81	4
— cinerea alia,	81	28
— cinerea altera,	81	45
— cinerea criſtata,	81	1
— cinerea flaveſcens, nova ſpecies,	81	12
— cinerea flaveſcens, nova ſpecies, Marſilli,	81	12
— cinerea major,	81	1
—	81	2
— cinerea major Jonſtoni,	81	1
— cinerea minor,	81	45
— cinerea minor Mexicana,	81	5
— cinerea roſtro craſſiori,	81	45
— cinerea Schwenckfeldii,	81	1

	G.	S.
Ardea cirrata, alba, &c.	80	2
—	81	45
— cœrulea,	81	41
—	81	42
— cœruleo-nigra,	81	42
— criſtâ dependente,	81	1
— criſta flava, &c.	81	41
— criſta occipitis tripenni dependente, &c.	81	45
— criſta ſetoſa erecta, &c.	84	1
— criſtata,	81	2
— criſtata, &c.	81	28
— criſtata maxima Americana,	81	10
— criſtata purpuraſcens,	81	14
— cyanea,	81	42
— ex Ornithologo, (Alia quædam)	81	2
— Freti Hudſonis,	81	7
— fuſca,	81	32
— fuſca, Nova ſpecies,	81	27
— griſea,	81	9
— Hæmatopos,	81	35
— Hæmatopus, Aldrovandi,	81	35
— major griſea criſtata &c.	81	41
— maxima, luteſcens, &c.	81	28
— Mexicana,	81	13
— Mexicana candida,	81	19
— Mexicana cinerea,	81	5
— Mexicana criſtata,	81	11
— Mexicana minima candidiſſima Hernandezii,	81	19
— maxima purpuraſcens,	81	13
— minor,	81	24
— minor alia roſtro arcuato,	81	4
— minor alia roſtro arcuato Aldrovandi,	81	4

	G.	S.
Ardea minor alia vertice croceo,	81	20
— minor, ſubfuſco-griſea, &c.	81	32
— nævia,	81	8
— nigra,	81	21
—	81	22
— nigra, &c.	80	1
— nigra Aldrovandi,	81	22
— nigra Jonſtoni,	81	22
— nigra torquata,	81	2[illegible]
— nivea,	[illegible]	17
— occipite criſta pendula, &c.	81	1
— occipite criſtato, &c.	81	10
—	81	42
— occipite ſubcriſtato, &c.	81	43
— pallida, &c.	81	24
— paluſtris,	81	24
— pavonina,	84	1
— pella Schwenckfeldii,	81	1
— Phœnicea Spatula dicta,	79	3
— plumbea criſtata, &c.	81	42
— Porphyrio,	78	12
— pulla,	81	1
— pulla Schwenckfeldii,	81	1
— purpuraſcens,	81	12
— Quaiotta,	81	33
— quam Sguacco vocant in vallibus dictis Malalbergi, Aldrovandi,	81	37
— roſea, Spatula dicta,	79	2
— roſtro maximè arcuato,	81	4
— roſtro rubro, &c.	80	6
— rubra,	81	34
— rubra Aldrovandi,	81	28
— rubra, Carollina,	78	12
— rubra cirrata,	81	28

	G.	S.
Ardea ſtellaris,	81	24
— ſtellaris altera,	81	29
— ſtellaris Ariſtoteli,	81	24
— ſtellaris criſtata Americana,	81	41
— ſtellaris Geſneri,	81	24
— ſtellaris Geſnero,	81	24
— ſtellaris major,	81	28
— ſtellaris major Ornithologi,	81	28
— ſtellaris minima,	81	43
— ſtellaris minor,	81	24
—	81	32
— ſtellaris Plinio,	81	24
— ſtellaris, tertium genus,	81	29
— ſtellaris, tertium genus Aldrovandi,	81	29
— ſtellaris Willughbeji,	81	24
— ſubcœrulea,	81	[illegible]
— ſubfuſca major, &c.	81	23
— ſuperciliis albis, &c.	80	12
— ſylvatica, &c.	81	23
— ſyncipite nudo papilloſo, &c.	80	11
— varia,	81	39
—	81	45
— varia major Chilienſis,	81	39
— varia Schwenckfeldii,	81	45
— ventre ſubalbo, &c.	80	1
— vertice croceo,	81	20
— vertice nigro, &c.	81	24
— vertice nudo papilloſo, &c.	80	6
— vertice papilloſo,	80	6
— vertice temporibuſque nudis papilloſis, &c.	80	10
— violacea,	81	41
— vireſcens,	81	43

	G.	S.
Ardea Virginiana crista-ta,	81	10
— viride-flavescens, Nova species,	81	26
— viride-flavescens, Nova species Marsili,	81	26
— vulgò Squaiotta dicta Malalbergi, Aldrovandi,	81	33
Ardeæ alia species, quæ vulgò Squaiotta dicitur Malalbergi,	81	33
— aliud genus, quam Sguacco vocant,	81	37
— cinereæ congener,	81	8
— cinereæ tertium genus,	81	8
— cinereæ tertium genus Aldrovandi,	81	8
— congener,	81	22
— congener Aldrovandi,	81	22
— species,	78	4
— species, (Alia)	81	2
—	81	17
—	81	30
— species Marcgravii,	81	15
— species Marsilli,	78	4
— stellaris tertium genus,	81	29
— stellaris tertium genus Aldrovandi,	81	29
Ardeola,	81	40
—	81	46
— Brasiliensis Marcgravii,	81	40
— cinerea,	81	1
— nævia,	81	47
— pulla,	81	1
Arenaria,	72	
—	72	1
—	75	77

	G.	S.
Arenaria cinerea,	72	2
— nostra,	75	17
Arquata,	78	1
— albicans, &c.	78	1
— Aldrovandi,	78	1
— Americana cinerea,	78	11
— Americana cinerea, &c.	80	5
— Americana Phœnicea,	78	12
— cinerea,	78	11
— Gesneri,	78	1
— major,	78	1
— minor,	69	12
—	78	2
— minor Gesneri,	78	2
— minor nostras,	78	2
— Phœnicea,	78	12
Arquatæ congener,	69	12
Aschenfarbener Reger,	81	1
Ascolopax,	77	1
Ash-colour'd Heron from North-America,	81	7
— coloured Heron,	81	1
— coloured Heron, (Lesser)	81	45
Ἀσκαλώπαξ,	77	1
Ἀσκολόπαξ,	77	1
Asterias,	81	24
— (Ardea)	81	24
Ἀστερίας,	81	24
— (Ἐρωδιὸς)	81	24
Ἀστέριας ἐρώδιος, Arist.	81	24
Avestrúz,	62	1
Avis Aldrovandi, (Stella)	66	2
— Aldrovandi, (Tarda)	66	1
— Anglica, (Morinellus)	69	5
— Brasiliana Guara dicta,	78	12
— (Canuti)	75	21
— (Capella)	70	1

	G.	S.
Avis cornuta,	71	4
— dicta, (Stella)	66	2
— Eme,	63	1
—	64	1
— (Emeu)	64	1
— falcata,	78	4
— (Hirundo marina)	73	1
— hospita,	80	2
— peregrina,	80	2
— pietatis cultrix,	80	2
— Porphyrio, Amboinensis,	78	12
— pugnax,	75	18
— pugnax, Aldrovandi,	75	18
— quædam ex rapacibus,	86	1
— quædam quam in Belgio Kemperken vocant,	75	18
— quædam quam in Belgio Pugnacem vocant,	75	18
— sicca,	81	11
— siliquastrini capitis,	87	1
— (Stella)	66	2
— (Tarda)	66	1
— The Stint dicta,	75	10
— vivivora,	79	3
— Xoxouquihaactli,	81	13
Aikoh,	81	1
Autre Beccassine,	75	1
Autruche,	62	
—	62	1
— de Guiane,	63	1
Ayaya,	79	2
Ayron negro,	78	4
Aztatl,	81	15

B.

	G.	S.
Babgach,	81	1
Bach-Amsel,	75	19
Bak,	81	24
Balakzel,	81	1

	G.	V.	S.
Balearica,	84		
—	84		1
— (Grus)	84		1
Bambiaya,	86		1
Baranek,	70		1
—	77		2
Barge,	76		
—	76		1
— Bellonii,	76		6
— blanche,	76		8
— brune,	76		4
— Gallorum,	76		1
— grise,	76		2
— grise, (Grande)	76		3
— rousse,	76		5
— rousse d'Amérique,	76		7
— rousse, (Grande)	76		6
Barker,	76		2
— Albini, (Glareola)	76		2
Bastard Plover,	70		1
Bec à cuiller,	79		1
Bec-llarg,	76		1
Becada,	77		1
Becadell,	77		3
Bécasse,	77		1
— grande,	77		1
— petite,	77		2
Bécasseau,	77		2
Bécassine,	77		2
— d'Étang,	75		3
— (Plus petite espece de)	77		3
Bécasson,	77		2
Beccaroveglia,	79		1
Beccassa,	77		1
Beccasse,	77		
—	77		1
— blanche,	77	A.	1
— de mer,	68		1
Beccasseau,	75		1
—	75		1
Beccassine,	75		2
—	77		2
— (Autre)	75		1

	G.	S.
Beccaſſine blanche,	75	8
— d'Angleterre,	77	5
— de Madraſt,	77	4
— (Mâle de la)	77	3
— (Petite)	77	3
Becquaroveglia,	79	1
Bein, (Rot-)	75	3
— (Rott-)	75	3
Beinen, (Waſſer-Heunlin mit Roten)	75	3
Bekas,	77	2
Belgis Scur-Vogel Marcgravii,	80	4
— vulgò Negro,	80	5
Bengall Water Rail,	75	9
Béquaſſe,	77	1
Berg-Schnepfe,	77	1
— Schneppe,	77	1
Bergeronette,	75	10
Bernard Piſcaira,	81	1
Beyſſer, (Stein-)	75	10
Bicker, (Stein-)	75	10
Bihoreau,	81	45
Bilcock,	74	1
Bill, (American Scarlet Spoon-)	79	3
— (Spoon-)	79	1
Bill'd Bird of America, (Scarlet Spoon-)	79	3
— Heron, (White and Spoon-)	79	1
Bird of America, (Scarlet Spoon-bill'd)	79	3
Biſtard,	66	1
Biſtarda,	66	1
— Alberti magni,	66	1
— Alberto,	66	1
— (Recentiorum)	66	1
Biſtarde,	66	1
Bitarde,	69	12
Bittern,	81	24
— (Brown)	81	32
— (Creſted)	81	41
Bittern, from Hudſon's-Bay,	81	25
— (Little Brown)	81	47
— (Small)	81	32
—	81	43
Bittorn,	81	24
Bittour,	81	24
Black Gaulding,	81	42
— Stork,	80	1
Blaw-Gruner,	70	1
Blawer Reger,	81	1
Blauwer Reigel,	81	1
Blew Gaulding,	81	42
— Heron,	81	3
—	81	42
Blongios,	81	46
— tacheté,	81	47
Blue Gaulding,	81	42
Bluet,	87	1
Bocian,	80	2
— bialy,	80	2
— czarny,	80	1
— ſniady,	80	1
Boczan,	80	2
Boo-onk,	81	46
Boollu Cory,	87	10
Botaurus,	81	24
— Americanus nævius,	81	32
— Braſilienſis,	81	30
— Freti Hudſonis,	81	25
— major,	81	28
— minor,	81	26
— nævius,	81	31
— Ornithologis,	81	24
— Ornithologorum,	81	24
— rufus,	81	29
— ſtriatus,	81	27
Brach-Amſel,	70	2
— hun,	78	1
—	78	2
— hun, (Gallinula quam noſtri vocant)	78	2
—Vogel,	69	1

	G.	S.
Brach-Vogel,	73	1
—	78	1
—	78	2
—	87	7
— Vogel, (Groſſer)	69	1
—	70	2
—	78	1
— Vogel, (Klein)	87	7
— Vogel, (Kleiner)	69	2
Braun-Schwartzer Storch,	80	1
Brauſz-hahn,	75	[illegible]
Brook-Ouzell,	74	[illegible]
Brown and Ash-colour'd Crane,	80	11
— Bittern,	81	32
— Bittern, (Little)	81	47
— Curlew,	78	11
Bruch-Schnepfle,	77	2
Brushane,	75	18
Bubacz,	81	24
Bucacz,	79	1
Bukacz,	81	24
Bunck,	81	24
Bundt Waſſer Heunlin,	75	1
Bundter Reger,	81	45
Buſtard,	66	1
— (Indian)	69	13
— (Little)	66	2
Butio,	81	24
— (Aliis)	81	24
Butor,	81	24
— brun,	81	32
— brun, (Petit)	81	47
— de la Baye de Hudſon,	81	25
— du Bréſil,	81	30
— (Grand)	81	28
— huppé,	81	41
— (Petit)	81	26
—	81	43
—	81	46
— rayé,	81	27
— roux,	81	29

	G.	S.
Butor tacheté,	81	31
— tacheté d'Amérique,	81	32
Butorius,	81	24
Buttour,	81	24
Bybe,	70	1

C.

	G.	S.
[illegible] Ahuitl[illegible]	86	1
Cailles (Mere des)	74	1
— [illegible]	74	3
— [illegible]	74	3
— [illegible]	74	1
—	74	3
Caiamon,	87	1
Calidris,	75	14
— Bellonii,	75	3
— cinerea,	75	21
— griſea,	75	16
— griſea minor,	75	17
— leucophæa,	81	6
— nævia,	75	15
— nigra,	75	4
Callydris nigra,	75	21
Calpetre,	79	1
Camelus,	62	1
— Africanus, pullus, (Struthio-)	62	1
— Americanus Marcgravio, (Struthio-)	63	1
— Americanus, (Struthio-)	63	1
— (Struthio-)	62	1
—	63	1
— (Strutho-)	62	1
Canard de pré de France,	66	2
Cancrofagus,	81	33
— Americanus,	81	39
— Bahamenſis,	81	41
— Braſilienſis,	81	40
— caſtaneus,	81	34
— cœruleus,	81	42
— luteus,	81	37
— major, &c.	83	2

Cancrofagus

	G.	S.
Cancrofagus Philippensis,	81	38
— rufus,	81	35
— rufus nævius,	81	36
— viridis,	81	43
— viridis nævius,	81	44
Canne-petiere,	66	2
— petiere Gallorum,	66	2
Canut,	75	21
Canuti Avis,	75	21
Canutus,	75	21
Capella,	70	1
— Avis,	70	1
— cœlestis,	77	2
— cœlestis Authorum, (Scolopax, quæ)	77	2
— Gazæ,	70	1
Capra,	70	1
Capu d'Aigua,	81	1
Caput chilli nocturnum,	71	4
— nocturnum,	71	4
Cariama,	85	
—	85	1
— Brasiliensibus,	85	1
— Brasiliensibus Marcgravii,	85	1
Carlotte,	69	12
Caroli,	78	1
Casearius,	64	1
Casoar,	64	
—	64	1
Casoaris,	64	1
Cassawar,	64	1
Cassoware,	64	1
Cassowary,	64	1
Casuar,	64	1
Casuarius,	64	
—	64	1
Catcher, (Crab-)	81	32
— (Oyster)	68	1
Cannangoly,	87	10
Cela,	64	1
Cenchramus Nonnullis,	87	7
Cenchramus Plinii,	74	3
Chalidris Bellonii,	75	3
— cinerea,	75	21
— nigra,	75	7
— nigra Bellonii,	75	7
Charadita,	80	2
Charadrios,	69	8
—	69	12
Χαραδριος,	69	8
Charadrius,	69	1
—	69	8
—	69	12
— abdomine rufescente, &c.	69	5
— Ægyptius,	69	7
— Alexandrinus,	69	7
— apricarius,	69	4
— Aristotelis,	69	12
— brevicaudus, &c.	69	12
— cristatus,	69	14
— fasciâ pectorali nigrâ, &c.	69	7
— fasciis pectoris, colli, frontis, genarumque nigris, &c.	69	9
— fuscus, &c.	69	7
— griseus, &c.	69	12
— gulâ, pileo, pectoreque nigris, &c.	69	14
— Lapponicus,	69	5
— nigricans,	75	7
— nigro-lutescente variegatus, &c.	69	4
— nigro, lutescenteque variegato, &c.	69	1
— pectore ferrugineo, &c.	69	5
— pectore nigro, &c.	69	4
—	69	8
— pedibus cinereis, &c.	69	1
— remigibus, pectore, abdomine, pedibusque atris, &c.	69	15

	G.	S.
Charadrius ſpinoſus,	69	15
— ſupra niger, &c.	67	1
— vociferus,	69	9
— Willughby,	69	8
Charlot,	76	1
—	78	1
Chaſida,	80	2
Chattering Plover,	69	[illegible]
Chavarita,	80	[illegible]
Chevalier,	75	[illegible]
—	75	[illegible]
— aux pieds rouges,	75	[illegible]
— aux pieds rouges, (femelle du)	76	[illegible]
— blanc,	75	[illegible]
— cendré,	75	
— d'Italie, (Grand)	67	2
— de Bengale,	75	9
— noir,	75	7
— rayé,	75	5
— rouge,	75	3
—	75	4
— tacheté,	75	6
Χιλορνιθα,	77	1
Chirurgien,	71	2
— brun,	71	4
— noir,	71	3
— varié,	71	5
Chorata,	80	2
Chroſciel,	74	3
Churge,	69	13
Cicognino,	80	2
Ciconia,	80	
—	80	2
—	84	1
— alba,	80	2
— Americana,	80	3
— Braſilienſis,	80	4
— fuſca,	80	1
— fuſca Schwenckfeldii,	80	1
— Guianenſis,	80	5
— nigra,	80	1

	G.	V.	S.
Ciconia nigra Willughbeii,	80		1
Cignus cucullatus,	65		1
Cigogna,	80		2
Cigogne,	80		
—	80		2
— blanche,	80		2
— [illegible],	80		1
— [illegible]rique,	80		3
— [illegible]iane,	80		5
— du [illegible]l,	80		4
— [illegible]	80		1
— [illegible], Eſpece de)	78		13
— [illegible]e,	80		2
[illegible]	80		2
[illegible]ener altera,	75		1
— [illegible]gener prior,	75	A.	10
— genus,	75		2
Cinclus,	72		1
—	75		1
—	75		9
—	7[illegible]		9
—	77		3
— Bellonii,	75		1
— Dominicenſis,	75		12
— Dominicenſis minor,	75		13
— minor,	75	A.	10
— Ornithologi,	75		10
— prior Aldrovandi,	75		10
— quartus,	77		3
— tertius,	75		1
— tertius Aldrovandi,	75		1
— torquatus,	75		11
— Turneri,	75		10
Cirris Virgilii, Scaligeri,	81		35
— Virgilii Scaligero, Aldrovandi,	81		35
Clucking-Hen,	81		23
Coceayauhqui,	80		8
Cochlearia,	79		1
Cochlearius,	83		
—	83		11
— (Anſer)	79		1

	G.	V.	S.
Cochlearius fuscus,	83		2
— nævius,	83	A.	1
Cock, (Jud-)	77		3
— (White Wood-)	77	A.	1
— (Wood-)	77		1
Cocoi,	81		3
—	81		40
— Brasiliensibus,	81		3
— dicta Marcgravio, (Ardea Brasiliensis)	81		3
— primus,	81		40
— secundus,	81		3
— tertius,	81		23
Cocoüan,	74		2
Cognatus, (Numenio)	78		1
Colherado,	79		2
—	79		3
— Marcgravii, (Lusitanis)	79		2
Comaltecatl,	67		2
Combattant,	75		18
Common Heron,	81		1
—	81		2
Congener Aldrovandi, (Ardeæ)	81		22
— Aldrovandi, (Œdicnemo)	66		1
— altera, (Cincli)	75		1
— (Ardeæ)	81		22
— (Arquatæ)	69		12
— (Œdicnemo)	66		1
— (Pardali Bellonii)	70		3
— prior, (Cincli)	75	A.	10
Corbeau de nuit,	81		45
Corlieu,	78		1
—	78		2
— blanc,	78		10
— brun,	78		11
— rouge,	78		12
— (Petit)	76		2
—	78		2
Corlis,	78		1

	G.	V.	S.
Corn-Crek,	74		3
Cornix aquatica,	75		19
Corvus aquaticus,	78		7
— aquaticus Hernandezii,	78		7
— aquaticus Nierembergii,	78		7
— nocturnus Agric.	81		45
Coruz,	69		12
Cory, (Boollu)	87		10
Coturnico-mater Scaligero,	74		3
Coturnicum, (Rex)	74		3
Coturnix,	74		3
— magna,	74		3
Coulon-chaud,	72		
—	72		1
— -chaud cendré,	72		2
Courly,	78		
—	78		1
— blanc,	78	A.	1
— blanc du Brésil,	78		10
— brun d'Amérique,	78		6
— brun du Brésil,	78		11
— d'Amérique, (Grand)	78		8
— d'Amérique, (Petit)	78		9
— de Madagascar,	78		3
— de terre,	69		12
— marron,	78		5
— (Petit)	78		2
— rouge du Brésil,	78		12
— varié du Mexique,	78		7
— verd,	78		4
Cra-cra,	81		39
Crab-Catcher,	81		32
Crabier,	81		33
— bleu,	81		42
— d'Amérique,	81		39
— de Bahama,	81		41
— des Philippines,	81		38
— du Brésil,	81		40
— jaune,	81		37
— marron,	81		34
— roux,	81		35

	G.	V.	S.
Crabier roux tacheté,	81		36
— (Second)	81		3
— verd,	81		43
— verd tacheté,	81		44
Crake, (Water-)	75		19
Crane,	80		6
— (Brown and Ash-coloured)	80		
— from Hudson's-Bay, (Hooping-)	80		
— (Greater Indian)	80		
— (Hooping)	80		
— (Numidian)	80		
— (Red Legged)	67		
Crek, (Corn-)	74		
Crested Bittern,	81		
— Gaulding, (Grey)	81		41
— Heron,	81		2
— Heron, (Largest)	81		10
Crex,	74		3
—	76		2
—	81		13
— Bellonii,	76		2
— Indica, ex albo cinerea, &c.	87		10
— (Oiseau nommé)	76		2
Crotalistria,	80		2
Cryall,	81		16
Cueiller,	79		1
Cuiller, (Bec à)	79		1
Cuilliere,	83		
—	83		1
— brune,	83		2
— tachetée,	83	A.	1
Cul-blanc,	75		1
Curlaca,	78		8
Curicaca,	78		8
— Brasiliensibus,	78		8
— Brasiliensium Marcgravii,	78		8
Curicacæ alia species,	78		9
Curlew,	76		3
—	76		7

	G.	S.
Curlew,	78	1
— (Brown)	78	11
— (Jack-)	78	1
— (Leller)	78	2
— of Brasil, (Scarlet)	78	12
— (Red-)	78	12
— [illegible]	69	12
[illegible]	78	1
[illegible]	78	10
[illegible]	78	1
[illegible]	75	17
[illegible]	75	17
[illegible] llatus,	65	1
[illegible] Nierember- [illegible]	65	1
[illegible]	81	1
[illegible]	70	1
Czajka,	70	1
Cziap,	80	2
Cziepie,	81	1
Czieyka,	70	1

D.

	G.	S.
DAker-Hen,	74	3
Dam, (Ros-)	81	24
Deer, (Kill-)	69	9
Dessyt,	87	8
Deiutha,	80	2
Demoiselle de Numidie,	80	12
— of Numidia,	80	12
Derkacz,	74	3
Deux-pour-un,	77	3
Dixhuit,	70	1
— Gallorum,	70	1
Dod aers,	65	1
Dodo,	65	1
— Lusitanorum,	65	1
Dommel, (Rei-)	81	24
Domp-horn,	81	24
Domps-horn,	81	24
Dorada,	69	1
Dotralle de la Province de Lincoln,	69	6
— des Anglois,	69	1

	G.	S.
Dotterel,	69	5
— (Sea-)	72	1
Dotterell,	69	5
Dotteril,	69	5
Dottrel,	69	6
— (Sea-)	72	1
—	72	2
Dottrell,	69	5
— (Sea-)	72	1
Drosa,	66	[illegible]
Dronte,	[illegible]	[illegible]
—	65	1
Drop,	66	1
Drum, (Mire-)	81	24
— (Roer-)	81	24
Drumbel, (Mire-)	79	1
Drummel, (Rohr-)	81	24
Duck, (French Field)	66	2
Dummel, (Ror-)	81	24
Dump, (Ros-)	81	24
Dumpf, (Ros-)	81	24
[illegible],	77	5
— Septentrionalium Anglorum D. Johnson,	77	5

E.

	G.	S.
EBeher,	80	2
Echaſſe,	67	
—	67	1
— du Mexique,	67	2
Eggenſchaer,	87	5
Eggenſchar,	87	5
Egret,	81	16
Egretta,	81	16
— Gallorum,	81	16
Elaphis,	76	1
Elbiger,	80	2
Ἐλώριος,	78	1
Ema,	62	1
—	63	1
—	80	6
— di Gei,	62	1
Ema Luſitanis Marcgravio,	63	1
Eme,	64	1
— Aldrovandi,	64	1
— (Avis)	63	1
—	64	1
— Cluſii,	64	1
— Nierembergii,	64	1
Emeu,	63	1
—	64	1
— Aldrovandi,	64	1
— Avis,	64	1
— Cluſii,	64	1
— Nierembergii,	63	1
—	64	1
— nigricans, &c.	63	1
— pennis ſetoſis, &c.	64	1
Erdboull,	81	24
Ερωδιὸς,	81	1
—	81	2
Ἐρώδιος, Ariſt. (Ἀςέριας)	81	24
Ἐρωδιὸς ἀςερίας,	81	24
— λευκος,	81	15
Erythra,	87	7
— (Gallinula)	87	7
— Geſneri, (Gallinula)	87	7
Erythrontaon Olai magni,	66	1
Erythropos,	75	3
— major Ornithologi, (Gallinula)	75	3
— minor, (Gallinula)	73	1
Erythropus,	75	3
— (Gallinula)	75	3
— major,	75	3
— major, (Gallinula)	75	3
— major Geſneri, Aldrovando, (Gallinula)	75	3
— major Geſneri, (Gallinula)	75	3
— minor,	73	1
— minor, (Gallinula)	73	1

	G.	S.
Erythropus primus Gesneri,	75	3
Espatule,	79	2
— rouge,	79	3
Espece de Cigogne noire,	78	13
— de Héron,	81	45
Exul hyemis,	80	2
Eye, (Hawk's-)	69	4
— (Ox-)	75	[illegible]

F.

	G.	S.
Falcata,	78	[illegible]
Falcinello,	78	[illegible]
Falcinellus,	78	[illegible]
— Aldrovandi,	78	4
— Aldrovandi colore furvo,	78	4
— Gesneri,	78	4
— Gesneri colore furvo,	78	4
— puniceo-viridis,	78	4
Falconellus puniceo-viridis, Marsilli,	78	4
Falunt d'acqua,	75	19
Fasanella,	66	2
Fauser,	81	24
Fedoa,	75	3
—	76	7
— altera,	76	1
— nostra secunda,	76	1
— nostra tertia,	69	12
— secunda,	76	1
Fedoæ tertia species,	69	12
Femelle du Chevalier aux pieds rouges,	76	3
Feussel, (Geel-)	87	6
— (Greun-)	75	1
— (Rot-)	75	3
Field Duck, (French)	66	2
Filicetta,	70	1
Flamant gris,	78	11
— rouge,	78	12
Focke,	81	45

	G.	S.
Focker,	81	45
Folot d'acqua,	75	19
Forzane,	74	1
Foulque d'eau de l'Amérique, (Petite)	87	9
Fouton,	77	3
Francolin,	76	6
— à poitrine rouge,	76	5
— [illegible] la Baye de [illegible],	76	8
— [illegible] Amérique, [illegible])	76	7
[illegible] Duck,	66	2
[illegible] Vogel,	67	1
[illegible] calva, &c.	87	1
— [illegible] unculata, [illegible]	71	5
— [illegible],	71	5
Fuser,	81	24
Fysterlin,	75	2

G.

	G.	S.
Gabilan,	80	6
Galerand,	81	24
Galgulus Aliorum,	69	8
Galla mareza,	74	1
Gallina aquatica, minor, &c.	71	2
— arciera,	77	1
— novalis media,	69	1
— novalis minor Schwenckfeldii,	69	2
— rustica,	77	1
— rusticella,	77	1
— salvatica,	77	1
— sega,	87	4
Gallinaceus Gallus peregrinus,	65	1
— peregrinus Clusii, (Gallus)	65	1
Gallinæ aquaticæ species prima de novo adjecta,	74	1

	G.	S.
Gallinæ aquaticæ species secunda de novo adjecta,	75	1
Gallinaginis genus nomine ignoto,	74	1
Gallinago,	77	1
—	77	2
— Anglicana,	77	5
— cinerea,	74	1
— cinerea major,	76	1
— Gazæ,	[illegible]	1
—	77	2
— Maderaspatana,	77	4
— Maderaspatana, &c.	77	4
— maxima,	77	1
— minima,	77	3
— minima, &c.	75	10
— minima Bellonii,	77	3
— minor,	77	2
—	77	3
— minor Aldrovandi,	77	2
[redacted]r Bellonii,	77	2
— minor Willughby,	77	2
— Serica dicta,	74	1
— sylvestris aquatica,	78	13
— tertia Bellonii,	77	3
— vulgaris minor,	77	2
Gallinaza,	77	1
Gallinella,	77	1
Gallinula aquatica,	83	2
— aquatica octava Gesneri,	75	1
— aquatica Ornithologis,	87	6
— aquatica quarta Gesneri,	87	6
— Brasiliensibus Jacana dicta Marcgravii,	71	1
— Brasiliensis Aguapecaca dicta,	71	2
— Brasiliensis, Jacana dicta,	71	1
— Brasiliensis quarta Marcgravii,	71	4
Gallinula Brasiliensis tertia Marcgravii,	71	3
— Chloropos Ornithologi,	87	4
— Chloropus, rarior species,	74	1
— Chloropus tertia,	87	4
— Erythra,	87	7
— Erythra Gesneri,	87	7
— Erythropos minor,	73	1
— Erythropos major Ornithologi,	75	3
— Erythropus,	75	3
— Erythropus major,	75	3
— Erythropus major Gesneri,	75	3
— Erythropus major Gesneri Aldrovando,	75	3
— Erythropus minor,	73	1
— Gesneri, (Phæopus)	78	2
— Holosericea,	74	1
— Hypoleucos,	75	2
— Melampos,	73	3
— Melampus Aldrovandi,	73	3
— Melampus Aldrovando,	73	3
— Melampus Gesneri,	73	3
— Melampus Gesnero,	73	3
— Melampus Willughbeji,	73	3
— Melampus Willughby,	73	3
— minor Aldrovandi, (Poliopus)	87	8
— novalis minor,	87	7
— Ochra,	74	2
—	75	1
— Ochra Gesneri, Aldrovandi,	74	2
— Ochropus,	75	1
— Ochropus major,	87	6

G. V. S.

Gallinula Ochropus major Gesnero, Aldrovandi, 87 6
— Ochropus medius, 75 1
— Ochropus minor, 73 2
— paluftris, 87 A. 1
— pedibus nigricantibus, 75 7
— pedibus nigris, 75
— pedibus viridibus, 75
— Phæopos altera, 78
— Phæopus, 78
— Phœnicopos, 75
— Phœnicopus Gefneri, 75
— quam noftri vocant Brach-hun, 78 2
— Rhodopos, 75 1
— Rhodopus, 75 1
— Rhodopus Gefneri, 75 1
— ferica, 74 1
— ferica Aldrovandi, 74 1
— ferica dicta, 74 1
— ferica Gefneri, 74 1
— terreftris, 87 5
— terreftris Aldrovandi, 87 5
Gallinulæ aquaticæ decimum genus, 74 2
— aquaticæ duodecimum genus, 73. 2
— aquaticæ nonum genus, 87 7
— aquaticæ octavum genus, 75 1
— aquaticæ primum genus, 75 3
— aquaticæ quartum genus, Schmirring dictum, 87 6
— aquaticæ quintum genus, 75 1
— aquaticæ fecundum genus, 87 4
— aquaticæ feptimum genus, 73 3

G. S.

Gallinulæ aquaticæ fextum genus, 75 2
— aquaticæ fpecies, 75 19
— aquaticæ tertium genus, 87 8
— aquaticæ undecimum [illegible]nus, 73 1
[illegible]omine ignoto, 74 1
[illegible]æ genus, 76 3
[illegible]æ genus aliud, 76 2
[illegible]linaceus pere[illegible]s Clufii, 65 1
[illegible]us, (Gallina[illegible]) 65 1
[illegible] 75 4
[illegible]ndi, 75 4
[illegible]ta, 75 4
Gans, (Loeffel-) 79 1
— (Trapp-) 66 1
Ganfs, (Heer-) 81 1
— (Herr-) 81 1
— (Trapp-) 6[illegible]
Ganta, 80 2
Garriga, (Toru de) 81 28
Garza, 81 1
— 81 15
— bianca, 81 16
— biancha, 81 15
— Lufitanis, 81 15
Garzetta, 81 16
— Aldrovandi, 81 16
— bianca, 81 15
— 81 16
— dicta Aldrovandi, 81 16
— Gefneri, 81 16
— Italorum, 81 16
Gavia Brachyptera, vocifera, 69 9
— cinerea, 70 2
— cinerea Eberi, 70 1
— cinerea Peuceri, 70 1
— Indica, 69 13
— littoralis, 69 8

Gavia

	G.	V.	S.
Gavia Morinella altera,	69		6
— Morinellus simpliciter,	69		5
— quæ Pluvialis arenaria nostra, Raji,	72		1
— rostro virescente, &c.	69		12
— viridis,	69		1
— vulgaris,	70		1
Gaulding, (Black)	81		42
— (Blew)	81		42
— (Blue)	81		42
— (Grey Crested)	81		41
— (Largest White)	81		15
— (White)	81		15
Gazæ Hiaticula,	69		8
Gazola,	81		24
Geel-Feussel,	87		6
Geisz, (Himel-)	78		1
— (Himels)	77		2
— -Vogel,	78		1
Gelvæ,	81		24
[illegible],	81		24
Γερανὸς,	80		6
Germanis Nycticorax,	81		45
Γερανες,	80		6
Gerzab,	80		6
Geschecke Mott Heunle,	75		1
Giarola,	73		3
Giarolo,	75		1
—	75		10
—	75	A.	10
Giaroncello,	75		1
—	75		10
—	75	A.	10
— Italis dicta, (Tringa tertia Aldrovandi)	75		1
Gid-Snipe,	77		3
Gillerdine,	87		8
Giloch,	78		1
Ginocchiella,	70		5
— vulgò,	70		5
Girardel,	76		3
Girardella Columba,	87		8

	G.	S.
Girardello,	78	2
Girardin,	74	2
Girardina,	74	2
Girone,	81	15
Glareola,	73	
—	73	1
—	73	3
—	75	1
— alia primæ similis, &c.	75	4
— (Aliis)	87	6
— Barker, Albini,	76	2
— castanea,	75	15
— nævia,	73	3
— nona,	87	7
— nona Schwenckfeldii,	87	7
— octava,	75	1
— octava Schwenckfeldii,	75	1
— prima,	75	3
— prima Schwenckfeldii,	75	3
— pugnax,	75	18
— quarta,	75	1
— quarta Schwenckfeldii,	75	1
— quinta,	73	2
— quinta Schwenckfeldii,	73	2
— secunda,	73	1
— Senegalensis,	73	4
— sexta,	74	1
— septima,	74	1
— septima Schwenckfeldii,	74	1
— tertia,	87	6
— tertia Schwenckfeldii,	87	6
— torquata,	73	2
Glottis,	76	3
—	87	4
— Aldrovandi,	76	3
— Baltnero,	76	3
— Gesneri,	76	3

	G.	S.
Γλωττὶς,	60	3
Glutt,	76	3
—	87	4
Goat-head,	76	1
Godwit,	76	1
—	76	6
— from Hudson's-Bay, (White-)	76	[illegible]
— (Greater American)	76	7
— (Red-breasted)	76	[illegible]
Goose of America, (Spur-wing'd)	71	[illegible]
Gorriones de Oviedo,	69	1
Grand Butor,	81	28
— Chevalier d'Italie,	67	1
— Courly d'Amérique,	78	8
— Francolin de l'Amérique,	76	7
— Héron hupé,	81	10
— Pluvier,	69	12
— Pluvier de Bengale,	69	13
— Vanneau de Bologne,	70	5
Grande Barge grise,	76	3
— Barge rousse,	76	6
— Grue de la Baye de Hudson,	80	10
— Grue des Indes,	80	7
Grase-Schnepff,	77	2
Grass-Schnepff,	77	2
Graver Keuwit,	70	2
Grauer Reigel,	81	1
Grawer Gyfitz,	70	2
Grauwer Reigel,	81	1
Great White Heron,	81	15
Greater American Godwit,	76	7
— Indian Crane,	80	7
Greatest Snipe,	69	11
Green Plover,	69	1
Gren Legged Horseman,	76	3
Greny,	78	1
Greun-Feussel,	75	1
Greuner Keuwit,	69	1
Grey Crested Gaulding,	81	41
— Plover,	69	1
—	70	2
— Snipe With à White neck, (Larger)	69	11
Griel,	69	12
Grinetta,	87	8
[illegible]-d'eau,	75	20
[illegible]ffer Hunle,	87	5
[illegible]ach-Vogel,	69	1
— [illegible]	70	2
—	78	1
— [illegible]igel,	81	28
[illegible],	77	1
[illegible]er Heunle,	87	5
[illegible]	80	6
[illegible],	80	6
Grue,	80	6
— blanche de l'Amérique,	80	10
— brune & cendrée,	80	11
— d'Amérique,	8[illegible]	[illegible]
— de la Baye de Hudson,	80	11
— de la Baye de Hudson, (Grande)	80	10
— de Numidie,	80	12
— des Indes, (Grande)	80	7
— des Indes Orientales,	80	7
— du Japon,	80	9
— du Mexique,	80	8
Grugnetto,	87	8
Grúlla,	80	6
Gruner,	70	1
— (Blaw-)	70	1
Grus,	80	6
— Americana,	80	10
— Balearia, Aldrovandi,	84	1
— Balearia Willughbeji,	84	1
— Balearica,	84	1
— Balearica Aldrovandi,	84	1
— Balearica Plinii,	84	1

	G.	S.
Grus Capensis fusca, &c.	84	1
— cinerea ferrivora,	63	1
— crispa,	81	24
— Freti Hudsonis,	80	11
— Japonensis,	80	9
— Japonensis alia,	80	9
— Japonensis Charletoni,	80	9
— Japonica,	81	1
— Japponensis,	80	[illegible]
— incurvato rostro, &c.	80	5
— Indica,	80	8
— Indica major,	80	7
— Indica Willughbeji,	80	8
— Mexicana,	80	8
— nostras,	80	6
— Numidiæ,	80	12
— Numidica,	80	12
— Orientalis Indica,	80	7
Gruz,	80	6
Guacu Brasiliensibus Marcgravio, (Nhandu-)	63	1
— Brasiliensibus, (Nhandu-)	63	1
— (Jabiru-)	80	4
— (Nhandu-)	63	1
— Petiguaribus, (Jabiru-)	80	4
— Petiguaribus Marcgravii,	80	4
Guara,	78	6
—	78	12
— Brasilianis dicta,	78	12
— Brasiliensibus,	78	12
— Brasiliensibus Marcgravii,	78	12
— dicta, (Avis Brasiliana)	78	12
Guaranna,	78	6
— Brasiliensibus,	78	6
— Brasiliensibus Marcgravii,	78	6

	G.	S.
Guignard,	69	5
— d'Angleterre,	69	6
Guignette,	75	2
Guinetta,	75	2
Guira-tinga,	81	15
— tinga Brasiliensibus,	81	15
— tinga Brasiliensibus Marcgravii,	81	15
Gulguruk,	10	1
Gustard,	66	1
Gybitz,	70	1
Gybytz,	70	1
Gysitz,	70	1
— (Grawer)	70	2
Gyvitt,	70	1
Gywitt,	70	1

H.

	G.	S.
HAeger,	81	1
Hæmastica,	76	5
Hæmantopus,	67	1
Hæmatopos, (Ardea)	81	35
Hæmatopus,	67	1
—	68	1
— Aldrovandi, (Ardea)	81	35
— Bellonii,	68	1
— marinus, (Oiseau appellé)	68	1
Haer-Sneff,	77	2
Hahn, (Brausz-)	75	18
Half-Schnepf,	77	3
— Snipe,	77	3
Hanikens,	78	1
Har-Schnepf,	77	2
Haus-Teuffel,	75	18
Hawk's-Eye,	69	4
Head, (Goat-)	76	1
Heer-gansſ,	81	1
— Schnepfe,	77	2
— Schnepff,	77	2
Hegesar,	87	5
Hegeschara,	87	5
Heggeschaer,	87	5

	G.	S.
Heggeſchar,	87	5
Heggſchaer,	87	5
Hen, (Clucking-)	81	23
— (Daker-)	74	3
— (Little American Water)	87	9
— (Maderas Rail-)	87	10
— (Small Water-)	87	[illegible]
Herodias,	81	[illegible]
Héron,	81	[illegible]
—	81	[illegible]
—	81	[illegible]
—	81	[illegible]
—	81	[illegible]
—	81	[illegible]
— blanc,	75	[illegible]
—	81	[illegible]
— blanc de la Caroline,	81	18
— blanc de M. Oldham,	75	7
— blanc du Bréſil,	81	17
— blanc du Mexique,	81	19
— blanc, (Petit)	81	18
—	81	20
— bleu,	81	3
—	81	42
— cendré,	81	1
—	81	4
— cendré d'Amérique,	81	6
— cendré de l'Amérique Septentrionale,	81	7
— cendré du Mexique,	81	5
— de la Baye de Hudſon,	81	7
— du Bréſil,	81	23
— (Eſpece de)	81	45
— étoilé,	75	18
— gris,	81	9
— hupé,	81	2
— hupé de Cayenne,	81	3
— hupé de Virginie,	81	10
— hupé du Mexique,	81	11
— hupé, (Grand)	81	10
— noir,	81	21
— noir à collier,	81	22

	G.	S.
Héron ordinaire,	81	1
— (Petit)	79	1
— pourpré,	[illegible]	[illegible]
— pourpré du M[illegible]que,	[illegible]	[illegible]
— pourpré hupé,	[illegible]	[illegible]
— [illegible]ché,	[illegible]	[illegible]
He[illegible],	[illegible]	[illegible]
— [illegible]-coloured)	[illegible]	[illegible]
— [illegible])	[illegible]	[illegible]
— [illegible]	[illegible]	[illegible]
— (Comm[illegible]n)	[illegible]	[illegible]
— [illegible]	[illegible]	2
— ([illegible])	81	2
— [illegible]-America, ([illegible]-colour'd)	81	7
— (Gre[illegible] White)	81	15
— (Large[illegible] Creſted)	81	10
— (Leſſer Ash coloured)	81	45
— (Little White)	81	18
— (Red Legg'd)	81	16
— (Scythe-bill'd)	7[illegible]	[illegible]
— (White)	81	15
— (White and Spoon-bill'd)	79	1
Herr-ganſs,	81	1
Heunle, Geſcheckt Mott)	75	1
— (Groſz Waſſer)	87	5
— (Schwartz Waſſer)	74	1
Heunlein, (Aeſch-)	74	1
— (Waſſer-)	73	3
Heunlin, (Aeſch-)	74	1
— (Bundt Waſſer)	75	1
— mit Roten beinen, (Waſſer-)	75	3
— (Mott-)	74	1
— (Waſſer-)	77	2
Heyron,	81	1
Hiaticula,	69	8
— (Gazæ)	69	8
— Willughby,	69	8
Himantopus,	67	
—	67	1

	G.	S.
Hymantopus caſtaneus, &c.	67	1
— corpore gracili, &c.	68	1
— Maderaſpatanus, &c.	67	1
— Mexicanus,	67	2
— Plinii,	67	1
— Plinii, Aldrovandi,	67	1
Himel-Geiſz,	78	1
Himels Geiſz,	77	2
— Ziege,	77	2
Himmel-Ziege,	76	1
Himmels-Ziege,	77	2
Hirundinis ripariæ ſpecies,	73	1
Hirundo marina,	73	1
— marina Aldrovandi,	73	1
— marina Avis,	73	1
Hoactli,	81	11
— (Xoxouhqui-)	81	5
—	81	11
— (Xoxouqui-)	81	5
[redacted],	81	5
—	81	11
Hoen, (Water-)	71	1
Hoitzilaztatl,	81	19
— dicta Hernandezii,	81	19
Holtz-Schnepfe,	77	1
— Schnepff,	75	14
— Schneppe,	77	1
Hooping Crane,	80	10
— Crane from Hudſon's-Bay,	80	10
Horn, (Domp-)	81	24
— (Domps-)	81	24
Horſeman, (Green Legged)	76	3
— (Red Legged)	75	4
Horſgjoek,	75	1
Hortybel,	81	24
Hovare,	80	2
Houn, (Meer-)	76	2
—	76	3
Houtarde,	66	1

	G.	S.
Huitres, (Preneur d')	68	1
Huitrier,	68	
—	68	1
Hun, (Brach-)	78	1
—	78	2
— (Gallinula quam noſtri vocant Brach-)	78	2
— (Schnep-)	77	1
— (Schnepff-)	77	1
— (Waſſer)	87	6
— (Water-)	71	1
Hunle, (Groſſe Waſſer)	87	5
Hutti,	69	1
Hypoleucos,	75	2
— (Gallinula)	75	2

I.

	G.	S.
Jabiru,	80	5
— Braſilienſibus,	80	5
— Braſilienſibus Marcgravii,	80	5
— Braſilienſium Marcgravii,	80	5
— -Guacu,	80	4
— -Guacu Petiguaribus,	80	4
— -Guacu Petiguaribus, Marcgravii,	80	4
Jaboûtra,	81	39
Jacana,	71	
—	71	1
— armata,	71	2
— armata fuſca,	71	4
— armata nigra,	71	3
— armata varia,	71	5
— armé,	71	2
— Braſilienſibus,	71	1
— dicta, (Gallinula, Braſilienſis)	71	1
— dicta Marcgravii, (Gallinula Braſilienſibus)	71	1
Jacanæ alia ſpecies, Braſilienſibus Aguapecaca dicta,	71	2

	G.	S.
Jacanæ quarta ſpecies,	71	4
— tertia ſpecies,	71	3
Jack-Curlew,	78	1
— Snipe,	77	3
Jacuah,	62	1
Iandou,	63	1
Iardu,	63	1
Ibidis ſpecies,	78	[illegible]
Ibis,	78	
—	78	[illegible]
—	78	[illegible]
— alba Herodoto,	80	2
— Bellonii,	78	3
— blanc,	78	14
— candida,	78	14
— nigra,	78	13
— nigra Bellonii,	78	13
— non ex toto nigra,	78	14
Ἶβις,	78	13
Icterus,	69	8
Jeheras,	78	13
Jelvé,	77	2
Ἱμαντόπους,	67	1
Indian Buſtard,	69	13
— Crane, (Greater)	80	7
Interpres,	72	1
Jochualcuachili,	71	4
Jud-Cock,	77	3
Junco,	75	10
— Bellonii,	75	10
Junger Kranich,	80	6
Jut-Vogel,	78	1

K.

	G.	S.
KAath,	79	1
Καλίδρις,	75	3
Kamichy,	86	
—	86	1
Kapoüa,	71	2
Kaſper,	74	3
Kemperken,	75	18
Kemperken vocant, (Avis quædam quam in Belgio)	75	18
Keuwit, (Graver)	70	2
— (Greuner)	69	4
Kifitz,	70	1
[illegible],	75	1
—	75	[illegible]
[illegible]	80	[illegible]
[illegible]	6[illegible]	[illegible]
[illegible]	7[illegible]	[illegible]
Ki[illegible]it,	7[illegible]	
[illegible],	80	6
[illegible]-Vogel,	87	7
[illegible]-Vogel,	69	2
[illegible]arren, ([illegible]orn)	74	3
Knechte, ([illegible]lte)	74	3
Knillis, (Rot-)	73	3
Knot,	75	21
— agri Lincolnienſis,	75	21
— Lincolnienſibus,	75	21
Knuſſell Leonardi Baltneri, (Rot-)	73	3
Kobel Regerlin,	73	1
Koenig, (Wachtel)	74	3
— (Wachteln)	74	3
Kokoſka,	73	3
Kokoſzká wodná,	87	6
Koppriegerle,	73	1
Korn knarren,	74	3
Κόρλυφος ἔνυδρος,	75	19
Kou, (Moſs-)	81	24
Kowipa,	70	1
Kozielek,	70	1
—	77	2
Κυκκῷα,	80	2
Kran,	80	6
Kranch,	80	6
Krane,	80	6
Kranich,	80	6
— (Junger)	80	6
Κρέξ,	74	3
Krye,	80	6

	G.	S.
Kuh, (Moos-	81	24
Kunner, (Velvet)	74	1
Kurlu,	78	1
Kuvitz,	70	1
Kuw, (Mos)	81	24
Kyvitta fuſca,	70	2
— *Schwenckfeldii*,	70	1
Kyuutz,	70	1
L.	G.	S.
LAhul,	69	5
Land Rail,	74	3
Lap-wing,	70	1
— wing Plover,	70	1
Larger Grey Snipe, With à White neck,	69	11
Largeſt Creſted Heron,	81	10
— (White Gaulding)	81	15
Lark, (Sea-)	69	8
Leaſt-Snipe,	75	10
Leepelaer,	79	1
[redacted]	79	1
Legged Horſeman, (Red)	75	4
Leglék,	80	2
Leheras,	78	13
Lepelaer,	79	1
—	79	2
—	79	3
Lepler,	79	1
Lerlichirollo,	75	19
Leſſer Ash coloured Heron,	81	45
— Curlew,	78	2
Leucorodia,	79	1
Leucorodios,	81	16
Leucorodius,	79	1
— Willughbei,	79	1
— Willughbeii,	79	1
Leverſina,	76	3
Λευκερώδιος,	81	15
Λευκοροδιὸς,	79	1
Λευκορωδιὸς,	79	1
Limoſa,	76	
Limoſa,	76	1
—	76	3
— Americana rufa,	76	7
— candida,	76	8
— fuſca,	76	4
— griſea,	76	2
— griſea major,	76	3
— rufa,	76	5
— rufa major,	76	6
— Venetorum,	76	3
Lingulaca Gazæ,	76	3
Little American Water Hen,	87	9
— Brown Bittern,	81	47
— Buſtard,	66	2
— White Heron,	81	18
Loculator,	78	8
Loeffel-Gans,	79	1
Loeffler,	79	1
Lohong,	66	3
Longlegs,	67	1
Looper, (Strand-)	75	10
Los-rind,	81	24
Luſitanis Colherado, Marcgravii,	79	2
Lyſsklicker,	75	10
M.	G.	S.
MAchuautha,	80	2
Macuarta,	80	2
Maderas Rail-Hen,	87	10
Maguari,	80	3
— Braſilienſibus,	80	3
— Braſilienſibus Marcgravii,	80	3
Mâle de la Beccaſſine,	77	3
Mall-Snaeppa,	77	2
Maroüette,	74	2
Marſpitt,	68	1
Martinete peſcador,	81	11
Maruetta,	74	2
Maſarino,	78	8
Mathoen,	67	1

	G.	S.
Matkern ,	87	7
Matkneltzell Leonardi Baltneri,	87	7
Mattkern ,	87	7
Mattknillis ,	75	1
Matuitui ,	69	8
—	78	9
— Brasiliensibus ,	69	8
Maubéche ,	75	11
— grise ,	75	16
— grise , (Petite)	75	17
— tachetée ,	75	15
Meer-houn ,	76	2
—	76	3
— rind ,	81	24
Melampos , (Gallinula)	73	3
Melampus,	73	3
— Aldrovandi , (Gallinula)	73	3
— Aldrovando , (Gallinula)	73	3
— Gesneri, (Gallinula)	73	3
— Gesnero, (Gallinula)	73	3
— Willughbeji , (Gallinula)	73	3
— Willughby , (Gallinula)	73	3
Mere des Cailles ,	74	1
—	74	3
Merle-d'eau ,	75	19
Merlo aquaiolo grande ,	67	1
Merula aquatica ,	75	19
— aquatica Ornithologi,	75	19
— novalium ,	70	2
— rivalis ,	75	19
Mire-Drum ,	81	24
— Drumbel ,	79	1
Molliceps Aristotelis ,	77	2
Monk-Swan of S. Maurice's Island ,	65	1
Moos-Kuh ,	81	4
Morinelia altera, (Gavia)	69	6
Morinellus,	69	5
Morinellus Anglicanus ,	69	6
— Anglorum ,	69	5
— Avis Anglica ,	69	5
— marinus D. Brown ,	72	1
— simpliciter , (Gavia ,	69	5
Morkulla ,	77	[illegible]
Mos,	81	24
— Kuw,	81	[illegible]
— [illegible] ,	[illegible]	[illegible]
[illegible] ,	[illegible]	[illegible]
— Ochs ,	81	24
— [illegible] ,	81	24
— [illegible] ,	81	24
Mosz-Ziege ,	81	24
[illegible] maritima ,	75	10
— pectore albo , &c.	75	19
Motacillæ genus ,	75	2
Mott Heunle,(Geschecke)	75	1
— Heunlin ,	74	1
Mycteria Americana ,	80	4
Myrpytta ,	69	4

N.

	G.	S.
NAamitha ,	62	1
Nacht-rab ,	81	45
— rabe ,	81	45
— ram ,	81	45
Neamah ,	62	1
Negro ,	80	5
Neppe ,	77	1
Nhandu apoa ,	80	4
— apoa Tupinambis ,	80	4
— apoa Tupinambis , Marcgravii ,	80	4
— -guacu ,	63	1
— -guacu Brasiliensibus,	63	1
— -guacu Brasiliensibus Marcgravio ,	63	1
Nicticorax Gesneri ,	81	45
Night-Raven ,	81	45
Numenius ,	78	
—	78	1
— albus ,	78	10

	G.	V.	S.
Numenius Aldrovandi,	78		1
— Americanus fuſcus,	78		6
— Americanus major,	78		8
— Americanus minor,	78		9
— Braſilienſis candidus,	78		10
— Braſilienſis coccineus,	78		12
— Braſilienſis fuſcus,	78		11
— candidus,	78	A.	1
— capite lineis quatuor, &c.	77		2
— caſtaneus,	78		5
— fuſcus,	78		11
— Geſneri,	78		1
— holoſericus,	78		13
— Indicus,	78		12
— Indicus Cluſii,	78		12
— Jonſtoni,	78		1
— Madagaſcarienſis,	78		3
— major,	78		1
— medius,	76		1
— Mexicanus varius,	78		7
— minor,	78		2
— niger,	78		8
— pedibus vireſcentibus, &c.	76		3
— pullus ſubtus albidus,	70		2
— puniceo-viridis,	78		4
— roſtri apice lævi, &c.	77		1
— roſtro arcuato, &c.	78		1
—	78		2
— ruber,	78		12
— ſubaquilus,	78		4
— veterum,	78		1
— viridis,	78		4
— uropygio albo, &c.	76		1
Numenio cognatus,	78		1
Numidian Crane,	80		12
Nyćticorax,	81		45
— (Germanis)	81		45
— Ornithologi,	81		45

O.

	G.	S.
Ochs, (Moſs-)	81	24
Ochſe, (Moſs-)	81	24
Ochſz, (Waſſer-)	81	24
Ochra,	74	2
— (Gallinula)	74	2
—	75	1
— Geſneri, Aldrovandi, (Gallinula)	74	2
Ochropus,	75	1
— (Gallinula)	75	1
— magnus,	87	6
— magnus Geſneri,	87	6
— major, (Gallinula)	87	6
— major Geſnero, Aldrovandi, (Gallinula)	87	6
— medius.	75	1
— medius, (Gallinula)	75	1
— medius Geſneri,	75	1
— minor,	73	2
— minor, (Gallinula)	73	2
Odeboer,	80	2
Odenſwala.	80	1
Oedicnemo congener,	66	1
— congener Aldrovandi,	66	1
Oedicnemus,	69	12
— Bellonii,	69	12
Ὀιδίκνημος,	69	12
Oiſeau appellé Hæmatopus marinus,	68	1
— de Riviere,	78	8
— nommé Crex,	76	2
— pourpré,	87	1
— Royal,	84	
—	84	1
Ὀκνὸς,	81	24
— Ariſtotelis,	81	24
Olive,	66	2
Ombrette,	82	
—	82	1

	G.	V.	S.
Onk, (Boo-)	81		46
Onocrotalus. Americanus, &c.	83		1
—	83	A.	1
Onouré des bois,	81		23
Ortygometra,	74		3
— Aldrovandi,	74		
— alis fuscis,	74		[illegible]
— alia rufo-ferrugineis,	74		[illegible]
— Bellonii,	74		1
— Gesneri,	74		[illegible]
— melina, &c.	66		[illegible]
— subtus albescens, &c.	74		[illegible]
— tota rufa, &c.	74		[illegible]
Ὀρτυγομήτρα,	74		[illegible]
Ostarde,	66		1
—	69		12
Ostardeau,	69		12
Ostralega,	68		
—	68		1
Ostralegus,	68		1
Ostrich,	62		1
Ostridge,	62		1
Otarde,	66		1
Ὠτίδα,	66		1
Otis,	66		
—	66		1
— Aldrovandi,	66		1
— Arabica,	66		3
— Aristotelis,	66		1
— auribus erecto-cristatis,	66		3
— capite juguloque lævi,	66		2
— Græcis,	66		1
— jugulo utrinque cristato,	66		1
— minor,	66		2
Ὠτὶς,	66		1
Otus plumbeus,	80		12
Outarde,	66		
—	66		1
—	69		12

	G	S.
Outarde d'Arabie,	66	3
— des Indes,	69	13
— (Petite)	66	2
Ouwewaer,	80	2
Ouzel, (Water-)	75	19
Ouzell, (Brook-)	74	1
[illegible]	75	10
[illegible]	80	2
[illegible]	66	1
[illegible],	68	1
[illegible],	66	1
[illegible]	66	1

P.

	G.	S.
[illegible]	69	8
[illegible],	86	1
[illegible]	79	1
Pallette,	79	1
Paon,	70	1
—	84	1
— -de-mer,	75	18
Paoncello,	7[illegible]	[illegible]
Paonchello,	70	1
Paonzello,	70	1
Papechieu,	70	1
Parcus,	70	1
Pardales de Oviedo,	69	1
Pardali Bellonii congener,	70	3
Pardalis,	69	1
Πάρδαλος,	70	2
Pardalus,	70	2
— Aristotelis,	70	2
— minor,	69	2
— primus,	78	1
— primus Schwenckfeldii,	78	1
— quartus,	69	2
— secundus,	70	2
— tertius,	69	1
— tertius Schwenckfeldii,	69	1
Parra Plinii,	70	1
Partridge-Snipe,	77	4

	G.	S.
Pavo agreſtis Bellonio,	70	1
— agreſtis Geſneri,	70	1
— agreſtis Geſnero,	70	1
— cauda brevi,	84	1
— Chinenſis ſine cauda,	84	1
— ex cinereo fuſcus, &c.	84	1
— marinus,	84	1
— nigricans, brevicaudus, &c.	84	1
— ſine cauda Chinenſis,	84	1
Pavonzino,	70	1
Πελαγος,	80	2
Πελαργὸς,	80	2
Πέλαργος μέλας,	80	1
Pelecan,	79	1
— (American Scarlet)	79	3
Pelecanus,	79	1
— Aldrovandi,	79	1
— Ornithologi,	79	1
Pelekan,	79	1
Πελεκὰν,	79	1
[illegible], Ariſt.	79	1
Pélican,	79	1
— Américain,	78	8
Pelican,	79	1
— (Wood)	78	8
Pelicanus,	79	1
— Aldrovandi,	79	1
— Geſneri,	79	1
Pelikan,	79	1
Pella Ariſtoteli,	81	1
Pellicane,	79	1
Pellicano,	79	1
Πελλὸς,	81	1
Perdix ruſtica,	77	1
— ruſtica major,	77	1
— ruſtica minor,	77	2
Perdrix-de-mer,	73	
—	73	1
— -de-mer à collier,	73	2
— -de-mer du Sénégal,	73	4
— -de-mer tachetée,	73	3
Perr,	75	10

	G.	V. S.
Petit Butor,	81	26
—	81	43
—	81	46
— Butor brun,	81	47
— Corlieu,	76	2
—	78	2
— Courly,	78	2
— Courly d'Amérique,	78	9
— Héron,	79	1
— Héron blanc,	81	18
—	81	20
— Pluvier,	69	5
— Pluvier à collier,	69	8
— Pluvier doré,	69	2
— Râle d'eau,	74	2
Petite Alouette-de-mer,	75	A. 10
— Alouette-de-mer de S. Domingue,	75	13
— Beccaſſine,	77	3
— Eſpece de Bécaſſine, (Plus)	77	3
— Foulque d'eau de l'Amérique,	87	9
— Maubéche griſe,	75	17
— Outarde,	66	2
— Poule d'eau,	87	8
— Poule-Sultane,	87	2
Pfiſterlein Leonardi Baltneri,	75	2
Pful-Schnepff,	76	2
Phæopos altera, (Gallinula)	78	2
Phæopus,	78	2
— alter,	78	2
— altera,	78	2
— altera Geſneri,	78	2
— (Gallinula)	78	2
— Gallinula Geſneri,	78	2
Philomachus,	75	18
Pica marina,	68	1
— marina Anglorum,	68	1
— marina Gallorum,	68	1
Pickart,	81	24

	G.	S.
Pie de mer,	68	1
— (Sea-)	68	1
Pigra,	70	1
Pilente,	75	2
Pilwegichen,	75	2
Pilwenckgen,	75	2
Pinirolo,	75	1
— Italis dicta, (Tringa tertia Aldrovandi)	75	1
Piper, (Sand-)	75	2
Pittoor,	81	24
Pittouër,	81	24
Pivier,	69	1
—	78	1
— Montano,	70	2
Piviero,	69	1
Piwip,	70	1
Pizzaccara,	76	1
—	77	1
Pizzardella,	77	2
Plaskonos,	79	1
Platalea,	79	1
— corpore albo,	79	1
— corpore ſanguineo,	79	2
—	79	3
Platea,	79	
—	79	1
— Aldrovandi,	79	1
— Americana, &c.	79	2
— Americana phœnicea,	79	3
— Braſilienſis,	79	2
— Braſilienſis, Ajaia dicta Marcgravii,	79	2
— candida,	79	1
— coccinea,	79	3
— incarnata,	79	3
— Mexicana,	79	3
— Mexicana Hernandezii,	79	3
— Mexicana Niercmbergii,	79	3
— Plinii,	79	1
— roſea,	79	2

	G.	S.
Platea ſanguinea tota,	79	3
— Willughbeii,	79	1
Platelea Ciceronis,	79	1
Plateola,	79	1
Platyrinchos,	79	1
Plover, (Baſtard)	70	1
— (Chattering)	69	9
— (Green)	69	1
— (Grey)	69	1
—	70	2
— (Lap-Wing)	70	1
— (Spotted-)	69	4
— (Stone-)	70	2
—	76	1
—	76	6
— (Whiſtling)	69	1
Pluiero,	76	3
Plus petite eſpece de Bécaſſine,	77	3
Pluvialis,	69	
—	69	1
— altera ſpecies,	69	[illegible]
— arenaria noſtra, Raji, (Gavia, quæ)	72	1
— aurea,	69	1
— aurea Freti Hudſonis,	69	4
— aurea minor,	69	2
— Bengalenſis major,	69	13
— cinerea,	70	2
— cinerea flaveſcens,	70	2
— cinerea, Squatarola Venetiis dicta,	70	2
— cinereus, &c.	69	1
— Dominicenſis aurea,	69	3
— Dominicenſis torquata,	69	10
— ex fuſco & albo varia, &c.	69	11
— flaveſcens,	69	1
— flavo-cinerea,	75	6
— flavo-vireſcens,	69	1
— fuſco-cinerea, rarior ſpecies,	75	2

	G.	S.
Pluvialis Jamaicensis torquata,	69	11
— major,	69	12
—	76	3
— major Aldrovandi,	76	3
— major Aldrovando,	76	3
— miniatis cruribus,	69	8
— minor,	69	2
—	69	5
— nigro-flavus,	69	4
— Persica cristata,	69	14
— Senegalensis armata,	69	15
— torquata,	69	7
— torquata minor,	69	8
— totus cinereus,	70	2
— Virginiana torquata,	69	9
— viridis,	69	1
— viridis, &c.	69	11
— viridis Gesneri,	69	1
Pluvier,	69	
—	69	1
—	69	8
— à collier,	69	7
— à collier de la Jamaïque,	69	11
— à collier de S. Domingue,	69	10
— à collier de Virginie,	69	9
— à collier, (Petit)	69	8
— armé du Sénégal,	69	15
— criard,	69	9
de Bengale, (Grand)	69	13
— des Indes à la gorge noire,	69	4
— doré,	69	1
— doré de la Baye de Hudson,	69	4
— doré de S. Domingue,	69	3
— doré, (Petit)	69	2
— (Grand)	69	12
— gris,	70	2
— hupé de Perse,	69	14
— moucheté,	69	4

	G.	V.	S.
Pluvier, (Petit)	69		5
— verd,	69		1
Poche,	79		1
Pol-Schnep,	76		2
Poliopus,	87		8
— Gallinula minor Aldrovandi,	87		8
Polit,	78		1
Polla,	77		1
Polle,	87		5
Pool-Snipe,	75		3
—	75		8
Porc mari,	87		1
Porcellana,	87		8
Porphyrio,	87		
—	87		1
— Amboinensis, (Avis)	78		12
— Americanus, &c.	71		2
— Americanus Hernandezii,	87		1
— Americanus Nierembergii,	87		1
— (Ardea)	78		12
— cæsius, &c.	87		1
— Freti Hudsonic,	87		9
— fuscus,	87		4
— Maderaspatanus,	87		10
— melanocephalos,	87	A.	1
— minor,	87		2
— nævius,	87		8
— nigricans, &c.	75		1
— olivarius, &c.	87		3
—	87		4
— punctulatus,	87		7
— rufescens,	87		5
— rufus,	87		6
— viridis,	87		3
Porphyrion,	87		1
Πορφυρίων,	87		1
Porzana,	74		1
—	74		2
—	87		8
— Italorum,	74		2

	G.	V.	S.
Porzana minor,	74		2
Pouacre,	81		31
Poule,	87	A.	1
—-d'eau,	71		2
—-d'eau aux aîles éperonnées,	71		5
— d'eau, (Petite)	87		8
—-Sultane,	~~87~~		
—	87		1
—-Sultane à tête noire,	87	A.	1
—-Sultane brune,	87		4
—-Sultane de la Baye de Hudſon,	87		9
—-Sultane de Madraſt,	87		10
—-Sultane mouchetée,	87		7
—-Sultane, (Petite)	87		2
—-Sultane rouſſâtre,	87		5
—-Sultane rouſſe,	87		6
—-Sultane tachetée,	87		8
—-Sultane verte,	87		3
Pratincola,	73		1
Preneur d'Huitres,	68		1
Pſtros,	62		1
Ptak bitny,	75		18
— deſſczowy,	69		1
— deſſczowy popielaty,	70		2
Pugnacem vocant, (Avis quædam, quam in Belgio)	75		18
Pugnax,	75		18
— Aldrovandi, (Avis)	75		18
— (Avis)	75		18
— (Glareola)	75		18
Pulla d'Aigua,	87		4
Pulroſz,	69		1
Pulver,	69		1
Pulvier,	69		1
Purpur-Vogel,	87		1
Puſch-Schneppe,	77		1

Q.

	G.	S.
Quachilto,	87	1
— Hernandezii,	87	1
— Nierembergii,	87	1
Quachilton,	87	1
Quack,	81	45
Quaglie, (Re de)	74	3
Quaiotta, (Ardea)	81	33
Quiratinga,	81	15

R.

	G.	S.
Rab, (Nacht-)	81	45
Rabe, (Nacht-)	81	45
Rail,	74	3
— (Bengall Water)	75	9
—-Hen, (Maderas)	87	10
— (Land)	74	3
— (Water-)	74	1
Râle,	74	
— à collier des Philippines,	74	6
— brun des Philippines,	74	7
— d'eau,	74	1
— d'eau de Bengale,	75	9
— d'eau, (Petit)	74	2
— de Genet,	74	3
— de l'Amérique,	74	8
— de Virginie,	74	8
— des Philippines,	74	4
— rayé des Philippines,	74	5
Ralla Anglorum,	74	1
— Anglorum aquatica,	74	1
— Gallorum,	74	1
Ralle,	74	1
Rallus,	74	
— alis griſeis, &c.	74	1
— alis rufo-ferrugineis,	74	3
— aquaticus,	74	1
— aquaticus, &c.	87	1
— aquaticus Aldrovandi,	74	1
— aquaticus Bengalenſis,	75	9

	G.	S.
Rallus aquaticus minor,	74	2
— Benghalensis,	75	9
— Carolinus,	87	9
— corpore vertice oculisque albis, &c.	75	9
— digitis triuncialibus, &c.	71	5
— Genistarum,	74	3
— grisea, &c.	87	9
— Philippensis,	74	4
— Philippensis fuscus,	74	7
— Philippensis striatus,	74	5
— Philippensis torquatus,	74	6
— terrenus,	87	5
— terrestris,	74	3
— terrestris Americanus,	74	8
— Virginianus,	74	8
Ram, (Nacht-)	81	45
Raphus,	65	
—	65	1
Rarg,	81	1
Rascler,	87	3
Rasle,	74	1
— de Genet,	74	3
— noir,	74	1
— rouge,	74	3
Raven, (Night-)	81	45
Rayer,	81	1
Re de Quaglie,	74	3
Recentiorum Bistarda,	66	1
— Tarda,	66	1
Recurvirostra pectore croceo,	76	5
Red-breasted Gotwit,	76	5
— Curlew,	78	12
— Legg'd Heron,	81	16
— Legged Crane,	67	1
— Legged Horseman,	75	4
— Shank,	68	1
—	75	3
— Shank, (White)	75	8
Redshanca Turneri,	75	3

	G.	S.
Reeve,	75	18
Regen-Vogel,	78	1
—	78	2
Reger,	81	1
— (Aschenfarbener)	81	1
— (Blawer)	81	1
— (Bundter)	81	45
— (Rodter)	81	34
— (Sand-)	81	34
— (Schild)	81	45
— (Schwartzer)	81	21
— (Weisser)	81	15
Regerlin, (Kobel)	73	1
— (Sand)	73	2
Rei-Dommel,	81	24
Reigel,	81	1
— (Blauwer)	81	1
— (Grauer)	81	1
— (Grauwer)	81	1
— (Grosser Ror-)	81	28
— (Mos-)	81	24
— (Moss-)	81	24
— (Mosz-)	81	24
— (Rohr-)	81	24
— (Ros-)	81	24
— (Weisser)	81	15
Reiger,	81	1
—	81	15
— (Wysser)	81	15
Reigher,	81	1
Reiher,	81	1
Rein-Vogel,	87	7
Rex Coturnicum,	74	3
Rhaad,	66	2
Rhea,	63	
—	63	1
Rhodopos, (Gallinula)	75	1
Rhodopus,	75	1
— (Gallinula)	75	1
— Gesneri, (Gallinula)	75	1
Riegerle,	73	2
Riegerlin,	73	2
Riegher,	81	1

	G.	S.
Riet-Schnepff,	77	1
Rind, (Los-)	81	24
— (Meer-)	81	24
— (Us-)	81	24
Rodter Reger,	81	34
Roer-Drum,	81	24
Rohr-Drummel,	81	24
— Reigel,	81	24
— Trumen,	81	24
Roi de Cailles,	74	3
Ronzesa,	77	[illegible]
Ropezora,	77	[illegible]
Ror-Dummel,	81	24
— Reigel, (Grosser)	81	28
Ros-Dam,	81	24
— Dump,	81	24
— Dumpf,	81	24
— Reigel,	81	24
— trumm,	81	24
Rostrum Sudis,	75	4
Rot-bein,	75	3
— Feussel,	75	3
— Knillis,	73	3
— knussell Leonardi Baltneri,	73	3
Roten beinen, (Wasser-Heunlin mit)	75	3
Rott-bein,	75	3
Roupeau,	81	45
Roy des Cailles,	74	1
—	74	3
Ruff,	75	18
Ruffe,	75	18
Rukicola,	77	1
Ruffey,	81	24
Rusticola,	77	1
— Aldrovandi, (Scolopax,)	76	1
— aquatica,	78	6
— maritima minor,	78	6
Rusticula,	77	1
—	77	2
— aquaticaBrasilienfibus,	78	6

	G.	S.
Rusticula major,	77	1
— minor,	77	2
— sylvatica,	75	14

S.

	G.	S.
SAf-Saf,	66	2
Sagiser,	78	4
Samethounle,	74	1
Sand-piper,	[illegible]	2
— Reger,	81	34
— Regerlin,	73	2
— Vogel,	73	1
Sanderling,	75	17
— d'Arbres,	75	10
— de Cornouaille,	75	17
Saouakou,	83	1
— des bois,	83	2
Scarlet Curlew of Brasil,	78	12
— Pelecan, (American)	79	3
— Spoon-bill, (American)	79	3
— Spoon-bill'd Bird of America,	79	3
Schalach,	81	1
Schalenuna,	81	1
Schild Reger,	81	45
Schmirring,	87	6
— dictum, (Gallinulæ aquaticæ quartum genus)	87	6
Schnep-Hun,	77	1
— (Pol-)	76	2
Schnepf, (Grosser)	77	1
— (Half-)	77	3
— (Har-)	77	2
Schnepfe, (Berg-)	77	1
— (Heer-)	77	2
— (Holtz-)	77	1
— (Wald-)	77	1
— (Wasser-)	77	2
Schnepff,	77	1
— (Grase-)	77	2

Schnepff,

	G.	V.	S.
Schnepff, (Graſs-)	77		2
— (Heer-)	77		2
— (Holtz-)	75		14
— -Hun,	77		
— (Pful-)	76		2
— (Riet-)	77		1
— (Wald-)	75		14
Schnepffe,	77		1
—	77		2
— (Waſſer-)	77		2
Schnepf[illegible],	77		2
Schnepfle, (B[illegible]-)	77		2
Schneppe, (Berg-)	77		1
— (Holtz-)	77		1
— (Puſch-)	77		1
— (Wald-)	77		1
Schnercker,	74		3
Schœniclos,	75		10
Schœniclus,	75		10
Schofler,	79		1
Σχοινικλος,	75		10
Schovelard,	79		1
Schoveler,	79		1
Schryck,	74		3
Schrye,	78		1
Schryk,	74		3
Schufler,	79		1
Schwartz Waſſer Heunle,	74		1
Schwartzer Reger,	81		21
— Storch,	80		1
— Storch, (Braun-)	80		1
— Storck,	80		1
Scolopax,	77		
—	77		1
—	77		2
— alba,	77	A.	1
—	78		10
— Aldrovandi,	77		1
— candida,	77	A.	1
— cinerea minor, &c.	77		2
— fuſca,	78		11
— Lapponica,	76		5
— media,	77		2

	G.	S.
Scolopax minima,	77	3
— minima, &c.	77	3
— minor,	77	2
— minor aliis,	77	2
— quæ Capella cœleſtis Authorum,	77	2
— roſtro arcuato, &c.	78	1
—	78	2
—	78	10
—	78	11
—	78	12
— roſtro recto, &c.	75	3
—	76	3
—	76	6
— roſtro recto apice tuberculato, &c.	77	2
— roſtro recto flaveſcente, &c.	76	5
— roſtro recto lævi, &c.	76	1
—	77	1
— roſtro recto longo, &c.	76	7
— roſtro ſubrecurvato, &c.	76	5
— rubra,	78	12
— Ruſticola Aldrovandi,	76	1
— ſimpliciter Aldrovandi,	77	1
— ſimpliciter Ariſtotelis,	77	1
— ſubtus fulva, &c.	77	1
Scops,	80	12
Scopus,	82	
—	82	1
Scorzana,	87	8
Scur-Vogel,	80	4
— Vogel, Marcgravii, (Belgis)	80	4
Scythe-bill'd Heron,	78	4
Sea-Dotterel,	72	1
— Dottrel,	72	1
—	72	2

	G.	S.
Sea-Dottrell,	72	1
— Lark,	69	8
— Pie,	68	1
— Swallow,	73	1
Second Crabier,	81	3
See-Amſel,	75	19
— Taube,	69	1
Segonya,	80	2
Serica dicta, (Gallinago)	74	8
— dicta, (Gallinula)	74	1
Σίρτης,	80	1
Sgainolo,	75	1
Sguacco,	81	31
—	81	45
— vocant, (Ardeæ aliud genus, quam)	81	37
— vocant in vallibus dictis Malalbergi, Aldrovandi, (Ardea quam)	81	37
Shank, (Red-)	68	1
—	75	3
— (White Red-)	75	8
Sichler,	78	4
Siewká,	87	7
Siewniczka,	87	7
Sieyka,	87	7
Σκολόπαξ,	77	1
Slangen-Vreeter,	79	1
Slomká,	77	1
Small Bittern,	81	32
—	81	43
— Water-Hen,	87	8
Snaeppa,	75	2
— (Mall-)	77	2
— (Wald-)	77	2
Sneff, (Haer-)	77	2
Sneppe,	77	1
Snipe,	75	10
—	77	2
— (Gid-)	77	3
— (Greateſt)	69	11
— (Half-)	77	3
Snipe, (Jack-)	77	3
— (Leaſt-)	75	10
— (Partridge-)	77	4
— (Pool-)	75	3
—	75	8
Snite,	77	2
Soco,	81	23
— Braſilienſibus,	81	23
— Braſilienſibus Marcgravio,	81	23
Soree,	74	8
Spar,	75	10
Spatula dicta, (Ardea Phœnicea,)	79	3
— dicta, (Ardea roſea,)	79	2
Spatule,	79	
—	79	1
—	79	2
— couleur de roſe,	79	2
— rouge,	79	3
Spinzago,	78	1
Spoon-bill,	79	1
— bill, (American Scarlet)	79	3
— bill'd Bird of America (Scarlet)	79	3
— bill'd Heron, (White and)	79	1
Spotted-Plover,	69	4
— Tringa,	75	20
Spur-Wing'd Gooſe of America,	71	4
Squaiotta,	81	33
— dicta Malalbergi, Aldrovandi, (Ardea vulgò)	81	33
— dicitur Malalbergi, (Ardeæ alia ſpecies, quæ vulgò)	81	33
— Italorum,	81	33
Squatarola,	70	2
— Venetiis dicta, (Pluvialis cinerea)	70	2

	G.	S.
Starda,	66	1
Stare, (Watn-)	75	19
Stein-beysser,	75	10
— bicker,	75	10
Steingaellyl,	75	1
Steingallell Leonardi Baltneri,	75	1
Stella,	66	2
— Avis,	66	2
— Avis Aldrovandi,	66	2
— Avis dicta,	66	2
Stint,	75	10
— dicta, (Avis The)	75	10
Stone Curlew,	69	12
— from Hudson's Bay, (Turn-)	72	1
— Plover,	70	2
—	76	1
—	76	6
— (Turn-)	72	1
—	72	2
Storch,	80	2
— (Braun-Schwartzer)	80	1
— (Schwartzer)	80	1
— (Weisser)	80	2
Storck,	80	2
— (Schwartzer)	80	1
Stork,	80	2
— (Black)	80	1
— (White)	80	2
Strand-Looper,	75	10
Strandskjura,	68	1
Strandpipare,	69	8
Straus,	62	1
— -Vogel,	62	1
Strauss,	62	1
Στρειφοκάμηλος,	62	1
Στριφοχάμιλος,	62	1
Στρυθοϊκάμηλος,	62	1
Στρυθοκάμηλος,	62	1
Στρυθος,	62	1
Στρουθιοκάμηλος,	62	1
Στρουθος λίβυκος,	62	1

	G.	S.
Στρουθος μεγάλη,	62	1
Struijs, (Vogel)	62	1
Strus,	62	1
Struss,	62	1
Struthio,	62	
—	62	1
—	63	1
— Africæ,	62	1
— Americanus,	63	1
— -Camelus,	62	1
—	63	1
— -Camelus Africanus, pullus,	62	1
— -Camelus Americanus,	63	1
— -Camelus Americanus Marcgravio,	63	1
— cucullatus,	65	1
— digito postico rotundato mutilo,	63	1
— ex China, Vischer,	84	1
— Libycus,	62	1
— nothus,	63	1
— pedibus didactylis,	62	1
— pedibus tetradactylis, &c.	65	1
— pedibus tridactylis, &c.	64	1
— pennis candidissimis, &c.	62	1
Strutho-Camelus,	62	1
Strutz,	62	1
Strutza,	62	1
Struzzo,	62	1
Στρυθος,	62	1
Sturnus niger, &c.	75	19
Sturzo,	62	1
Sudis, (Rostrum)	75	4
Suri,	63	1
Swallow, (Sea-)	73	1
— (Water-)	75	10
Swan of S. Maurice's Island, (Monk-)	65	1

	G.	S.
Συριστὴς,	80	6

T.

	G.	S.
TAil, (Wag-)	70	2
Tamatia,	83	2
— alia,	83	2
— Brasiliensibus dicta,	83	2
— Brasiliensibus dicta Marcgravii,	83	[illegible]
— Brasiliensibus Marcgravii,	83	2
Tantalus,	78	[illegible]
Ταὼς ἄγριος,	70	[illegible]
Tarangolo,	78	2
Taraniolo,	78	2
Tarax Nemesiani,	66	1
Tarda,	66	1
— Aldrovandi,	66	1
— Arabs,	66	3
— Avis,	66	1
— Avis Aldrovandi,	66	1
— Isidori,	66	1
— Isidoro,	66	1
— Mechaensis Arabica,	66	3
— nana,	66	2
— Pyrenaica, fulva, &c.	66	1
— Recentiorum,	66	1
— (Recentiorum)	66	1
— simpliciter,	66	1
Tarlino,	78	1
Taube, (See)	69	1
Taurus Plinii,	81	24
Tcheluk,	77	1
Telamon,	87	1
Terlino,	78	1
Terrabusa,	81	24
Terrabuso,	81	24
Tetraon Longolio,	66	1
Tetrax,	66	2
— Bellonii,	66	2
— Bellonii, Aldrovandi,	66	2
— Nemesiani,	66	1

	G.	S.
Τίτριξ,	66	1
Teuffel, (Haus-)	75	18
Tewit,	70	1
Thouyou,	63	
—	63	1
Thouyouyou,	63	1
Tiklin,	74	4
—	74	5
—	74	6
—	[illegible]	7
Tinga Brasiliensibus, (Guira-)	81	15
— Brasiliensibus Marcgravii, (Guira-)	81	15
— (Guira-)	81	15
Titulus tepidi temporis Petronio,	80	2
Tlauhquechul,	79	3
— Hernandezii,	79	3
— Nierembergii,	79	3
Tlauquechul,	79	3
Tobactli,	81	11
Tolck,	72	1
Toquilcoyotl,	80	8
Tordo Gelsemino,	87	8
Torquato,	78	1
Toru de Garriga,	81	28
Totano,	76	2
—	76	3
Totanus,	75	3
—	76	1
—	76	2
— Aldrovandi,	76	1
— alter,	75	4
— Bengalensis,	75	9
— candidus,	75	8
— cinereus,	75	7
— cinereus, &c.	76	1
— fulvus, &c.	76	5
— Gesneri,	75	3
— naevius,	75	6
— Ornithologi,	76	2
— ruber,	75	4

	G.	S.
Totanus ſtriatus,	75	5
Tourne pierre de la Baye de Hudſon,	72	1
Trana,	80	6
Trapp,	66	1
— (Acker-)	66	1
—-gans,	66	1
—-ganſs,	66	1
Trappa, (Anſer)	66	1
Trappe,	66	1
— (Acker-)	66	1
Tree Widdle,	75	10
Triel,	69	12
Tringa,	75	
—	75	1
— Aldrovandi,	75	1
— alia,	75	1
— Auguſti menſis,	70	2
— cinerea, &c.	75	21
— criſtâ dependente, &c.	70	1
— facie papillis granulatis, &c.	75	18
— littorea,	75	7
— luteo cinereoque maculata, &c.	75	4
— maritima,	72	1
— minor,	75	2
— nigra, albo punctata, &c.	75	1
— nigro, albo, ferrugineoque variegata, &c.	72	1
— nigro-fuſca, &c.	70	2
— pedibus rubris,	75	18
— pedibus rubris, &c.	70	1
—	72	1
— prima,	75	1
— pulla, &c.	75	10
— quinta,	75	2
— remigibus fuſcis, &c.	75	7
— roſtri apice punctato, &c.	75	1
Tringa roſtro lævi, &c.	75	1
—	75	2
—	75	7
—	75	21
— roſtro nigro, &c.	70	2
—	75	3
— roſtro pedibuſque rubris, &c.	75	4
— (Spotted)	75	20
— ſubcinerea, &c.	69	11
— tacheté,	75	20
— tertia,	75	1
— tertia Aldrovandi,	75	1
— tertia Aldrovandi, Giaroncello Italis dicta,	75	1
— tertia Aldrovandi, Pinirolo Italis dicta,	75	1
Trochilus Junio,	87	6
— terreſtris,	87	5
Trombone,	81	24
Troſtle, (Waſſer-)	75	19
Tr[illegible],	79	1
Trumbotto,	81	24
Trumen, (Rohr-)	81	24
Trumm, (Ros-)	81	24
Τρύγγας,	75	1
Trynga,	75	1
—	75	19
— alia,	75	1
— altera,	75	1
— quarta,	75	10
— ſecunda,	75	1
Tryngas,	75	1
Tullfiſz,	73	2
Turdus aquaticus,	75	19
—	75	20
Turn-Stone,	72	1
—	72	2
— Stone from Hudſon's Bay,	72	1

V.

	G.	S.
VAneau,	70	1
Vanellus,	70	
—	70	1
— Alberto magno,	70	1
— Aldrovandi,	70	1
— Bononiensis major,	70	5
— Dominicensis armatus,	70	8
— fuscus,	70	2
— griseus,	70	2
— Helveticus,	70	4
— Indicus,	69	14
— Ludovicianus armatus,	70	7
— Senegalensis armatus,	70	6
— torquatus, &c.	70	1
— varius,	70	3
Vanneau,	70	
—	70	1
— armé de la Louisiane,	70	7
— armé de S. Domingue,	70	8
— armé du Sénégal,	70	6
— de Bologne, (Grand)	70	5
— de Suisse,	70	4
— gris,	70	2
— varié,	70	3
Velvet Kunner,	74	1
Verola,	76	1
Videcocq,	77	1
Videcoq,	77	1
Virgo,	80	12
— Numidica,	80	12
Vivago Bodini,	69	1
Vogel, (Brach-)	69	1
—	73	1
—	78	1
—	78	2
—	87	7
Vogel, (Frembder-)	87	1
— (Froembder)	67	1
— (Geisz-)	78	1
— (Grosser Brach-)	69	1
—	70	2
—	78	1
— (Jut-)	78	1
— (Klein Brach-)	87	7
— (Kleiner Brach-)	69	[illegible]
— Marcgravii, (Scur-)	80	4
— (Purpur-)	87	1
— (Regen-)	78	1
—	78	2
— (Rein-)	87	7
— (Sand-)	73	1
— (Scur-)	80	4
— (Straus-)	62	1
— Struijs,	62	1
— (Walgh-)	65	1
— (Weltscher-)	78	4
— (Wetter-)	78	1
— (Wind-)	78	1
Vreeter, (Slangen-)	79	1
Us-rind,	81	24
Wachtel Koenig,	74	3
Wachteln Koenig,	74	3
Wag-Tail,	70	2
Wald-Schnepfe,	77	1
— Schnepff,	75	14
— Schneppe,	77	1
— Snaeppa,	77	2
Walgh-Vogel,	65	1
Wallop,	78	1
Wasser-Amsel,	75	19
— Heunle, (Grosz)	87	5
— Heunle, (Schwartz)	74	1
— Heunlein,	73	3
— Heunlin,	77	2
— Heunlin, (Bundt)	75	1
— Heunlin mit Roten beinen,	75	3
— Hun,	87	6
— Hunle, (Grosse)	87	5

	G.	V.	S.
Waſſer-Ochſz,	81		24
— Schnepfe,	77		2
— Schnepffe,	77		2
— Troſtle,	75		19
Water-Crake,	75		19
— Curlew,	78		1
— Hen, (Little American)	87		9
— Hen, (Small)	87		8
— [illegible]en,	71		1
— hun,	75		1
— Ouzel,	75		19
— Rail,	74		1
— Rail, (Bengall)	75		9
— Swallow,	75		10
Watn-Stare,	75		19
Weiſſer Reger,	81		15
— Reigel,	81		15
— Storch,	80		2
Weltſcher-Vogel,	[illegible]		4
Wetter-Vogel,	78		1
Whaupe,	78		1
Whimbrel,	78		2
Whimbrell,	78		2
Whiſtling Plover,	[illegible]		1
White and Spoon-bill'd Heron,	79		1
— Curlew,	78		10
— Gaulding,	81		15
— Gaulding, (Largeſt)	81		15
— -Godwit from Hudſon's-Bay,	76		8
— Heron,	81		15
— Heron, (Great)	81		15
— Heron, (Little)	81		18
— Red-Shank,	75		8
— Stork,	80		2
— Wood-Cock,	77	A.	1
Widdle, (Tree)	75		10
Wimbrel,	78		2
Wind-Vogel,	78		1
Wing, (Lap-)	70		1
— Plover, (Lap-)	70		1
Wips,	70		1
Wood-Cock,	77		1
— Cock, (White)	77	A.	1
— Pelican,	78		8
Wynkernell,	74		2
Wynkernell,	74		2
Wyile: Reiger,	81		15

X.

	G.	S.
XOxoubqui-hoactli,	81	5
X—	81	11
Xoxouqui-hoactli,	81	5
Xoxouquihaactli, (Avis)	81	13
Ξολορις,	[illegible]	1

Y.

	G.	S.
YAcacintli,	87	1
Yacatopil,	75	4
Yandou,	63	1
[illegible]whelp,	76	6
Yarwip,	76	6
Yohualcuachili,	71	4
Yohualquachili,	71	4

Z.

	G.	S.
ZAkid,	80	2
Ziege, (Himels)	77	2
— (Himmel-)	70	1
— (Himmels-)	77	2
Zigogna,	80	2
Zoltaczek,	69	8
Zoraw,	80	6
—	81	1
Zweiel,	70	1

00087634

Digitized with financial assistance from
Government of Maharashtra
on 30 January, 2020